



DISERBO CIPOLLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina o pre trapianto	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di colture (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1)	38,72	2	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sabbiosi
Pre-emergenza	Dicotiledoni	Aclonifen	49,6	1	
Pre - trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	2	
Post emergenza e Post trapianto	Dicotiledoni annuali	Bromoxynil	30,70	0,5 – 0,75	
	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Pyridate (2) (3) Clethodim	38,72 45,0 25,2	1 - 1,5 1,3 – 2 1	(1) Intervenire su colture dopo le 2 foglie vere Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno (3) Solo dicotiledoni
	Dicotiledoni perennanti	Clopiralid	9,5	1,2 -1,5	Da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera, utilizzando dosi frazionate in proporzione allo sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D	10,8 9,7 5 4,93	1,5 – 2,5 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5	