



DISERBO FAVINO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox Pendimetalin (1) Imazamox + Pendimetalin (1) Clomazone Metribuzin Aclonifen (2)	3,7 31,7 1,6 + 23,5 30,74 70,0 600 g/l	0,75 2 3 - 4 0,2 - 0,3 0,15 - 0,20 3	(1) Da non usare su terreni sabbiosi, trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione (2) Utilizzabile solo su favino da granella
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox	3,7	0,75	Intervenire in post emergenza precoce
	Dicotiledoni	Bentazone	87	0,6	Poste emergenza delle infestanti
	Graminacee	Propaquizafop Quizalofop P etile Ciclossidim	9,7 5,4 10,8	1 1 - 1,5 1,5 - 2,5	