



DISERBO ASPARAGO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-Trapianto	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione
Pre-Trapianto Pre Ricaccio e/o Post Raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Post-trapianto	Dicotiledoni	Pyridate (1)	45,0	1,3 - 2	Massimo 2 Kg di prodotto all'anno (1) Utilizzare dopo la raccolta dei turioni.
Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin + Clomazone	24,56 + 4,90	2 - 3	
Pre ricaccio e Post raccolta	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1) Pendimetanil (1) Dicamba (2) Metobromuron (3)	35 38,72 21,2 33,78	0,4 - 0,7 2,50 0,2 - 0,5 3,75	E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe (1) Rispettare 60 gg di carenza (2) Interventi ammessi solo dopo l'emergenza dei turioni (3) Dopo la raccolta dei turioni.
Post raccolta	Graminacee	Propaquizafop	9,7	1	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta