



DIFESA CAVOLO A TESTA: CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavolo Cappuccio Appuntito, Cavoli Rossi - Bianchi, Cavoli Verza)

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
CRITTOGAME			
Nelle miscele estemporanee di fungicidi non devono essere impiegate contemporaneamente, per ciascuna avversità, più di due sostanze attive diverse con esclusione dei prodotti rameici, del Fosetil Al, di tutti i prodotti biologici e del fosfonato di K. Ciascuna sostanza presente nella miscela deve provenire da un unico formulato commerciale			
Moria delle piantine (<i>Pythium spp.</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -Curare l'irrigazione evitando i ristagni idrici; -Evitare quando possibile trapianti troppo anticipati. BIOLOGICO -interventi preventivi con microrganismi antagonisti CHIMICO: -Interventi in semenzaio (letti di semina o contenitori alveolari) e in post trapianto alla comparsa dei primi sintomi.	<i>Trichoderma harzianum</i> <i>Trichoderma asperellum</i>	Utilizzare solo ceppi di <i>Trichoderma</i> registrati
Marciume basale (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) (<i>Sclerotinia minor</i>) (<i>Phoma Lingam</i>) (<i>Rhizoctonia solani</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -Utilizzare varietà poco suscettibili; -Eliminare le piante ammalate; -Curare l'arieggiamento in coltura protetta; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici. BIOLOGICO -interventi preventivi con microrganismi antagonisti CHIMICO: -Intervenire durante le prime fasi vegetative bagnando bene la base delle piante.	<i>Trichoderma harzianum</i> (1) <i>Trichoderma asperellum</i> (1) <i>Coniothyrium minitans</i> (2)	Utilizzare solo ceppi di <i>Trichoderma</i> registrati (1) Ammessi solo su <i>Rhizoctonia</i> (2) Ammesso solo sulle <i>Sclerotinie</i>
Alternaria (<i>Alternaria brassicae</i>) (<i>Alternaria brassicicola</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -Utilizzare varietà poco suscettibili; -Eliminare le piante malate; -Non adottare densità d'impianto troppo elevate; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici. CHIMICO: -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici Azoxistrobin (1) (2) Azoxistrobin + Difenconazolo (1) (3) (4) Difenconazolo (4) Fluxapiroxad + Difenconazolo (4) (5) (6)	(1) Al massimo 2 interventi con strobilurine per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Autorizzato solamente su cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles (3) Ammesso solo su cavolo cappuccio (4) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con IBE, indipendentemente dall'avversità (5) Massimo 2 interventi l'anno (6) Solo in pieno campo
Peronospora (<i>Peronospora brassicae</i>) (<i>Peronospora parassitica</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali -Distruggere i residui delle colture ammalate; -Non adottare densità d'impianto troppo elevate; -Uso di varietà resistenti; -Favorire il drenaggio del suolo; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante. CHIMICO: -I trattamenti vanno programmati in funzione delle condizioni climatiche (piogge frequenti e alta umidità) predisponenti la malattia.	Prodotti rameici Azoxistrobin + Difenconazolo (1) (2) (3) (4)	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio (2) Al massimo 2 interventi con strobilurine per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (3) Ammesso solo su cavolo cappuccio (4) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con IBE, indipendentemente dall'avversità



DIFESA CAVOLO A TESTA: CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavolo Cappuccio Appuntito, Cavoli Rossi - Bianchi, Cavoli Verza)

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Oidio (<i>Erysiphe cruciferarum</i>)	CHIMICO: -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Zolfo Bicarbonato di potassio (1)	(1) Su coltura portaseme
Micosferella del cavolo (<i>Mycosphaerella brassicicola</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -Eliminare le piante ammalate. CHIMICO: -Intervenire in funzione di condizioni climatiche favorevoli: alta umidità e T 16-20°C.	Prodotti rameici Azoxistrobin (1) (2) Difenoconazolo (3) Fluxapiroxad + Difenoconazolo (3) (4) (5)	(1) Al massimo 2 interventi con strobilurine per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Autorizzato solamente su cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles (3) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale con IBE indipendentemente dall'avversità (4) Massimo 2 interventi l'anno (5) Solo in pieno campo
Ruggine (<i>Albugo candida</i>)	CHIMICO: -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	
Botrite (<i>Botrytonia fuckeliana</i>)			Non sono ammessi interventi chimici
Batteriosi (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>) (<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Carotovora</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -impiegare seme/piantine sano/e; -Concimazioni azotate e potassiche equilibrate; -Eliminazione della vegetazione infetta, che non va comunque interrata; -Evitare ferite alle piante durante i periodi particolarmente umidi; -evitare se possibile o limitare le irrigazioni per aspersione; -Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante.	Prodotti rameici	
Ernia del cavolo (<i>Plasmodiophora brassicae</i>)	AGRONOMICO: -Ampi avvicendamenti colturali; -Utilizzare varietà poco suscettibili; -Limitare le irrigazioni ed evitare ristagni idrici.		Nessun intervento chimico
VIROSI (CaMV, TuMV, CMV)	AGRONOMICO: -Eliminare le piante virosate; -Eliminare le crucifere spontanee; -Per le virosi trasmesse da afidi in modo non persistente (tra cui il virus del mosaico del cavolfiore, CaMV) valgono le stesse considerazioni generali di difesa dagli afidi.		
FITOFAGI			
Aleurodidi (<i>Aleyrodes Proletella</i>)	CHIMICO: -Intervenire in caso di infestazione generalizzata.	Olio essenziale di arancio dolce Deltametrina (1) Zeta-cipermetrina (1) (2) Cipermetrina (1) (4) Spirotetramat (3) Maltodestrina	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni (2) Ammesso solo su cavolo cappuccio (3) Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Non ammesso in coltura protetta



DIFESA CAVOLO A TESTA: CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavolo Cappuccio Appuntito, Cavoli Rossi - Bianchi, Cavoli Verza)

<i>Avversità</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>S.a. e Ausiliari</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Afidi (<i>Myzus persicae</i>) (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	AGRONOMICO: -Distruggere in inverno i fusti di cavolo dopo la raccolta. CHIMICO: -Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	Deltametrina (1) Zeta-cipermetrina (1) (2) Cipermetrina (1) (3) (4) Azadiractina A (3) Lambdacialotrina (1) (4) (7) (9) Acetamiprid (5) (8) Spirotetramat (6) Maltodestrina Tau-fluvalinate (1) Sulfoxaflor (4)	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni. (2) Ammesso solo su cavolo cappuccio. (3) Ammesso solo su cavoli cappucci e cavolo verza. (4) Non ammesso in coltura protetta. (5) Massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità. (6) Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (7) Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dalla'avversità. (8) Utilizzare solo su cavolo di Bruxelles. (9) Non ammesso su cavolo verza.
Mosca del cavolo o del cavolfiore (<i>Delia radicum</i>)	AGRONOMICO: -Eliminare le crucifige spontanee; -Distruggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno. CHIMICO: -Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	Deltametrina (1) Teflutrin (2) (3) (4) Lambda-cialotrina (2)	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni. (2) Al massimo 1 intervento indipendentemente dall'avversità. Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare granulare al momento del trapianto. (3) Ammesso solo su cavolo cappuccio. (4) Non utilizzare in coltura protetta.
Tripidi (<i>Trips tabaci</i>) (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	CHIMICO: -Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	Spinosad (1) Piretrine pure	(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità
Cavolaia e Rapaiola (<i>Pieris brassicae</i>) (<i>Pieris rapae</i>)	CHIMICO: -Intervenire alla comparsa delle infestazioni.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina (1) Alfacipermetrina (1) (2) (8) Cipermetrina (1) (6) Indoxacarb (3) (2) Metaflumizone (4) (6) (8) Emamectina (5) (6) (8) Chloratraniliprole (7) (6) Etofenprox (5) (9) Piretrine pure (8)	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni. (2) Solo su cavolo capuccio. (3) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Ammesso solo su cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles. (5) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità; (6) Non ammesso in coltura protetta. (7) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. ammesso solo su cavolo cappuccio e cavolo verza. (8) Ammesso solo su <i>Pieris brassicae</i> . (9) Non Utilizzare su cavolo di Bruxelles.



DIFESA CAVOLO A TESTA: CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavolo Cappuccio Appuntito, Cavoli Rossi - Bianchi, Cavoli Verza)

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<p>Nottue fogliari (<i>Mamesta brassicae</i>) (<i>Mamesta oleracea</i>) (<i>Heliothis armigera</i>)</p> <p>Tignola delle crucifere (<i>Plutella xylostella</i>)</p>	<p>CHIMICO: -Intervenire alla comparsa delle infestazioni.</p>	<p>Bacillus thuringiensis Deltametrina (1) Lambdacialotrina (1) (2) (3) (15) Cipermetrina (1) (2) Zeta-cipermetrina (1) (13) (14) Azadiractina A (4) Indoxacarb (6) (5) Etofenprox (7) (16) (17) Spinosad (8) Metaflumizone (2) (9) (14) Emamectina (10) (2) Chlorantraniliprole (11) (2) Beta - Ciflutrin (1) (2) (12) (14) Piretrine pure</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni (2) Non ammesso in coltura protetta. (3) Ammesso su cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles. (4) Ammesso solo su cavoli cappucci e cavolo verza. (5) Ammesso solo su cavolo cappuccio; ammesso solo su Mamesta b. e Plutella x. (6) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (7) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (8) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (9) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. Ammesso solo su cavolo cappuccio e cavolo di Bruxelles. (10) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità; solo su Plutella e Heliothis. (11) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità; ammesso solo su cavolo cappuccio e cavolo verza su Mamesta b. e Plutella x. (12) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (13) Ammesso solo su cavolo cappuccio. (14) non ammesso su Mamesta b. e o. (15) Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dalla avversità. (16) Non utilizzabile su Plutella xylostella. (17) Non utilizzabile su cavolo di Bruxelles</p>
<p>Nottue terricole (<i>Agrotis spp.</i>)</p>	<p>AGRONOMICO: -Eseguire lavorazioni superficiali nell'interfila che modificano l'umidità del terreno e favoriscono la discesa delle larve negli strati più profondi; -Asportare i residui di coltivazione; -Le lavorazioni superficiali sono utili nell'impedire la schiusura delle uova. CHIMICO: -Intervenire solo in caso d'accertata presenza e con diffuse infestazioni.</p>	<p>Deltametrina (1) Zeta-cipermetrina (2) Teflutrin (2) (3) (4) Lambda-cialotrina (2) Spinosad (5)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni (2) Al massimo 1 intervento indipendentemente dall'avversità. Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare granulare al momento del trapianto (3) Ammesso solo su cavolo cappuccio (4) Non utilizzare in coltura protetta (5) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità</p>



DIFESA CAVOLO A TESTA: CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLI CAPPUCCI (Cavolo Cappuccio Appuntito, Cavoli Rossi - Bianchi, Cavoli Verza)

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Tentredine delle crucifere (<i>Athalia rosae</i>)	CHIMICO: -Intervenire sulle giovani larve, alla comparsa delle infestazioni.	Deltametrina (1) Beta - Ciflutrin (1) (2) (3)	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni. (2) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Non utilizzare in coltura protetta.
Altica (<i>Phyllotreta spp.</i>)	CHIMICO: -Intervenire su piante giovani ed in presenza di infestazioni diffuse.	Deltametrina (1) Acetamiprid (2) (5) Beta - Ciflutrin (1) (3) (4) Etofenprox (6) (7)	(1) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni. (2) Massimo 1 intervento all'anno con i neonicotinoidi indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo due interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Non utilizzare in coltura protetta. (5) Utilizzare solo su cavolo di Bruxelles. (6) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (7) Non utilizzare su cavolo di Bruxelles.
Punteruolo (<i>Ceuthorrhynchus pleurostigma</i>)	AGRONOMICO: -Eliminare le crucifere spontanee; -Distuggere i residui delle colture di cavolo durante l'inverno. CHIMICO - Intervenire solo in caso di presenza del fitofago.	Teflutrin (1) (2) (3)	(1) Al massimo 1 intervento indipendentemente dall'avversità. Da distribuire localizzato lungo le file in forma granulare granulare al momento del trapianto. (2) Ammesso solo su cavolo cappuccio. (3) Non utilizzare in coltura protetta.
Insetti terricoli Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	CHIMICO: -Intervenire prima del trapianto solo in caso di infestazione generalizzata riscontrata sul ciclo precedente.	Teflutrin (1) (2) (3) Lambda-cialotrina (1) (4) Zeta-cipermetrina (1) Cipermetrina (5)	(1) Al massimo 1 intervento con formulati granulari localizzato al trapianto indipendentemente dall'avversità (2) Ammesso solo su cavolo cappuccio (3) Non utilizzare in coltura protetta (4) Solo su coltura portaseme. (5) Al massimo 3 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità; massimo tre interventi per i cicli superiori a 70 giorni.
Chioccioline e limacee (<i>Helix spp.</i>) (<i>Cantareus aperta</i>) (<i>Helicella variabilis</i>) (<i>Limax spp.</i>) (<i>Agriolimax spp.</i>)	CHIMICO: -Solo in caso d'infestazione generalizzata;	Fosfato ferrico	Distribuire il prodotto in formulazione granulare sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate.
Nematodi (<i>Heterotera schachtii</i>)	AGRONOMICO: -Avvicendamenti colturali; -Utilizzo di varietà resistenti o tolleranti; -Utilizzo in precessione colturale di specie da sovescio con attività bio-nematocida. BIOLOGICO -interventi sul terreno con microrganismi antagonisti in pre e post impianto CHIMICO: -In caso di terreni fortemente infestati.	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Nessun intervento chimico