



DISERBO ERBA MEDICA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.
	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin	19,2	6,5	
Post emergenza	Cuscuta	Propizamide (1)	35,0	4	(1) Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente, non potranno superare il 15% dell'intera superficie
	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1)	35	1	(1) Interventi da effettuare dopo l'ultimo sfalcio con la coltura in riposo vegetativo
	Dicotiledoni	Imazamox Pyridate (1)	3,7 45,0	0,5 - 0,75 0,5 - 2	(1) Al massimo 2 kg di prodotto all'anno
	Graminacee	Quizalofop-P-etile isomero D (1) Quizalofop-p-etile (1) Propaquizafop Cletodim	4,9 5 9,60 25,2	1 - 1,5 1 - 1,5 1 1	(1) Non ammesso il primo anno di impianto. Ammesso al massimo 1 intervento all'anno