



# DISERBO CICORINO IN COLTURA PROTETTA (ex IV GAMMA)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) (2)	360 gr/litro		Utilizzare in presenza di infestanti emerse <b>(1) Solo preparazione di letti di semina o di trapianto</b> <b>(2) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.</b>
<b>Pre-semina</b>		Propizamide	36	3 - 4	
<b>Pre-Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa. <b>(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.</b>
		Pendimetalin	38,72	2,5	Utilizzare in presenza di infestanti emerse <b>Non utilizzare in terreni sciolti</b>
<b>Pre emergenza e Pre trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	2	
<b>Pre e post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1)	36	1,75 - 3,75	<b>Attenzione alle colture in suceSSIONE</b> <b>(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido</b>
<b>Post emergenza e Post trapianto</b>	Graminacee	Ciclossidim	10,9	2 - 2,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare