



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE S'AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

AGGIORNAMENTO 2020

DIFESA CASTAGNO

Avversità	Criteri di intervento	S.a e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
CRITTOGAME			
Mal dell'inchiostro (<i>Phytophthora cambivora</i>) (<i>Phytophthora cinnamoni</i>)	AGRONOMICI -Preferire portinnesti resistenti al patogeno; -Utilizzare materiale di propagazione sano; -Evitare ristagni alla base del colletto; -Prima e durante la potatura disinfettare gli attrezzi della potatura; -Se possibile, allontanare e bruciare i residui della potatura;		
Marciume nero delle castagne (<i>Gnomopsis pascoe</i>)	AGRONOMICI: -Arieggiare le chiome con potature adeguate; -Potare i rami che si trovano troppo vicino al terreno (indicativamente sotto 1,5 m.); -Se possibile, allontanare e bruciare i residui della potatura; BIOTECNICI: -Curatura delle castagne (termizzazione)		
FITOFAGI			
Tortrice intermedia (<i>Cydia fagiglandana</i>)	AGRONOMICI: -Eliminare le castagne cadute nel terreno e quelle infette; BIOTECNICI: -Curatura delle castagne (termizzazione);	<i>Steinernema spp.</i> Chlorantraniliprol (1)	(1) Utilizzare solo nei castagneti assestati. L'intervento con chlorantraniliprol contiene la proliferazione della <i>Cydia splendana</i> ..
Tortrice tardiva (<i>Cydia splendana</i>)	AGRONOMICI: -Eliminare le castagne cadute nel terreno e quelle infette; BIOTECNICI: -Curatura delle castagne (termizzazione);	<i>Steinernema spp.</i>	L'intervento con chlorantraniliprol effettuato contro la tortrice intermedia contiene la proliferazione di questa specie.
Balanino (<i>Curculio elephas</i>)	AGRONOMICI: -Eliminare le castagne cadute nel terreno e quelle infette; BIOTECNICI: -Curatura delle castagne (termizzazione);	<i>Steinernema spp.</i>	
Cinipide (<i>Dryocosmus Kuriphilus</i>)	BIOLOGICI: -Utilizzo dell'antagonista;	<i>Torymus sinensis</i>	I lanci vanno effettuati nel periodo primaverile.