



DISERBO VALERIANELLA (Valerianella locusta, Songino, Dolcetta)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Benfluralin (1) (2)	19,2	5 - 6	(1) Interrare il prodotto subito dopo l'applicazione. (2) Non utilizzare sulle babyleaf.
Pre e post semina e Pre e post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	36	1,75 - 3,75	Entro 15 gg dalla semina
Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim	10,8	1,5 – 2,5	