



DISERBO RADICCHIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina o pre trapianto	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) (2)	360 gr/litro		(1) Solo trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. (2) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1) Benfluralin (2) (3)	36 19,20	3 - 4 6,50	(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido. (2) Interrare i prodotti dopo la distribuzione. (3) Non utilizzare su baby leaf.
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	1 - 1,5	Non utilizzare in terreni sciolti
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop - p - etile Quizalofop - etile Isomero D	10,9 5 4,93	2 - 3 1 - 1,5 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta