



## DISERBO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Mono e dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) (2) Metamitron	360 gr/litro 50,0	2 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura per preparazione di letti di semina o di trapianto (2) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-Metolaclor (1) Metamitron	86,5 50,0	0,50 2 - 3	<b>20 giorni di carenza</b> (1) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Fenmedifam (1)	15,84	1,25 – 2,5	(1) Le dosi più basse possono essere utilizzate per interventi ripetuti con la coltura allo stadio di 2 – 3 foglie

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***