



## DISERBO RUCOLA

| <i>Epoca d'impiego</i>           | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i> | <i>% di S.a.</i> | <i>l o kg /ha</i> | <i>Limitazioni d'uso e note</i>   |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---|
| Pre semina                       | Mono e Dicotiledoni             | Acido Pelargonico      | 18,86            | 170               | Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.  |
| Pre semina                       | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate (1)          | 360 gr/litro     |                   | Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto<br>(1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura.<br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse |
| Pre semina                       | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Benfluralin            | 19,2             | 5 - 6             | Interrare il prodtto subito dopo l'intervento.  |
| Pre trapianto                    | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Benfluralin            | 19,2             | 5 - 6             |   |
| Post emergenza<br>Post trapianto | Graminacee                      | Ciclossidim            | 10,8             | 2 - 3             |   |