



## DISERBO SORGO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Aclonifen	49	1 - 1,5	
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	2,4-D + MCPA Dicamba + Prosulfuron (S-metolacloclor + Terbutilazina) (1) Bentazone Dicamba	31 + 25 50 + 5 (28,9 + 17,4) 87 21,2	0,3 - 0,5 0,3 - 0,4 3 1,1 - 1,5 0,75	(1) <b>Complessivamente in 1 anno al massimo 0,75 kg/ha di sostanza attiva di Terbutilazina</b> Intervenire a 4-6 foglie
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Mesotrione	9,4	0,5	