



## DISERBO SPINACIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		<b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b> (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	S-metolachlor (1) Metamitron Cloridazon + Metamitron (2)	86,5 50 21 + 31,1	0,50 2 – 3 2,5 - 3	(1) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto (2) Nello stesso appezzamento al massimo 1 intervento ogni 3 anni
<b>Pre semina Pre emergenza</b>	Graminacee	Tri-allate	45	3,6	Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
<b>Post emergenza</b>	Dicotiledoni	Fenmedifam	15,84	1,25 - 2,5	Eseguire dei saggi preliminari per verificare la selettività
	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop (1)	4,93 5 10,9 9,7	1 - 1,5 1 - 1,5 1,5 - 2,5 1	(1) 30 giorni di carenza  Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta