



DISERBO SPINACINO IN COLTURA PROTETTA ex IV GAMMA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	S-metolachlor (2) Metamitron	86,5 50	0,50 2 - 3	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sciolti (2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto
Pre semina Pre emergenza	Graminacee	Triallate	45	3,6	Al massimo 1 intervento per ciclo colturale
Post emergenza	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D Ciclossidim Propaquizafop (1)	4,93 10,9 9,7	1 - 1,5 1,5 - 2,5 1	(1) 30 giorni di carenza Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti quando consigliati in etichetta