



DISERBO FAGIOLO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Mono e Dicotiledoni	Acido Pelargonico	18,86	170	Utilizzare 830 litri di acqua ad ettaro per un totale di 1000 litri/ha di soluzione.
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	360 gr/litro		Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto (1) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) si dispone di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di coltura. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) S-Metolaclo Clomazone Benfluralin (2)	38,72 86,49 30,74 60	1,75 1 0,2 - 0,3 1,5	Meglio su terreno umido Distribuire su seme ben coperto (1) Da impiegare in alternativa a Benfluralin (2) Da impiegare in alternativa a Pendimetalin
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Imazamox (1) Imazamox + Bentazone	3,7 43,1 + 2	0,5 - 0,75 1,25	(1) Intervenire con la coltura a 2 - 4 foglie vere
	Dicotiledoni	Bentazone Pyridate	87 45,0	0,75 1,3 - 2	Coltura a 2 – 3 foglie vere
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop P etile	10,8 9,7 5,4	1,5 - 2,5 1 1 – 1,5	

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta