

DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.				
Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate (1) (2) (3) (4)	❖ (360 g/l)	9	❖ Dose in peso per litro comprendente formulati con diverse percentuali di principio attivo. (1) Superficie massima diserbabile, 33% dell'intera superficie. (2) Obbligo di localizzare l'intervento in bande lungo i filari. (3) Max 9 lt/anno/ha di superficie arborea in riferimento a formulati con 360 gr/lt. (4) Se si utilizza in miscela con erbicidi residuali, 1,8 lt./ha/anno in riferimento a formulati con 360 gr/lt.
	(Glifosate (2)+Diflufenican) (1)	25 + 4	2 – 3	(1) Interventi ammessi solamente nei primi 3 anni d'impianto, da effettuarsi sulla fila nel periodo compreso tra la raccolta e la fioritura. (2) Glifosate Max 1,8 lt./ha/anno in riferimento a formulati con 360 gr/lt indipendentemente dal prodotto utilizzato.
	(Flazasulfuron+Glifosate (2)) (1) Flazasulfuron (1) (3)	0,67 + 28,8 25	2,25 0,16	(1) Non ammesso su pomace, drupacee e mandorlo. (2) Glifosate Max 1,8 lt./ha/anno in riferimento a formulati con 360 gr/lt indipendentemente dal prodotto utilizzato. (3) Se distribuito in miscela estemporanea con glifosate utilizzare una dose di 60 g/litro.
	Isoxaben + Oryzalin (1) (2)	37,9	3,75 (3)	(1) Utilizzabile lungo la fila al massimo fino al 30% della superficie. (2) Non ammesso su olivo, mandorlo e agrumi. (3) Dose ad ettaro riferita alle piante in produzione
	Isoxaben + Oryzalin (1) (2)	37,9	5 (3)	(1) Utilizzabile lungo la fila al massimo fino al 30% della superficie. (2) Non ammesso su olivo, mandorlo e agrumi. (3) Dose ad ettaro riferita agli impianti non in produzione
	Oxifluorfen (1) (2) (3)	24,5	1,875	(1) Per gli agrumi, ammesso su tutte le specie. (2) Quando utilizzato in miscela impiegare dosi ridotte (0,3 – 0,5 litri/ha) (3) Max 1 intervento in alternativa con Pendimetalin e Diflufenican e nel limite del 30% della superficie della coltura

DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/ anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.				
Monocotiledoni e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	40,00	3	(1) Attivo solo sulle infestanti in fase di pre-emergenza. (2) Intervenire solo nel periodo invernale. (3) Non utilizzare sul mandorlo. (4) Non impiegare su terreni sabbiosi. (5) Non ammesso su olivo. (6) Interventi ammessi solamente nei primi 3 anni d'impianto, da effettuarsi sulla fila nel periodo compreso tra la raccolta e la fioritura. (7) Max 1 intervento in alternativa con Oxifluorfen e Diflufenican e nel limite del 30% della superficie della coltura
	Florasulam + Penoxulam	6,82 + 13,6	0,1	Intervento consentito da metà settembre a metà maggio.
	Carfentrazone (1) (2) (3) (4)	6,45	1	(1) Ammesso solo su melo, pero, pesco, susino, olivo, agrumi (2) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento (3) Efficace come spollonante ammesso su melo, pero e olivo; (4) Per i giovani impianti in allevamento è possibile innalzare la dose fino a 2 litri/anno;
Dicotiledoni	MCPA (1) (2)	20,5	3	(1) Non Ammesso su drupacee (2) Efficace su convolvolo
	Fluroxiypir (1) (2) (3) (4)	20,6	1,5	(1) Ammesso solo su agrumi, melo e olivo. (2) Utilizzare anche in presenza infestante di malva e/o rovo. (3) Non utilizzare su siepi di rovo posti a bordura dei campi. (4) Efficace su convolvolo.
	Diflufenican (1)	42	0,5	(1) Max 1 intervento in alternativa con Pendimetalin e Oxifluorfen e nel limite del 30% della superficie della coltura.
	Tribenuron metile (1) (2) (3)	50	0,025 – 0,040	(1) Ammesso solo su olivo. (2) Assicurarsi di non toccare germogli, fogliame basso e i polloni dell'olivo. (3) Utilizzabile solo dopo il quarto anno d'impianto

DISERBO DEI FRUTTIFERI (POMACEE, DRUPACEE, MANDORLO), DELL'OLIVO E DEGLI AGRUMI

Infestanti controllate	Sostanza attiva	% di S.a.	l o kg /ha/ anno	Limitazioni d'uso e note
La superficie effettivamente trattata deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva.				
Spollonante	Pyraflufen-ethile (1) (2)	2,5	0,8	(1) Non utilizzare su, Mandorlo e Agrumi. (2) Ammesso come spollonante (in alternativa al Carfentrazone).
Dicotiledoni	Pyraflufen-ethile (2)	2,5	0,25 - 0,3 (1)	(1) Dosi che devono essere considerate nell'utilizzo come sinergizzante (2) Non utilizzare su Mandorlo e Agrumi.
	Isoxaben (1) (2) (3)	45,5	1,2	(1) Utilizzabile lungo la fila al massimo fino al 30% della superficie. (2) Non ammesso su olivo, mandorlo e agrumi. (3) Consigliato l'utilizzo solo sino al 3° anno d'all'impianto o sulle forme di allevamento a parete.
Graminacee	Fluazifop-p-butile (1) (2) (3)	13,4	1	(1) Drupacee: non ammesso su albicocco e mandorlo; (2) Non utilizzare su terreni sabbiosi; (3) Massimo 1 intervento all'anno;
	Quizalofop P etile (4)	5,4	1 – 1,5	(4) Non ammesso su mandorlo e olivo.
	Propaquizafop (5)	9,6	0,8 – 1,5	(5) Non ammesso su olivo