

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre semina e trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate Glufosinate ammonio (1)	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	Applicare le dosi maggiori con malerbe sviluppate (1) Ammesso su cavolo rapa, cavoli cinesi, cavolfiore cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo capuccio
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Napropamide (2) Pendimetalin (3) Propaclar + Pendimetalin (3) Oxiadazon (4) Oxifluorfen	41,85 31,7 43,2+31,7 34,1 22	2 - 3 2 - 3 6 + 2 1,2 1,2	(2) Ammesso solo su cavolfiore e cavolo cappuccio (3) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione (4) Ammesso solo su cavolfiore
Post trapianto	Dicotiledoni	Clopiralid	75	0,15	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor	43,1	1,5 - 2	Trattare su infestanti che non abbiano superato la fase di plantula Trattare su terreno privo di infestanti nate
	Graminacee	Ciclossidim (*) Propanil (1) Quizalofop-etile isomero D (*) Quizalofop-p-etile (*) Fluazifop-p-butile	21 9,7 4,9 5 13,3	0,75 - 1,25 1 1 - 1,5 1 - 1,5 1-1,5	Verificare le autorizzazioni e i tempi di carenza nella tabella seguente

*in pieno campo e in coltura protetta