

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	% di s.a.	l. o Kg / ha	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,40 11,33	1.5 - 3.0 4 - 7	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pethoxamide Pendimetalin Oxadiazon Metribuzin Clomazone S-Metolaclor	60,00 31,7 34,10 35 31,40 86,49	2,00 1.0-2.0 1,5 0,5 0,25 - 0,30 1,25	Il Pendimetalin ha una buona azione su Polig. aviculare e Abutilon
Post emergenza	Dicotiledoni (1)	Tifensulfuron	75,0	0,01	
		Bentazone Imazamox (2)	87 3,4	1 - 1,5 0.6 - 1	Dominanza di Amaranto e Solanum Dominanza di Amaranto, Solanum e Abutilon
	Graminacee (1)	Ciclossidim	21,0	0,75 - 1,25	E' preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici
		Fenoxaprop-p-etile	6,77	1 - 1.5	
		Quizalofop-p-etile	5	1 - 1,5	
		Quizalofop-etile isomero D	4,9	1 - 1,5	
		Propaquizafop	9,7	1	
		Cletodim	25	0,6	

(1) Si consigliano interventi ripetuti utilizzando i dosaggi minori

(2) Si sconsiglia l'impiego dell'Imazamox in miscela con olio o solfato ammonico