

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,40 11,33	1.5 - 3 4 - 7	
Pre semina e Pre Trapianto	Graminacee annuali e numerosi Dicotiledoni	Oxadiazon (1) Benfluralin	25,5 19,2	1,5 6,50	(1) Non ammesso su radicchio e scarola
Pre emergenza	Graminacee	Pendimetalin	38,72	1 - 1,5	
Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40	6	
Pre Trapianto	Graminacee annuali e perenni e alcune Dicotiledoni	Propizamide	35,5	2,5 - 3,5	Attenzione per le colture successive (cereali vernini e pomodoro)
Post emergenza Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop etile isomero D Propaquizafop (2)	21,0 5 9,7	0,75 - 1,25 1 - 1,5 1	Per migliorare l'azione aggiungere gli attivanti consigliati in etichetta. gg. di carenza: 30 (2) Ammesso solo su cicoria e radicchio

*in pieno campo e in coltura protetta