

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	% di s.a.	l. o Kg / ha	NOTE
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate di ammonio	30,4 11,33	1.5 - 3.0 4 - 7	
Post emergenza precoce	Dicotiledoni	Diflufenican	42	0,3 - 0,35	
Post emergenza	Graminacee	Tralkoxidim	34,67	1,0	
		Diclofop-metile	27,3	2 - 2.5	
		Pinoxaden	10,0	0,4 - 0,45	
		Fenoxaprop-p-etile + specifico antidoto (1)	6,7	0,6 - 1	
		Clodinafop (2)	22,2	0.2 - 0.25	
	Dicotiledoni	Tifensulfuron	75	0,050 - 0,080	
		Metsulfuron metile	20	0.015 - 0.020	
		Tribenuron-metile	50	0.015 - 0,0225	
		Triasulfuron	20	0,037	
	Dicotiledoni con	(Iodosulfuron+Fenoxaprop-p-etile + Mefenpir-dietile) (2)	(0,78+6,22 + 2,33)	1,25	
		(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron metile) (2)	3 3	0,30	
	Galium e graminacee	(Iodosulfuron-metil sodium + Mesosulfuron metile) (2)	0,60 3	0,50	
	Veronica	Metribuzin (3) (2)	35	0,20	
	Dicotiledoni con Galium	Florasulam	4,84	0,1 - 0,125	
		Tribenuron-metile + MCP-P	(1,0 + 73,4)	1,090	
		(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	(2,3 + 26,7 + 6)	3	
		(Clopiralid + MCPA + Fluroxipyr)	(1,8 + 18,2 + 3,6)	4	
		Amidosulfuron	75	0,02 - 0,04	
		Fluroxipyr	17,16	0.8 - 1.0	

(1) Solo 1 formulato commerciale risulta registrato su orzo coltura sulla quale va utilizzato dalla terza foglia fino alla levata

(2) Non ammesso nel diserbo dell'orzo.

(3) Su alcune cvs possono provocare leggera fitotossicità

Si consiglia di utilizzare le solfoniluree secondo le dosi indicate senza adottare sottomisaghi anche per applicazioni in miscela con altri prodotti