

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre semina e trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate Glufosinate ammonio (1)	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	Applicare le dosi maggiori con malerbe sviluppate <b>(1) Ammesso su cavolo rapa, cavoli cinesi, cavolfiore cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles, cavolo cappuccio</b>
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin (3) Napropamide (1)	31,7 41,85	2 - 3 2 - 3	(3) Trattare su terreno finemente lavorato e con irrigazione <b>(1) Ammesso solo su cavolfiore e cavolo cappuccio</b>
Post trapianto e post emergenza	Dicotiledoni	Clopiralid	75	0,15	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor	43,1	1,5 - 2	Trattare su infestanti che non abbiano superato la fase di plantula
	Graminacee	Ciclossidim	21	0,75 - 1,25	<b>Verificare le autorizzazioni e i tempi di carenza nella tabella seguente</b>
		Propaquizafop	9,7	1	
		Quizalofop-etile isomero D	4,9	1 - 1,5	
		Quizalofop-p-etile	5	1 - 1,5	
		Fluazifop-P-Butile	13,3	1-1,5	