

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre-semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,40 11,33	1,5 - 3,0 4 - 7	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin Oxadiazon Flufenacet + Metribuzin S-Metolaclo	31,7 34,10 60 + 35 87,3	1,0-2,0 1,5 0,8 + 0,5 1,25	Il Pendimetalin ha una buona azione su Polig. aviculare e Abutilon
Post emergenza	Dicotiledoni (1)	Bentazone	87,0	1 - 1,5	Dominanza di Chenopodium e Abutilon
		Tifensulfuron	75,0	0,01	
		Oxasulfuron	75,0	0,1	
		Imazamox	3,4	0,6 - 1	Dominanza di Amaranto, Solanum e Abutilon
	Graminacee (1)	Ciclossidim	21,0	0,75 - 1,25	
		Fenoxaprop-p-etile	6,77	1 - 1,5	
		Quizalofop-etile isomero D	4,9	1 - 1,5	
		Propaquizafop	9,7	1	
		Cletodim	25	0,6	E' preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici

(1) Si consigliano interventi ripetuti utilizzando i dosaggi minori