

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre semina e trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,40 11,33	1,5 - 3 4 - 7	
Pre emergenza (1) Localizzato	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Metribuzin Aclonifen	35 49	0,15 - 0,25 1,5 - 2	Da soli o in miscela. Da escludere su terreni sabbiosi
Pre trapianto	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Aclonifen Metribuzin Oxadiazon Pendimetalin S-metolacolor	49 35 34,10 31,70 87,3	1,5 - 2 0,3 - 0,5 1 2 - 3 1 - 1,5	
Post emergenza (2) Localizzato	Graminacee annuali estive e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	0,03- 0,05	Da solo o in miscela con Metribuzin. Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti a basse dosi con eventuali applicazioni ripetute
		Metribuzin	35	0,2 - 0,5	In presenza di Portulaca la dose può salire fino a Kg. 1 per ettaro
	Graminacee	Ciclossidim Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Fenoxaprop-p-etile Propaquizafop Cletodim	21 4,9 5 6,77 9,7 25	0,75 - 1,25 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,5 1 0,6	

**(1) Il diserbo di pre emergenza deve essere localizzato sulla fila.
 L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie**

Es. In un ettaro di pomodoro, in pre-emergenza, non si possono utilizzare più di l. 1 di Aclonifen, l. 0,2 di Metribuzin ecc.

(2) Si consigliano interventi localizzati sulla fila