

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZE ATTIVE	% di s.a.	L. o Kg / ha	Note
Pre-semina (Programma A)	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	
Pre-emergenza (Programma B)	Prevalenza crucifere e Fallopia Prevalenza Polygonum aviculare	Cloridazon (1) Metamitron Lenacil Ethofumesate	65 70 80 44,64	3,0 - 4,0 3,0 - 4,0 0,3 - 0,5 1,5 - 2	Possibile la miscela tra i diversi prodotti. La somma delle dosi dei prodotti singoli deve risultare nel complesso ridotta del 30 %.
Post-emergenza con dosi crescenti (Programma C)	Dicotiledoni e Graminacee Prevalenza Polygonum aviculare Prevalenza crucifere e Fallopia	Fenmedifan Ethofumesate (Fenmedifam + Desmedifam + + Ethofumesate) (Fenmedifam + Desmedifam + + Ethofumesate) Metamitron Cloridazon (1)	15,9 21,1 (5,9 + 1,5 + 12,2) (7,58+2,53+ + 15,15) 70 65	1 - 2 0,7 1,0 - 1,5 1,2 0,6 - 1,5 0,6 - 1,5	In base allo sviluppo delle colture e delle infestanti, è possibile ripetere gli interventi con dosi che non possono superare quelle riportate nel programma (D)
Post-emergenza per la risoluzione di casi particolari (Programma D)	Problemi di Polygonum aviculare Problemi di Cuscuta Problemi di Cirsium Abutilon, Ammy m., Cruc., Girasole Graminacee	Lenacil Propizamide Clopiralid Triflusaluron-methyl Ciclossidim Quizalofop-etile isomero D Fenoxaprop-p-etile Propaquizafop	80 35 75 50 21 4,9 6,77 9,7	0,1 - 0,2 1,0 - 1,5 0,15 0,04 0,75 - 1,25 1 - 1,5 1 - 1,5 1,0	Programma D).Prodotti da utilizzare per interventi singoli o in combinazione con i prodotti indicati nei programmi C per contenere infestanti "particolari"

(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni