

EPOCA D'IMPIEGO	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di s.a.	l. o Kg / ha	Note
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio	30,40 11,33	1.5 - 3 4 - 7	
Pre Emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Glufosinate ammonio	11,33	4 - 7	Il più possibile lontano dall'emergenza
	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin	35	0.4 - 0.6	Non impiegare per le patate primaticcie se dopo si coltiva lo spinacio
		Pendimetalin Metazaclor Aclonifen Clomazone	31,70 43,50 49,00 31,4	2 - 3 1 - 1,5 1,5 - 2 0,3	
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	0.03 - 0.05	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute
		Metribuzin	35	0.2 - 0.4	
	Graminacee	Propaquizafop Fenoxaprop-p-etile	9,70 6,77	1 1 - 1.5	Usando Rimsulfuron impiego non strettamente necessario
Pre Raccolta	Disseccamento Parte aerea	Glufosinate ammonio	11,33	4 - 7	Impiegabile a non più di 5 gg dalla raccolta