

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S. A. E AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
CRITTOGAME Fusariosi (<i>Fusarium</i> spp.)	<u>Interventi chimici:</u> - Concia del seme		Consigliata la concia delle sementi
Elmintosporiosi (<i>Drechslera oryzae</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - Tra la botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei bollettini provinciali	Azoxystrobin	Consigliata la concia delle sementi Sulla coltura ammesso 1 solo intervento all'anno con fungicidi, indipendentemente dalle avversità.
Brusone delle foglie (<i>Pyricularia oryzae</i>)	<u>Interventi chimici:</u> - Tra la botticella e fine spigatura in base alle indicazioni dei Bollettini provinciali <u>Interventi agronomici:</u> - Fare uso di varietà tolleranti - Evitare somministrazioni eccessive di azoto - Evitare semine troppo ritardate - Evitare semine troppo fitte	Azoxystrobin	Consigliata la concia delle sementi Sulla coltura ammesso 1 solo intervento all'anno con fungicidi, indipendentemente dalle avversità.
FITOFAGI CROSTACEI Coppette (<i>Triops cancriformis</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - Asciutta		
INSETTI Ditteri Chironomidi (<i>Chironomus</i> spp., <i>Cricotopus</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - Asciutta		
Ditteri Efrididi (<i>Hidrella griseola</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> - Asciutta		Non sono ammessi interventi chimici
VERMI Vermi di risaia (<i>Brachiura</i> spp.)	<u>Interventi agronomici:</u> - Asciutta		Non sono ammessi interventi chimici