

Controllo integrato delle infestanti di: SOIA

| EPOCA          | INFESTANTI                      | SOSTANZA ATTIVA            | % di S.a. | l o kg /ha  | NOTE  |
|----------------|---------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---|
| Pre semina     | Graminacee                      | Glifosate                  | 30,4      | 1,5 - 3     |   |
|                | Dicotiledoni                    | Glufosinate ammonio        | 11,33     | 4 - 7       |   |
| Pre emergenza  | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Pethoxamide                | 60        | 2           | Il Pendimetalin ha una buona azione su <i>Polygonum aviculare</i> e <i>Abutilon</i>         |
|                |                                 | Pendimetalin               | 31,7      | 1 - 2,5     |   |
|                |                                 | Oxadiazon                  | 34,1      | 1,5         |   |
|                |                                 | Metribuzin                 | 35        | 0,5         |   |
|                |                                 | Clomazone                  | 31,4      | 0,25 - 0,30 |   |
|                |                                 | S-Metolaclor               | 86,49     | 1,25        |   |
| Post emergenza | Dicotiledoni<br>(1)             | Bentazone                  | 87        | 1 - 1,5     | Dominanza di <i>Chenopodium</i> e <i>Abutilon</i>   |
|                |                                 | Tifensulfuron metile       | 75        | 0,01        |   |
|                |                                 | Oxasulfuron                | 75        | 0,1         | Dominanza di Amaranto, <i>Solanum</i> e <i>Abutilon</i>                                     |
|                |                                 | Imazamox (2)               | 3,7       | 0,6 - 1     |   |
|                | Graminacee<br>(1)               | Ciclossidim                | 10,9      | 1,5 - 2,5   | E' preferibile che i graminicidi non siano impiegati in miscela con prodotti dicotiledonici |
|                |                                 | Fenoxaprop-p-etile         | 6,77      | 1 - 1,5     |   |
|                |                                 | Quizalofop-p-etile         | 5         | 1 - 1,5     |   |
|                |                                 | Quizalofop-etile isomero D | 4,9       | 1 - 1,5     |   |
|                |                                 | Propaquizafop              | 9,7       | 1           |   |
|                |                                 | Cletodim                   | 25        | 0,6         |   |

(1) Si consigliano interventi ripetuti utilizzando i dosaggi minori

(2) Si sconsiglia l'impiego dell'Imazamox in miscela con olio o solfato ammonico