

Controllo Integrato delle infestanti dei CAVOLI A TESTA

CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO CAPPuccio (Cavolo cappuccio appuntito), CAVOLO ROSSO, CAVOLO BIANCO, CAVOLO VERZA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di S.a.	l o Kg /ha	NOTE
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5-3	
		Glufosinate ammonio	11,33	4 - 7	
Pre trapianto	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Napropamide (1)	41,85	2 - 3	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio.
		Oxifluorfen	23,6	1,5-2,5	(2) Attività contro dicotiledoni.
		Clopiralid (2)	75	0,16	
		Pendimetalin	31,7	2 - 3	
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop (1)	9,7	1	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio.
		Quizalofop p etile isomero D (1)	5	1 – 1,5	(2) Non ammesso su cavolo di Bruxelles.
		Quizalofop p etile	5	1 – 1,5	
		Cicloxidim (2)	21	1-1,5	
		Metazaclopr	43,5	1,5	
	Dicotiledoni	Clopiralid	75	0,16	