

Controllo Integrato delle infestanti di: LATTUGA IN COLTURA PROTETTA

**LATTUGHINO (Lattuga da taglio destinata alla IV gamma) E LATTUGA A CESPO IN COLTURA PROTETTA**

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di s.a	l o Kg / ha	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate Ammonio Benfluralin	30,1 11,33 19,2	1,5 – 3 4 - 7 5 - 6	
Post semina	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide	36,5	2,5 - 3,5	Entro 15 gg. dalla semina
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Oxadiazon	25,5	1,5	
Pre trapianto	Graminacee e alcune Dicotiledoni	Propizamide	36,5	2,5 - 3,5	Attenzione alle colture in successione
Pre emergenza Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	4	
Post trapianto	Graminacee	Propaquizafop Cicloxidim Fluazifop-P-Butile	9,7 10,9 13,4	1 2,5 1,5	
Post emergenza	Monocotiledoni e Dicotiledoni provenienti da seme	Clortal-dimetile	75	6	