

Controllo Integrato delle infestanti della PATATA

EPOCA	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA	% di S.a.	l o Kg /ha	NOTE
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate ammonio Napropamide	30,4 11,33 41,85	1,5 - 3 4 - 7 2,2	
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Glufosinate ammonio	11,33	4 - 7	Il più possibile lontano dall'emergenza
		Metribuzin	35	0,4 - 0,6	Non impiegare per le patate primaticce se dopo si coltiva lo spinacio.
		Pendimetalin	31,7	2 - 3	
		Metazaclo	43,5	1 - 1,5	
		Aclonifen	49	1,5 - 2	
		Clomazone Flufenacet	31,4 60	0,3 0,6 - 0,85	
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron	25	0,02 - 0,04	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute.
		Metribuzin	35	0,2 - 0,4	
	Graminacee	Propaquizafop	9,7	1	Usando Rimsulfuron impiego non strettamente necessario.
		Ciclossidim Fenoxaprop-p-etile	21 6,77	0,75 1,25 1 - 1,5	
Pre - raccolta	Disseccamento della parte aerea	Glufosinate ammonio (1)	11,33	4-7	<b>(1) Impiegabile a non più di 5 gg dalla raccolta.</b>
		Carfentrazone etile (2)	6,45	1	<b>(2) Impiegabile a non più di 5 - 7 gg dalla raccolta.</b>