

AVVERSITA'	CRITERI D'INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
<b>Cancro</b> ( <i>Phomopsis diospyri</i> )	<b><u>Interventi agronomici:</u></b> Taglio e bruciatura degli organi infetti  <b><u>Interventi chimici:</u></b> In presenza di sintomi intervenire a caduta foglie	Prodotti rameici	
<b>FITOFAGI</b> <b>Sesia</b> ( <i>Synanthedon typuliformis</i> )	<b><u>Interventi agronomici:</u></b> Rimuovere le parti corticali alterate ospitanti le larve e chiudere con paste cicatrizzanti  <b><u>Interventi chimici:</u></b> In maggio giugno e agosto settembre intervenire con 10 - 15% di piante infestate nella fase di sfarfallamento degli adulti	Olio minerale  Nematodi entomopatogeni	
<b>Mosca della frutta</b> ( <i>Ceratitis capitata</i> )	<b><u>Interventi chimici:</u></b> <b>Trattare solo in presenza di ovodeposizioni</b> In caso di catture controllare la presenza di punture. Si consiglia di installare trappole cromotropiche di colore giallo (tipo Rebell) innescate con Trimedlure.	Piretro naturale  Etofenprox (1)  Spinosad (2)	<b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b> <b>(2) Applicazioni con specifica esca pronta all'uso.</b> <b>(2) Al massimo 5 applicazioni all'anno</b>
<b>Cocciniglia</b> ( <i>Ceroplastes rusci</i> )	<b><u>Soglia di intervento:</u></b> <b>Intervenire solo in caso di presenza diffusa</b>	Olio minerale	
<b>Metcalfa</b> ( <i>Metcalfa pruinosa</i> )	<b><u>Interventi chimici:</u></b> <b>Presenza</b>	Etofenprox (1)	<b>Contro questa avversità al massimo 1 intervento all'anno</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>