

AVVERSITA'	CRITERI DI INTERVENTO	S.a. e AUSILIARI	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<b>CRITTOGAME</b>			
<b>Muffa grigia</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - razionali concimazioni azotate; - allevare 4-5 tralci per ceppo; - adottare ampie distanze tra le file per favorire l'aerazione della massa fogliare; - asportare dall'appezzamento i residui della vegetazione estiva.	(Pyraclostrobin + Boscalid) (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno.</b>
<b>Antracnosi</b> ( <i>Elsinoe veneta</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto.	Prodotti rameici	<b>Interventi autunnali.</b>
<b>Ruggine</b> ( <i>Phragmidium</i> spp.)		Prodotti rameici	<b>Interventi autunnali.</b>
<b>FITOFAGI</b>			
<b>Antonomo</b> ( <i>Anthonomus rubi</i> ) <b>Verme dei frutti</b> ( <i>Byturus tomentosus</i> )		Etofenprox (1)	<b>(1) Al massimo 1 intervento all'anno.</b>
<b>Mosca dei tralci</b> ( <i>Lasioptera rubi</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - asportare i tralci colpiti e distruggerli.	Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno</b>
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis ruborum</i> , <i>Amphorophora rubi</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di azoto.	Etofenprox (1)	<b>(1) Al massimo 1 intervento all'anno.</b>
<b>Eriofide</b> ( <i>Acalitus essigi</i> )	<b>Interventi chimici:</b> <b>Intervenire in caso di forti attacchi verificatisi sulla coltura nell'anno precedente.</b>	Zolfo bagnabile	<b>Su prescrizione del tecnico; interventi alla ripresa vegetativa.</b>
<b>Virosi</b>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di materiale di propagazione sano; - adottare razionali rotazioni colturali.		