

| AVVERSITA'   | CRITERI DI INTERVENTO  | S.a. e AUSILIARI     | LIMITAZIONI D'USO E NOTE  |
|--|--|----------------------|---|
| <b>CRITTOGAME</b>  |  |                      |   |
| <b>Peronospora</b><br>( <i>Peronospora brassicae</i> )   | <u><b>Interventi agronomici:</b></u><br>- adottare ampi avvicendamenti colturali;<br>- impiegare seme sano;<br>- allontanare le piante ammalate.<br><u><b>Interventi chimici:</b></u><br>- in caso di attacchi precoci.                        | Prodotti rameici     |   |
| <b>Alternariosi</b><br>( <i>Alternaria raphani</i> )   | <u><b>Interventi agronomici:</b></u><br>- impiego di seme sano;<br>- adottare ampi avvicendamenti colturali;<br>- allontanare i residui di piante infette.<br><u><b>Interventi chimici:</b></u><br>- in presenza di sintomi.                   | Prodotti rameici     |   |
| <b>FITOFAGI</b>  |  |                      |   |
| <b>Mosca del cavolo</b><br>( <i>Delia radicum</i> )  |  |                      |   |
| <b>Afidi</b>   | <u><b>Interventi chimici:</b></u><br><b>- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata.</b>  | Lambdacialotrina (1) | <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> |
| <b>Nottue fogliari</b>   | <u><b>Interventi chimici:</b></u><br><b>- intervenire solo in caso di infestazione generalizzata.</b>  | Lambdacialotrina (1) | <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> |
| <b>Altica</b><br>( <i>Phyllotreta</i> spp.)  | <u><b>Interventi chimici:</b></u><br>- intervenire in caso di infestazione generalizzata nelle prime ore del mattino.  | Piretro naturale     |   |
| <b>Limacce</b><br>( <i>Helix</i> spp)<br>( <i>Cantareus aperta</i> )<br>( <i>Helicella variabilis</i> )<br>( <i>Limax</i> spp.)<br>( <i>Agriolimax</i> spp.) | <u><b>Interventi chimici:</b></u><br>Trattare alla comparsa  | Metaldeide esca      | <b>Distribuire le esche lungo le fasce interessate</b>                        |
| <b>Nematodi a cisti</b><br>( <i>Heterodera schachtii</i> )   | <u><b>Interventi agronomici:</b></u><br>- il ravanello è una pianta ospite di <i>H. schachtii</i> e quindi non può essere coltivata in avvicendamenti con la barbabietola da zucchero;<br>- utilizzare terreni esenti da <i>H. schachtii</i> . |                      |   |