

Allegato n. 1 DGR 135/10 REVISIONE DISCIPLINARI DI PRODUZIONE INTEGRATA PER LA SOTTOMISURA F.2 (6.2) PER L'ANNO 2010

I testi completi dei Disciplinari di Produzione Integrata relativi alla sottomisura F.2 (6.2) del PSR per l'anno 2010 saranno consultabili e scaricabili sul sito www.agriligurianet.it

Le tabelle relative al controllo degli infestanti e alle tecniche di difesa presenti nei Disciplinari di Produzione Integrata anno 2009 per le colture:

- seminativi e foraggere,
- vite da vino
- olivo
- piante ornamentali poliennali che producono foglie, fronde, fronde con frutto e fronde con fiori

vengono modificate secondo quanto di seguito previsto. Per il castagno, i prati e pascoli e la lavanda ad uso erboristico non sono state fatte modifiche pertanto per l'anno 2010 restano valide le tabelle di difesa e diserbo dell'anno 2009.

SEMINATIVI E FORAGGERE:

DIFESA MAIS: contro Elateridi sostituire Clotianidin e Imidacloprid con Teflutrin e Clorpirifos con la nota "solo per la concia dei semi".

Contro Piralide e Nottue terricole eliminare Bifentrin.

DIFESA FRUMENTO: aggiungere contro Septoria Azoxystrobin

DISERBO FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALÉ, TRITICALE: eliminare Carfentrazone-etile.

DISERBO SOIA in pre-emergenza aggiungere Clomazone (31.4% , 0.25-0.30 l o kg/ha) e Petoxamide (60% , 2 l o kg/ha)

DISERBO SORGO. Togliere Propaclar

DISERBO FAVINO in post emergenza si usa Propaquizafop 9.7 % (1 l o kg/ha), in post-emergenza precoce Fenoxaprop-p-etile 6.6% (1 l o kg/ha).

VITE DA VINO

Contro peronospora aggiungere Mandipropamide con note **(9) Al massimo 3 interventi all'anno. Se usato insieme al Mancozeb non più di 2 interventi all'anno.(10) Al massimo 4 interventi all'anno con questi 3 prodotti**

Contro Raghetto rosso aggiungere Etoxazole con nota "Nei limiti previsti per la difesa degli acari".

Contro Cicaline aggiungere *Beauveria Bassiana* e sali di potassio degli acidi grassi.

Contro Cicaline, Cocciniglie e Scafoideo togliere Buprofezin.

OLIVO

Contro mosca delle olive aggiungere *Beauveria Bassiana* e Imidacloprid.

Contro Cocciniglia togliere Buprofezin.

Contro Margarona aggiungere Fosmet con nota "Solo su impianti giovani non in produzione".

Per le piante ornamentali poliennali che producono foglie, fronde, fronde con frutto e fronde con fiori si sostituiscono le tabelle presenti nel disciplinare del 2009 con le tabelle di difesa e diserbo presentate in allegato n. 2 al presente documento.