

DISERBO CAROTA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre Semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate Glufosinate - ammonio	30,4 11,33	1,5 - 3 4 - 7	Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee annuali e Dicotiledoni	Glufosinate - ammonio Pendimetalin (1) Aclonifen Linuron Clomazone Clorprofam	11,33 31,7 49 37,6 31,4 40,8	4 - 7 2 - 3 2 0,5 - 1 0,25 - 0,3 4 - 6	(1) Non utilizzare in terreni sabbiosi
Post emergenza	Dicotiledoni annuali	Pendimetalin (1) (2) Linuron (2) (3) Metribuzin (2)	31,7 37,6 35	2 - 3 0,5 - 1 0,5	1) Non utilizzare in terreni sabbiosi (2) Intervenire con carota a 3 – 4 foglie vere (3) Le dosi più basse possono essere utilizzate in post emergenza precoce con interventi ripetuti
	Graminacee	Quizalofop-etile isomero D Quizalofop-p-etile Ciclossidim Propaquizafop	4,9 5 21 9,7	1 - 1,5 1 - 1,5 0,75 – 1,25 1	