

## DISERBO DELLA VITE

<i>Infestanti controllate</i>	<i>Criteri di intervento</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha/anno</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Graminacee e Dicotiledoni	<b>AGRONOMICO:</b> -Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. <b>CHIMICO:</b> -Non ammessi interventi chimici nelle interfile; -Interventi localizzati sulle file, operando con microdosi su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. -Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2; -Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%).	Glifosate Glufosinate ammonio Oxifluorfen (1) Flazasulfuron (2) (3) (4)	30,4 11,33 22,9 25	7,5 18 1 0,07	Le dosi si intendono per ettaro di superficie effettivamente trattata, che deve essere sempre inferiore o uguale al 50% della superficie complessiva Ammesso l'uso proporzionale della combinazione delle s.a. ammesse (1) Da utilizzarsi a dosi ridotte (l 0,3 - 0,45 per intervento) in miscela con i prodotti sistemici (2) Non ammesso in terreni sabbiosi (3) Ammesso solo ad anni alterni per un massimo di 1 intervento all'anno, in miscela con prodotti sistemici, nel periodo fine inverno – inizio primavera (4) Interventi solo sulla fila; indicati per il contenimento delle infestanti che possono favorire la presenza di vettori del “legno nero”
Graminacee annuali		Cicloxidim	10,9	2 - 4	Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
Dicotiledoni	<b>CHIMICO:</b> -Solo nelle aree colpite da giallumi della vite; -Solo sulle file interventi localizzati nelle zone infestate da Ortica e Convolvolo.	MCPA	25	1,5	Interventi a fine estate - inizio autunno Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.
Dicotiledoni	<b>CHIMICO:</b> -Non ammessi interventi chimici nelle interfile;	Carfentrazone (1) (2)	6,45	1	(1) Al massimo 0,3 l/ha per ciascun intervento (2) Efficace anche come spollonante
Graminacee perenni	<b>CHIMICO:</b> Interventi chimici solo nei primi 2 anni di allevamento	Cicloxidim	10,9	2 - 4	Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare il 50% dell'intera superficie.

