

**DISERBO CAVOLFIORE E CAVOLO BROCCOLO**

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina e Pre trapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	30,4	1,5 - 3	<b>Trattamenti al terreno in assenza di colture</b> Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Pre trapianto</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Oxifluorfen Oxadiazon (1) Napropamide (2) Pendimetalin (3)	43,2 22,9 34,1 41,85 31,7	6 1,5 - 2,5 1,2 2 - 3 2 - 3	<b>(1) Ammesso solo su cavolfiore</b> <b>(2) Ammesso solo su cavolfiore</b> <b>(3) 100 giorni di carenza</b>
<b>Post - trapianto</b>	Dicotiledoni annuali	Clopiralid	9	1,2 - 1,5	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazaclor (1)	43,10 43,2	1,5 6	<b>(1) Trattare su infestanti che non abbiano superato la fase di plantula</b> (
	Graminacee	Cicloxidim (1) Propaquizafop (2) Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D (1) Diclofop - metile (3) Fluazifop-p-butile	21 9,7 5 4,9 26 13,3	0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5 2,5 - 3 1 - 1,5	<b>(1) Ammesso solo su cavolfiore</b> <b>(2) Ammesso solo su broccoli</b> <b>(3) Non utilizzare formulati classificati Xn</b>