

FLORICOLE ED ORNAMENTALI

Scheda

1 – Floricole ed ornamentali

La presente scheda tecnica DIFESA e DISERBO include le seguenti schede tecniche AGRONOMICHE:

1 - Fiore e fronda recisa in serra su terreno

2 - Fiore e fronda recisa in serra su substrato (fuori suolo)

3 - Verdi in vaso in serra

4 - Vaso fiorito in serra

5 - Vaso fiorito in piena aria

6 - Fiore reciso in piena aria

7 - Fronde recise in piena aria

8 - Conifere su terreno

9 - Conifere in vaso

10 - Erbacee perenni in contenitore

11 - Latifoglie e arbusti su terreno

12 - Latifogli e arbusti in contenitore

13 - Tappeti erbosi

SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
MALATTIE FUNGINE				
Peronospora (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Peronospora spp.</i>)		Composti rameici Benalaxil Cimoxanil* Dodina Propamocarb Dimetomorf*		* Autorizzazioni di etichetta limitate Cimoxanil autorizzato solo su rosa Dimetomorf autorizzato solo su gerbera e garofano
Marciumi basali e radicali (<i>Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium spp.</i>)		<i>Streptomyces griseoviridis</i> * <i>Tricoderma spp</i> <i>Coniothyrium mimitans</i> Dimetomorf * Fosetil alluminio * Metalaxil-M (Fenilammidi) (1) Benalaxil (Fenilammidi) (1) Propamocarb		(1) Fenilammidi al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità * Autorizzazioni di etichetta limitate <i>Streptomyces griseoviridis</i> autorizzato solo su ciclamino, gerbera e garofano Dimetomorf autorizzato solo su garofano e gerbera, contro <i>Phytophthora spp.</i> Fosetil alluminio autorizzato solo su ornamentali
Marciumi (<i>Sclerotinia spp.</i> , <i>Rizoctonia spp.</i> , <i>Corticium spp.</i>)		<i>Tricoderma spp</i> <i>Coniothyrium mimitans</i> Procloraz * Mancozeb * Toclofos-metil (2)		(2) Toclofos metil al massimo 1 trattamento per ciclo culturale * Autorizzazioni di etichetta limitate Procloraz autorizzato solo su rosa e garofano Mancozeb autorizzato solo in pieno campo su garofano e rosa

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

* N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Fusariosi (<i>Fusarium spp</i>) Tracheoverticillosi (<i>Verticillum spp.</i>)		<i>Streptomyces griseoviridis</i> * <i>Tricoderma spp</i>		* Autorizzazioni di etichetta limitate <i>Streptomyces griseoviridis</i> autorizzato solo su ciclamino, gerbera e garofano
Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Oidium chrisanthemi</i> <i>O. tabaci</i> ecc.)		<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Bupirimate* Bitertanolo (IBE) (3) Miclobutanil* (IBE) (3) Penconazolo (IBE) (3) Propiconazolo* (IBE) (3) Difenoconazolo* (IBE) (3) Tetraconazolo* (IBE) (3) Trifloxystrobin* Procloraz*		(3) IBE al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Bupirimate autorizzato solo su rosa Miclobutanil autorizzato solo su rosa e garofano Propiconazolo autorizzato solo su rosa Difeconazolo autorizzato solo su rosa e garofano Tetraconazolo autorizzato solo su rosa,gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera,garofano, hypericum, pelargonio Trifloxystrobin autorizzato solo su rosa Procloraz autorizzato solo su rosa e garofano
Ruggine (<i>Phragmidium spp.</i> , <i>Uromyces caryophyllinus</i> , ed altre)		Composti rameici Bitertanolo (IBE) (3) Miclobutanil * (IBE) (3) Penconazolo (IBE) (3) Tetraconazolo * (IBE) (3) Mancozeb * Metiram * Dithianon		(3) IBE al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Miclobutanil autorizzato solo su rosa e garofano Tetraconazolo autorizzato solo su rosa,gladiolo, diffenbachia, ficus, crisantemo, bocca di leone, altea, astro, gerbera,garofano, hypericum, pelargonio Mancozeb autorizzato solo in pieno campo su garofano e rosa Metiram autorizzato solo su garofano

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)		<i>Bacillus subtilis</i> Dithianon Cyprodinil+Fludioxonil * (1) Pyrimethanil * Procloraz * Mancozeb *		(1) <u>Cyprodinil+Fludioxonil</u> al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale; autorizzato solo su floricole * <u>Autorizzazioni di etichetta limitate</u> <u>Cyprodinil+Fludioxonil</u> autorizzato solo su floricole <u>Pyrimetanil</u> autorizzato solo su ciclamino <u>Procloraz</u> autorizzato solo rosa e garofano <u>Mancozeb</u> autorizzato solo in pieno campo, solo garofano e rosa
Alternaria		Composti rameici Dodina (4) Clortalonil (5)		(4) <u>Dodina</u> verificare la fitotossicità (5) <u>Clortalonil</u> al massimo 2 interventi per ciclo culturale
Septoria		Composti rameici Dodina (4) Clortalonil (5)		(4) <u>Dodina</u> verificare la fitotossicità (5) <u>Clortalonil</u> al massimo 2 interventi per ciclo culturale
Cladosporiosi		Dodina (4) Clortalonil (5)		(4) <u>Dodina</u> verificare la fitotossicità (5) <u>Clortalonil</u> al massimo 2 interventi per ciclo culturale
Antracnosi		Composti rameici Dodina (4) Clortalonil (5) Dithianon		(4) <u>Dodina</u> verificare la fitotossicità (5) <u>Clortalonil</u> al massimo 2 interventi per ciclo culturale

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Ticchiolatura (<i>Diplocarpon rosae</i> <i>Venturia spp</i> <i>Fusicladium spp.</i>)		Composti rameici Miclobutanil * (IBE) (3) Dithianon Dodina (4)		(4) Dodina verificare la fitotossicità (3) IBE al massimo 3 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Miclobutanil autorizzato solo su rosa e garofano
Cancro del cipresso (<i>Seridium cardinale</i>)	3	Tiofanate metil (1)		Solo piante ornamentali in vivaio (1) Tiofanate metil al massimo 3 trattamenti anno, indipendentemente dall'avversità.
Batteriosi (<i>Erwinia spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> Altre)		Composti rameici		

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
FITOFAGI				
Afidi (<i>Aphis gossipy</i> <i>Macrosiphoniella chrysanthemi</i> <i>Macrosiphum</i> spp. <i>Myzus</i> spp. <i>Rhopalosiphum padi</i>)		<i>Aphidius colemani</i> <i>Lysiphlebus testaceipes</i> Olio minerale Azadiractina Piretro naturale * Alfamestrina * (Piretroidi) (1) Bifentrin (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Imidacloprid (Neonicotinoidi) (2) Thiamethoxan (Neonicotinoidi) (2) Pirimicarb Pymetrozine (3)	Soglia. Alla comparsa delle prime colonie	(1) Piretroidi : al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi : al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità (3) Pymetrozine al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale * Autorizzazioni di etichetta limitate Alfamestrina, Cipermetrina, Fluvalinate divieto d'impiego in serra Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Tripidi (<i>Thrips</i> spp. <i>Heliothrips</i> spp. <i>Frankliniella occidentalis</i>)		<i>Macrolophus caliginosus</i> Azadiractina Olio minerale Piretro naturale * <i>Beauveria bassiana</i> Alfamestrina * (Piretroidi) (1) Acrinatrina (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina* (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Zeta-cipermetrina (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Flufenoxuron Lufenuron Spinosad * (4)	Soglia. Installare trappole cromotropiche di colore azzurro. Intervenire alle prime catture.	(1) Piretroidi : al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi : al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità (4) Spinosad al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Alfamestrina, Cipermetrina, Fluvalinate divieto d'impiego in serra Spinosad autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali Flufenoxuron autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Aleurodidi (<i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporarum</i>)		<i>Encarsia spp.</i> Olio minerale <i>Beauveria bassiana</i> Piretro naturale * Azadiractina Alfamestrina * (Piretroidi) (1) Bifentrin (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1) Deltamestrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Acetamiprid (Neonicotinoidi) (2) Imidacloprid (Neonicotinoidi) (2) Thiamethoxan (Neonicotinoidi) (2) Diflubenzuron Flufenoxuron * Pymetrozine(3)	Soglia. ISTALLARE trappole cromotropiche di colore giallo. Intervenire alle prime catture.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi: al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità (3) Pymetrozine al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale * Autorizzazioni di etichetta limitate Alfamestrina, Fluvalinate divieto d'impiego in serra Flufenoxuron autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Cicaline (<i>Tiphocyba rosae</i>)		Olio minerale Azadiractina Piretro naturale Flufenoxuron (1)	Soglia. • In vivaio, alla presenza; • in serra, solo su forti infestazioni.	* Autorizzazioni di etichetta limitate Flufenoxuron autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Cocciniglie		Olio minerale Clorpirifos metil * (Fosfororganico) (5) Clorpirifos (Fosfororganico) (5) Imidacloprid (Neonicotinoidi) (2)	Soglia. Presenza	(5) Fosfororganici: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi: al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità * Autorizzazioni di etichetta limitate Clorpirifos metil autorizzato solo su garofano, crisantemo, azalea, ciclamino

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Psille		Olio minerale Piretro naturale	Soglia. Presenza	* Autorizzazioni di etichetta limitate Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)	1	Olio minerale Piretro naturale * Etofenprox (Piretroidi) (1) Imidacloprid (Neonicotinoidi) (2) Spinosad * (4)	Soglia. Forti infestazioni in atto.	(1) Piretroidi : al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi : al massimo 1 trattamento per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità (4) Spinosad al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Spinosad autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Tortricidi e Bega del Garofano (<i>Epichoristodes acerbella</i> <i>Tortrix pronubana</i> Altre)		<i>Bacillus thuringensis</i> Alfametrina * (Piretroidi) (1) Bifentrin (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Etofenprox (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Spinosad * (4) Diflubenzuron Clorpirifos (Fosfororganico) (5)	Soglia. - Installare trappole a feromoni se reperibili in commercio ed intervenire dopo il picco di volo. - Se le trappole non sono disponibili intervenire alla comparsa dei primi danni.	(1) Piretroidi : al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. (5) Fosfororganici : al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Spinosad autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali Alfametrina, Fluvalinate divieto d'impiego in serra

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Nottue fogliari (<i>Agrotis</i> spp. <i>Spodoptera</i> spp.)		<i>Bacillus thuringensis</i> Etofenprox (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1) Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Diflubenzuron Spinosad * (4) Triflumuron	Soglia. - Installare trappole a feromoni se reperibili in commercio ed intervenire dopo il picco di volo. - Se le trappole non sono disponibili intervenire alla comparsa dei primi danni.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Spinosad autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali Cipermetrina, Fluvalinate divieto d'impiego in serra
Elateridi (<i>Agriotes</i> spp)		Teflutrin *	Soglia. Presenza di danni sulla coltura precedente o infestazione in atto.	* Autorizzazioni di etichetta limitate Teflutrin solo pieno campo, trattamenti al terreno.
Maggiolini (<i>Melolontha melolontha</i>)		Teflutrin * Cipermetrina * (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1) Ciflutrin (Piretroidi) (1)	Soglia. Presenza di danni sulla coltura precedente o infestazione in atto	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Teflutrin solo pieno campo, trattamenti al terreno. Cipermetrina divieto d'impiego in serra
Cetonie		Piretro naturale * Ciflutrin (Piretroidi) (1) Deltametrina (Piretroidi) (1)	Soglia. Infestazioni in atto.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Oziorrinco		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema feltiae</i> e <i>Heterorhabditis spp.</i> Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Clorpirifos (Fosfororganico) (5) Clorpirifos metil * (Fosfororganico) (5)	Soglia. Infestazioni in atto. Nematodi entomoparassiti. Intervenire contro le larve nel terreno in autunno o in primavera. Chimico. Intervenire solo sugli adulti nel periodo estivo alla comparsa delle prime mangiature fogliari nelle ore crepuscolari o notturne	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (5) Fosfororganici: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Fluvalinate divieto d'impiego in serra Clorpirifos metil autorizzato solo su garofano, crisantemo, azalea, ciclamino
Tentredini		Piretro naturale * Etofenprox (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1)	Soglia. Infestazioni in atto.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Fluvalinate divieto d'impiego in serra Piretro naturale autorizzato solo su crisantemo, garofano, rosa
Larve minatrici (Liriomyza spp.)		<i>Diglyphus isaea</i> Azadiractina Olio minerale Etofenprox (Piretroidi) (1) Fluvalinate * (Piretroidi) (1) Ciromazina * Diflubenzuron Spinosad * (4)	Soglia. Installare trappole cromotropiche di colore giallo. Intervenire alle prime catture.	(1) Piretroidi: al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale, indipendentemente dall'avversità. (4) Spinosad al massimo 2 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. * Autorizzazioni di etichetta limitate Fluvalinate divieto d'impiego in serra Spinosad autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano, gerbera, ornamentali Ciromazina autorizzata solo su floreali

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
Sciaridi (<i>Lycoriella</i> spp., <i>Bradysia</i> spp., <i>Platosciaria</i> spp.)		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema feltiae</i> e <i>Heterorhabditis</i> spp.	Soglia. Infestazioni in atto.	
Paysandisia achon		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema</i> spp.		
Rhynchophorus spp		Nematodi entomoparassiti: <i>Sternernema</i> spp.		
Acari (<i>Tetranychus urticae</i> <i>Panonychus</i> spp. <i>Eotetranychus carpini</i> altri)	4	<i>Phytoseiulus persimilis</i> Olio minerale <i>Beauveria bassiana</i> Abamectina (6) Bifenazate Clofentezine Exitiazox Fenpiroximate Pyridaben * Tebufenpirad Etoxazole (7)	Soglia. Infestazioni in atto.	(6) Abamectina al massimo 1 trattamenti per ciclo culturale indipendentemente dall'avversità. (7) Etoxazole: max 1 trattamento l'anno. * Autorizzazioni di etichetta limitate Pyridaben autorizzato solo su rosa, crisantemo, garofano.
Lumache, chioccioline, Limacce	Solo esche	Metaldeide esca	Soglia. Infestazioni in atto.	
Patogeni tellurici (<i>Fusarium</i> spp., <i>Verticillium</i> spp., <i>Phytophthora</i> spp., ect...)		Solarizzazione Vapore caldo Metam Na (1) Metam K (1) Dazomet (1)		(1) Metam Na, Metam K, Dazomet: max una volta all'anno.

Segue SCHEDA DIFESA N° 1 – FLORICOLE ED ORNAMENTALI

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

*** N° TRATTAMENTI AMMESSI: senza vincoli, se non diversamente specificato.**

AVVERSITA'	N°TRATT. AMMESSI *	PRINCIPI ATTIVI E AUSILIARI	CRITERI D'INTERVENTO	LIMITAZIONI D'USO
FITOREGOLATORI		Acido Gibberellico Clomequat * Daminozide NAA NAD Fluprimidol *		* Autorizzazioni di etichetta limitate Fluprimidol autorizzato solo in serra su: poinsettia, crisantemo, begonia, fucsia, ortensia, petunia, impatiens, pelargonio Clomequat autorizzato su: Stella di natale, Geranio, Begonia, Kalanchoe.

La seguente scheda è applicabile ad ogni singola specie floricola ed ornamentale coltivata in azienda.

EPOCA	INFESTANTI	N° TRATT. AMMESSI	PRINCIPIO ATTIVO	% P. ATTIVO	LITRI O KG/HA	LIMITAZIONI
PRE-SEMINA O PRE TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee		Glifosate	30.8	4-5	
PRE-EMERGENZA POST- TRAPIANTO	Dicotiledoni e Graminacee		Glifosate Propaclor (Bulbose da fiore) Clorofam (Bulbose da fiore) Oxadiazon Liquido (Garofano e Ornamentali) Oxadiazon Granulare (Garofano e Ornamentali) Pendimetalin (Ornamentali) Isoxaben (Ornamentali) Oxifluorfen (Vivai ornamentali)	30,8 43,2 40,8 35,87 2 31,7 45,5 48	4-5 10,5 5 2-5 150-180 3 1 3	
	Graminacee		Cicloxidim	10.9	2	

Ove possibile effettuare la pacciamatura del terreno.