



**DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA  
AREA SECONDA  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE**

---

**NORME TECNICHE APPLICATIVE  
DISCIPLINARI DI PRODUZIONE - DIFESA  
INTEGRATA**

*D.M. 2722 del 17/04/2008  
Reg. (CE) 1698/05  
Misura 214 – Azione 1  
Agricoltura integrata*

**EDIZIONE 2012  
APPROVATO CON D.D. n. 25 del 08.06.2012**

## INDICE

<b>Indicazioni e limitazioni di carattere generale</b>	3
<b>Colture arboree</b>	
<i>Vite</i>	4
<i>Olivo</i>	11
<i>Pesco</i>	15
<i>Albicocco</i>	24
<i>Susino</i>	28
<i>Ciliegio</i>	33
<i>Mandorlo</i>	37
<i>Melo</i>	40
<i>Pero</i>	48
<i>Nashi</i>	54
<i>Actinidia</i>	57
<b>Colture cerealicole</b>	
<i>Grano duro, Grano tenero, Orzo, Avena, Farro, Triticale</i>	60
<i>Mais</i>	64
<i>Sorgo</i>	68
<b>Colture industriali</b>	
<i>Girasole</i>	70
<i>Barbabietola da zucchero</i>	73
<i>Pomodoro</i>	78
<i>Colza</i>	87
<b>Colture orticole</b>	
<i>Cipolla</i>	90
<i>Cipolla da seme</i>	93
<i>Aglione</i>	96
<i>Finocchio</i>	99
<i>Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rapa</i>	102
<i>Cavolo da seme</i>	107
<i>Carciofo</i>	112
<i>Melone, Cocomero</i>	115

<i>Patata</i>	120
<i>Peperone</i>	124
<i>Asparago</i>	130
<i>Porro</i>	133
<i>Sedano</i>	136
<i>Spinacio</i>	139
<i>Zucchini</i>	142
<i>Insalate</i>	146
<i>Basilico</i>	162
<i>Prezzemolo</i>	165
<i>Rucola</i>	168
<b>Leguminose da granella e da orto</b>	
<i>Cece</i>	171
<i>Cicerchia</i>	173
<i>Favino</i>	175
<i>Fava</i>	177
<i>Fagiolo, Fagiolino</i>	179
<i>Lenticchia</i>	182
<i>Pisello</i>	184
<b>Foraggere</b>	
<i>Erba medica</i>	187
<i>Erbai misti</i>	190
<i>Lupinella</i>	192
<i>Prati polifiti</i>	194
<i>Sulla</i>	196

## **Indicazioni e limitazioni di carattere generale**

- E' ammesso solo l'uso dei principi attivi o ausiliari indicati nella colonna "Principi attivi e ausiliari".
- I singoli principi attivi possono essere impiegati solo contro le avversità per le quali sono stati indicati specificatamente; essi possono essere utilizzati da soli o in varie combinazioni con altri pincipi attivi indicati nella stessa colonna (Principi attivi e ausiliari) nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se non per quanto specificamente indicato.
- Le presenti Norme tecniche sono riferite alle sole colture di pieno campo.
- E' consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificamente vietato.
- E' fatto obbligo di escludere i formulati classificati "Molto tossico", "Tossico", "Nocivo" (ex 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe), qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritante" o "Non classificato" (ex 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe).
- Le dosi di applicazione degli erbicidi riportate nella colonna "Dosi (l-kg/ha)" sono da considerare vincolanti.
- Tutti i prodotti ammessi dal Reg. Ue 2092/91 e successive modifiche inerenti le tecniche di coltivazione secondo il metodo dell'Agricoltura biologica sono impiegabili, con esclusione di quelli classificati "Molto tossico", "Tossico", anche quando non specificatamente indicati nel disciplinare, purché registrati per la coltura e per l'avversità.
- E' fatto obbligo di sottoporre, almeno una volta ogni cinque anni, le attrezzature per la distribuzione degli agrofarmaci alle operazioni di controllo e taratura, effettuate da enti pubblici o privati riconosciuti dalla Regione Molise.

**VITE (uva da vino)**  
**Difesa fitosanitaria**

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Oidio</b></p> <p><i>Uncinula necator-</i> <i>Oidium tuckeri</i></p>	<p>Vigneti ad alto rischio ( cv: Aglianico, Malvasia del Chianti, Malvasia di Candia, Moscato, Montepulciano):</p> <p>- pre-fioritura immediata: max 1 trattamento con prodotti di sintesi;            -allegagione-accrescimento acini: 1-5 trattamenti (secondo evoluzione malattia) con prodotti di sintesi;            -accrescimento grappolo-pre-invaiatura trattamenti con zolfo in base all'evoluzione dell'infezione.</p> <p>Vigneti a basso rischio (vitigni meno sensibili):</p> <p>- iniziare a trattare con prodotti di sintesi ad inizio-fioritura;            - da allegagione in poi intervenire con prodotti e turni in funzione dell'andamento climatico ed eventuale comparsa dei sintomi della malattia.</p> <p>Nei vigneti ad alto rischio e/o in caso di infezioni in atto alternare, agli interventi indicati, applicazioni di zolfo in polvere, soprattutto nella fase di accrescimento acini.            Trattamenti oltre la fase di invaiatura non hanno utilità e sono pertanto sconsigliati.            Eseguire potatura verde per l'arieggiamento e l'esposizione dei grappoli ed accurate bagnature degli organi vegetativi in occasione dei trattamenti.</p>	<p>Zolfo            Spiroxamina^            Meptildinocap (1)</p> <p>IBE:            Miclobutanil*(3)            Penconazolo*(3)            Propiconazolo*(3)            Triadimenol*(3)            Fenbuconazolo*(3)            Tebuconazolo*(3)            Ciproconazolo*(3)            Tetraconazolo*(3)            Difenoconazolo*(3)            Bupirimate^            Quinoxifen^</p> <p>Azoxystrobin (2)            Trifloxystrobin (2)            Piraclostrobin+Metiram (2)</p> <p>Boscalid<sup>oo</sup>            Metrafenone^</p> <p><i>Ampelomyces quisqualis</i></p>	<p>^ Al massimo 3 trattamenti l'anno.            * I prodotti IBE vanno utilizzati in formulati misti a zolfo (miscele precostituite o estemporanee) e per non più di 3 applicazioni totali .</p> <p><sup>oo</sup>Al massimo 3 trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(1) Al massimo 2 interventi l'anno.</p> <p>(2) Con QOI (Azoxistrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone, Famoxadone e Piraclostrobin) al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(3) Non ammesse formulazioni Xn.</p>

<p><b>Peronospora</b> <i>Plasmopara viticola</i></p>	<p><b>Interventi chimici</b></p> <p>- Fino alla pre-fioritura intervenire preventivamente sulla base dell'aprevisione delle piogge o prima dello scadere del periodo di incubazione. Nelle zone a basso rischio vanno attese le prime "macchie d'olio".</p> <p>- Dalla pre-fioritura all'allegagione, anche in assenza di "macchie d'olio", intervenire cautelativamente con cadenze in base alla caratteristiche dei prodotti utilizzati.</p> <p>- Successive fasi vegetative: le strategie di controllo sono in relazione alla comparsa o meno della malattia e all'andamento delle condizioni climatiche.</p>	<p>Prodotti rameici Mancozeb* Propineb* Metiram* Dithianon°</p> <p>Cimoxanil** Dimetomorph**(2) Zoxamide**</p> <p>Famoxadone (1) Fenamidone (1) Piraclostrobin (1)</p> <p>Etil fosfito di alluminio^^</p> <p>Metalaxil*** Metalaxil M*** Benalaxil*** Benalaxil M***</p> <p>Iprovalicarb^^(2) Mandipropamide^^(2) Ciazofamid (3) Amisulbrom (3) Fluopicolide^^ Ametoctradina</p>	<p><b>*Ammessi per un solo trattamento all'anno, indipendentemente dall'avversità, non oltre la fase di fioritura.</b></p> <p>°Al massimo 2 trattamenti l'anno.</p> <p><b>** Ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità .</b> <b>(1) Con QOI (Azoxistrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone, Famoxadone e Piraclostrobin) al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>***Ammessi per massimo 2 trattamenti complessivi all'anno.</b></p> <p><b>^^ Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.</b> <b>(2) Con CAA (Dimetomorph, Iprovalicarb e Mandipropamide) al massimo 4 interventi l'anno.</b> <b>(3) Con QiI (Ciazofamid e Amisulbrom) al massimo 3 interventi all'anno.</b></p>
--	--	--	---

<p><b>Marciumi acidi</b> <i>Kloeckera apiculata</i> ed altri</p>	<p>La difesa è favorita dai seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta di idonei vitigni, portinnesti poco vigorosi e sistemi di allevamento non molto espansi;</li> <li>- equilibrate concimazioni ed irrigazioni;</li> <li>- razionale difesa contro la tignoletta e l'oidio.</li> <li>- idonei interventi di potatura verde;</li> </ul> <p>E' consigliabile l'utilizzo del rame nella difesa antiperonosporica per la sua funzione collaterale nei confronti dei marciumi acidi.</p>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i></p>	<p>I vitigni maggiormente predisposti all'alterazione sono quelli a grappolo serrato, con buccia sottile quali: <i>Aglianico, Malvasia del Chianti, Moscato, Sangiovese, Pinot, Verdicchio, Barbera, Falanghina.</i></p>
<p><b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- corretta difesa contro la tignoletta e l'oidio;</li> <li>- scelta di idonei vitigni e sistemi di allevamento;</li> <li>- eseguire equilibrate concimazioni azotate e razionali irrigazioni;</li> <li>- effettuare opportune sfogliature in prossimità della maturazione dell'uva per favorire l'arieggiamento e l'irraggiamento dei grappoli.</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b> Per vitigni a grappolo serrato, in zone ad alto rischio, sono consentiti al massimo 2 trattamenti preventivi nei seguenti periodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pre-chiusura grappolo;</li> <li>- invaiatura</li> </ul>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Pyrimethanil (1)(5) (Ciprodinil+Fludioxonil) (2)(5) Fenexamide Boscalid (4) Fluazinam (3) Fludioxonil (5)(6)</p> <p>Solfiti alcalini in bentonite</p>	<p><b>Al massimo 2 interventi l'anno contro questa avversità. Un terzo intervento è ammesso negli impianti a tendone.</b></p> <p><b>(1) Ammesso per non più di un trattamento all'anno e non oltre la fase di chiusura grappolo.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno.</b> <b>(4) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Tra Pyrimethanil, (Ciprodinil+Fludioxonil) e Fludioxonil al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Al massimo 1 intervento l'anno.</b></p>

<p><b>Mal dell'esca</b> <i>Phaeoacremonium aleophilum,</i> <i>Phaeomoniella chlamydospora,</i> <i>Fomitiporia mediterranea</i></p>	<p>In presenza di piante colpite, asportare la parte del fusto invasa dal fungo ed allevare dal legno sano un nuovo germoglio, previa disinfezione con mastici cicatrizzanti della superficie di taglio.</p>		<p>Nel caso di piante fortemente attaccate, procedere all'estirpazione immediata.</p> <p>Gli attrezzi da taglio vanno accuratamente disinfettati o passati sulla fiamma onde evitare la diffusione della malattia.</p>
<p><b>Escoriosi</b> <i>Phomopsis viticola</i></p>	<p>L'avversità è normalmente controllata dagli interventi antiperonosporici. Asportazione e bruciatura dei residui di potatura. Interventi dalla fase di gemma rigonfia <b>solo in caso di accertata presenza della malattia.</b></p>	<p>Mancozeb* Metiram* Cimoxanil + Mancozeb*(1) Piraclostrobin (2)</p>	<p><b>* Ditiocarbammati: ammessi per un solo trattamento all'anno, indipendentemente dall'avversità, non oltre la fase di fioritura.</b> <b>(1) Cimoxanil ammesso per non più di 3 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Con QOI (Azoxistrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone, Famoxadone e Piraclostrobin) al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Marciumi degli acini</b> <i>Penicillium spp.</i> <i>Aspergillus spp.</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b> Evitare ferite sugli acini da parte di altre avversità come l'oidio, la tignoletta, ecc.</p>	<p>(Ciprodinil+Fludioxonil) (1)</p>	<p><b>(1) Tra Pyrimethanil e (Ciprodinil+Fludioxonil) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Tignoletta</b> <i>Lobesia botrana</i></p>	<p><b>Adozione obbligatoria di trappole a ferormone in numero di 1-2 per appezzamento omogeneo.</b></p> <p><b>Non sono ammessi trattamenti contro la prima generazione (antofaga).</b></p> <p><b>Zone ad alto rischio</b> (fascia litoranea) interventi in 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> generazione (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> gen. carpofaga) in presenza di catture nelle trappole a feromoni;</p> <p><b>Zona basso rischio</b> (Molise interno) Il danno è generalmente al di sotto della soglia economica.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> * var. <i>Aizawai</i> *</p> <p>Tebufenozide ** Metossifenozone</p> <p>Flufenoxuron ***(2) Indoxacarb***(5)</p> <p>Spinosad<sup>oo</sup></p> <p>Clorpirifos (1) Clorpirifos metile (1) Clorantraniliprole (3) Emamectina (4)</p>	<p><b>* Il trattamento va fatto dopo 6-8 giorni dall'inizio delle catture nelle trappole a ferormoni e ripetuto dopo 7-10 giorni.</b> E' raccomandabile l'aggiunta di 500g/hl di zucchero o melasso o di altri appetenti;</p> <p><b>** Trattare alla schiusura delle prime uova;</b></p> <p><b>*** Trattare a distanza di 4-5 giorni dall'inizio delle catture;</b></p> <p><b><sup>oo</sup>Al massimo 3 interventi indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno. Non impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%.</b></p> <p><b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b></p> <p><b>(5) Al massimo 3 interventi l'anno.</b></p> <p>Si consiglia di non effettuare trattamenti a basso volume.</p>
<p><b>Tripidi</b> <i>Drepanothrips reuteri</i></p>	<p>Intervenire <b>solo in caso di forti infestazioni</b> che rischiano di compromettere lo sviluppo dei germogli.</p>	<p>Spinosad*</p>	<p><b>*Ammessi al massimo 3 interventi indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Cicaline</b> <i>Empoasca vitis</i> <i>Zygina rhamni</i></p>	<p>Non sono ammessi interventi chimici, se non in caso di forte infestazione (<b>soglia: almeno 2 forme mobili per foglia</b>).</p>	<p>Piretro naturale Etofenprox* Thiamethoxam* Flufenoxuron (1) Buprofezin (2)</p>	<p><b>*Ammessi per un solo trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b></p> <p><b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>

<p><b>Cocciniglie</b> <i>Targionia vitis</i> <i>Planococcus spp.</i></p>	<p>In presenza della <i>Targionia</i> rimuovere il ritidoma e le incrostazioni.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> in presenza di forti infestazioni, intervenire alla fuoriuscita delle neanidi.</p>	<p>Olio minerale bianco Clorpirifos metile (1) Polisolfuro di Calcio Thiamethoxam (2) Spirotetramat (3) Buprofezin (4)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Prodotto ammesso solo per il controllo di <i>Planococcus spp.</i>; al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 2 interventi all'anno, solo nei confronti di <i>Planococcus ficus</i>. (4) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Acariosi</b> <i>Calepitrimerus vitis</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire solo in caso di forte attacco - nella fase di germogliamento se si sono verificate infestazioni nell'annata precedente; - in caso di accertata presenza sulle foglie per evitare danni sui grappoli.</p>	<p>Olio minerale (1) Zolfo Fenazaquin (2) Fenazaquin+Exitiazox (2)</p>	<p>Al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità. (1) Da utilizzare entro la fase di gemma gonfia. (2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. Fenazaquin impiegabile fino al 30/11/2012.</p>
<p><b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i></p> <p><b>Ragnetto giallo</b> <i>Eotetranychus carpini</i></p>	<p>Impiego di fitofarmaci che non stimolano la fecondità dei ragnetti e che siano selettivi nei confronti dei loro nemici naturali.</p> <p>Nei vigneti solitamente infestati da acari si consiglia l'impiego dello zolfo (soprattutto in polvere) in funzione antioidica per la sua azione collaterale acarofrenante.</p>	<p>Zolfo Clofentezine Exitiazox (1) Fenazaquin (1)(2) Tebufenpirad Piridaben Etoxazole</p>	<p>Al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità. (1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Impiegabile fino al 30/11/2012.</p>
<p><b>Erinosi</b> <i>Eriophyes vitis</i></p>	<p>Avversità generalmente non dannosa. E' ben controllato dai trattamenti anticrittogamici a base di zolfo.</p>	<p>Zolfo</p>	<p>Per forti infestazioni su vigneti in fase di allevamento, alla ripresa vegetativa, è ammesso solo lo zolfo in polvere.</p>
<p><b>Nematodi</b></p>	<p>Acquisto di materiale di riproduzione certificato (munito di etichetta di colore blu) proveniente da vivai qualificati. Effettuare il reimpianto, in caso di necessità, in terreni coltivati in precedenza con cereali autunno-vernini.</p>		<p>Per i nuovi impianti viticoli preferire quei terreni che non hanno ospitato, negli anni immediatamente precedenti, colture arboree. Non sono ammessi applicazioni al terreno di fumiganti o geodisinfestanti ad azione nematocida.</p>

## VITE

### Controllo delle infestanti

<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9%(3) - Carfentrazone 6,45% (1)(6) - Pendimetalin 38,72% (2) - Isoxaben 45,5% (2) - Flazasulfuron 25% (4)	5 1 1 2 2 0,07	<p><b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati è ammesso lungo la fila o alla base della pianta con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b></p> <p><b>(1) Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b></p> <p><b>(2) Impiegabile solo per impianti non in produzione e nei primi due anni.</b></p> <p><b>(3) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</b></p> <p><b>(4) Impiegabile solo ad anni alterni; non ammesso su terreni sabbiosi. Impiegabile in miscela con Glifosate nel periodo inverno-inizio primavera.</b></p> <p><b>(5) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</b></p> <p><b>(6) Prodotti in alternativa tra loro.</b></p>
Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (5)(6)	1,6	
Monocotiledoni	Ciclossidim 10,9 % (2)	2	
<b>Spollonante</b>	- Carfentrazone 6,45% (1)(3) - Pyraflufen-ethyl 2,6% (2)(3)	0,9-1 1,6	<p><b>(1) Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b></p> <p><b>(2) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</b></p> <p><b>(3) Prodotti in alternativa tra loro.</b></p>

**Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.**

## OLIVO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Occhio di pavone</b> <i>Spilocaea oleagina</i>	Su varietà suscettibili e in annate favorevoli lotta chimica in primavera e/o in autunno, in concomitanza di piogge prolungate.	Poltiglia bordolese Ossicloruro di rame Idrossido di rame Dodina*	Varietà più sensibili al fungo: <i>Moraiolo, Paesana bianca, Ascolana, Frantoio e cv.</i> da mensa. <b>* Al massimo un trattamento l'anno.</b>
<b>Rogna</b> <i>Pseudomonas savastanoi</i>	Eliminazione e distruzione rametti colpiti. Disinfezione della superficie di grossi tagli di potatura e di soppressione masse tumorali. Trattamenti immediati dopo forti gelate e grandinate.	Poltiglia bordolese Ossicloruro di rame Idrossido di rame	Varietà più sensibili al batterio: <i>Moraiolo, Frantoio</i> e varietà da mensa.
<b>Fumaggine</b> <i>Vari</i>	Lotta agli insetti produttori di melata ( <i>Cocciniglie</i> ). Arieggiamento della chioma della pianta con razionali potature di fine inverno ed estive (taglio dei succhioni).		

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Mosca</b> <i>Dacus oleae</i></p>	<p>Si consiglia l'utilizzo di trappole a ferormone o cromotropiche. Campionamenti periodici sulle olive.</p> <p><b>Soglia per trattamenti larvicidi non preventivi:</b>  <b>10% di olive con punture fertili per le varietà da olio;</b>  <b>1-2% di olive con punture fertili per le varietà da mensa.</b></p>	<p><u>Metodi preventivi:</u>  - dispositivi di "Attract and kill";  - esche proteiche avvelenate con  - Dimetoato (4)  - Spinosad (1)  - trappole attrattive.</p> <p><u>Prodotti larvicidi:</u>  Dimetoato a dosaggio ridotto (<b>g 40 p.a./hl</b>) (3)  Fosmet (3)  Imidacloprid (2)</p>	<p><b>Non sono ammessi più di 2 trattamenti larvicidi all'anno in totale, su olive da olio e 4 trattamenti larvicidi all'anno in totale, su olive da mensa.</b></p> <p><b>Non sono ammessi più di 5 trattamenti adulticidi l'anno.</b></p> <p>Si consiglia di non applicare il Dimetoato su cv. <i>Coratina</i>.</p> <p>(1) Impiegabile solo formulato con specifica esca pronta all'uso. Al massimo 5 applicazioni all'anno.  (2) Al massimo 1 intervento l'anno solo con formulazione "dispersione in olio".  (3) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (4) Al massimo 5 interventi per la difesa preventiva.</p>
<p><b>Tignola</b> <i>Prays oleae</i></p>	<p><b>Soglia di intervento (solo per la generazione carpofaga):</b>  - per le olive da olio: 10-15% di uova o di larve in fase di penetrazione nelle olivine.  - per le olive da tavola: 5-7%.</p> <p><b>Interventi chimici</b>  Intervenire nella fase di pre-indurimento nocciolo.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>,  var. <i>Aizawai</i></p> <p>Dimetoato(1)  Fosmet (1)</p>	<p><b>Amnesso 1 trattamento all'anno nei confronti dell'avversità.</b></p> <p>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>

<p><b>Cocciniglia mezzo grano di pepe</b> <i>Saissetia oleae</i></p>	<p><b>Soglia:</b> <b>5-10 neanidi vive per foglia a fine agosto.</b> Favorire l'arieggiamento all'interno della chioma. Eliminazione dei rami più colpiti con la potatura. L'insetto è abbastanza contenuto dal predatore <i>Chilocorus bipustulatus</i>, da diversi parassitoidi e da condizioni ambientali avverse.</p>	<p>Olio minerale bianco Buprofezin</p>	<p><b>Ammesso 1 trattamento, a fine estate,</b> bagnando molto bene la pagina inferiore delle foglie</p>
<p><b>Floeotribo</b> <i>Phloeotribus scarabeoides</i></p>	<p><b>Non ammessi trattamenti chimici.</b> Lasciare nell'oliveto i rami più grossi di potatura, in modo che possano fungere da esca per la ovodeposizione dell'insetto, per distruggerli prima dello sfarfallamento degli adulti. Eliminare rami e branche deperite. Mantenere l'oliveto in buono stato vegetativo.</p>		
<p><b>Cotonello</b> <i>Euphyllura olivina</i></p>	<p><b>Nessun trattamento chimico.</b> Sfoltimento interno della chioma per favorire la circolazione dell'aria e la penetrazione della luce. L'insetto è normalmente controllato da numerosi antagonisti naturali che mantengono il suo livello di infestazione al di sotto della soglia di dannosità.</p>		
<p><b>Margaronia</b> <i>Palpita unionalis</i></p>	<p>Insetto dannoso su piante in allevamento. Intervenire contro le giovani larve all'inizio dell'infestazione.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Aizawai</i></p>	
<p><b>Oziorrinco</b> <i>Othiorrynchus cribricollis</i></p>	<p>Dannoso su piante in allevamento. <b>Non sono ammessi trattamenti chimici.</b>  Impedire la risalita degli adulti sulle piante impiegando mezzi meccanici applicati al tronco (lana di roccia, fasce trappola, ecc.).</p>		

## OLIVO

### Controllo delle infestanti

<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4%  - Oxifluorfen 22% *  - Carfentrazone 6,45% (1)	5  1  1	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati è ammesso lungo la fila o alla base della pianta, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha), solo su impianti intensivi a sesto stretto con distanze sulla fila inferiore a m 5 o se la pendenza dei terreni è superiore al 5%.</b>  * Prodotto da utilizzare in miscela con Glifosate.  (1) Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno.
<b>Spollonante</b>	- Carfentrazone 6,45% (1)	0,9-1	(1) Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno.

**Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.**

# PESCO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Bolla del pesco</b> <i>Taphrina deformans</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> si opera in forma estintiva nel modo seguente: - <b>primo intervento alla caduta completa delle foglie (autunno);</b> - <b>secondo intervento a fine riposo vegetativo appena la temperatura tende ad innalzarsi.</b> Negli impianti colpiti in forma grave negli anni precedenti o in concomitanza di primavere umide e piovose, si può intervenire anche nella fase di " bottone rosa".</p>	<p>Ziram (1) Thiram (1) Captano (1)(2) Dodina Prodotti rameici (4) Ditianon Difenoconazolo (3) Tebuconazolo+zolfo (3)</p>	<p>(1) Al massimo 2 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Ammesse solo formulazioni Xn. (3) Ammessi al massimo 2 interventi l'anno con IBE, indipendentemente dall'avversità. (4) Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post-fioritura. Utilizzare i prodotti cuprici su pescheti con rametti ben lignificati e in quelli colpiti da batteriosi.</p>
<p><b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - limitare la concimazione azotata e l'irrigazione; - asportare e bruciare i rametti colpiti. <b>Interventi chimici:</b> Gli stessi trattamenti al "bruno" effettuati contro la <i>bolla</i> sono validi per questa crittogama. In zone e nei pescheti maggiormente colpiti intervenire nelle prime fasi vegetative primaverili.</p>	<p>Ziram* Thiram* Dodina Prodotti rameici (1) Ditianon</p>	<p>* Ammessi al massimo per 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, da eseguirsi solo nel periodo di riposo vegetativo; prodotti in alternativa tra loro. (1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post-fioritura.</p>

<p><b>Oidio</b> <i>Sphaerotheca pannosa</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - evitare impianti con cultivar molto suscettibili in aree ad alto rischio (colline); - non eccedere nell'azoto e nelle irrigazioni; - eliminare, con la potatura invernale, i rametti colpiti dai "feltri" miceliari del fungo.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> - per varietà più recettive (nettarine e percoche) poste in zone a rischio si consiglia di agire preventivamente nella fase fenologica di "scamicatura" e dopo 8-12 giorni; - per quelle meno recettive l'intervento va rimandato alla comparsa delle prime "macchie bianche" sui frutti.</p>	<p>Zolfo Bupirimate* Bitertanolo*(3) Miclobutanil*(3) Penconazolo*(3) Propiconazolo*(3) Tebuconazolo (3) (4) Tetraconazolo*(3) Fenbuconazolo*(3) Ciproconazolo*(3) Boscalid+Piraclostrobin(1) Quinoxifen (2)</p>	<p>* Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 3 interventi l'anno. (3) Non ammesse formulazioni Xn. (4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Moniliosi</b> <i>Monilia laxa e</i> <i>Monilia fructigena</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - realizzazione del pescheto in zona vocata con appropriato sesto di impianto; - mantenimento di un equilibrato sviluppo della pianta (portinnesti e varietà non molto vigorose, razionali concimazioni azotate ed irrigazioni); - esecuzione di corrette potature verdi per migliorare l'arieggiamento e l'illuminazione dei frutti; - eliminazione e distruzione dei frutti mummificati. Effettuare l'ultima concimazione entro fine aprile -inizio maggio , per le cv. precoci ed entro i primi di giugno per le cv. tardive.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>-Periodo fiorale: l'intervento è ammesso, qualora si verifichino condizioni favorevoli alla malattia, solo se indicato sul bollettino fitosanitario regionale</b> <b>-Periodo pre-raccolta: sono giustificati in ambienti soggetti a forte umidità (fondovalle), per varietà sensibili o per quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione.</b></p>	<p><i>Bacillus subtilis</i> Tebuconazolo (2)(4) Fenbuconazolo*(2) Difenoconazolo*(2) Propiconazolo*(2) Bitertanolo*(2) Miclobutanil*(2) Penconazolo*(2) Tetraconazolo*(2) Ciproconazolo*(2) Cyprodinil Cyprodinil+Fludioxonil Fenexamide  Boscalid+ Piraclostrobin (1) (3)  Boscalid (3)</p>	<p>Al massimo 2 interventi all'anno contro l'avversità.  *Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità .  (1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (2) Non ammesse formulazioni Xn.  (3) Prodotti contenenti Boscalid impiegabili per massimo 2 interventi, indipendentemente dall'avversità.  (4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>

<p><b>Batteriosi</b></p> <p><i>Xanthomonas campestris</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b>          Impiego di materiale vivaistico certificato;          potatura e bruciatura di rami e branche infette;          disinfezione, con pasta cicatrizzante contenente rame, delle grosse ferite e delle ampie superfici di taglio.</p> <p><b>Interventi chimici</b>  <b>Solo in presenza accertata della malattia:</b>          -2-3- trattamenti durante la caduta delle foglie a cadenza di 8-10 giorni;          -eventuale trattamento subito dopo la potatura invernale e/o nella fase di ingrossamento delle gemme, se persiste l'alta umidità.</p>	<p>Prodotti rameici (1)</p>	<p><b>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post-floritura.</b></p>
<p><b>Ruggine</b></p> <p><i>Tranzschelia pruni-spinosae</i></p>	<p><b>La difesa contro questa crittogama raramente si rende necessaria.</b></p> <p><b>Interventi chimici</b>          Sono giustificati solo in condizioni climatiche predisponenti (estati particolarmente umide e piovose), su <b>percoche e pesche tardive.</b></p>	<p>Zolfo</p>	<p>Utilizzare lo zolfo (preferibilmente in polvere) contro l'oidio per l'azione collaterale antiruggine.</p>
<p><b>Cancri rameali</b></p> <p><i>Cytospora spp.</i>  <i>Fusicoccum amygdali</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b>          - eliminazione e bruciatura dei rametti colpiti;          - riduzione delle concimazioni azotate;          - riduzione delle irrigazioni.</p> <p><b>Interventi chimici:</b>  <b>Solo in presenza accertata della malattia:</b>          1-3 trattamenti durante la caduta delle foglie          1-2 interventi primaverili ("bottone rosa" - scamicatura)</p>	<p>Prodotti rameici (1)          Bitertanolo*          Dithianon</p>	<p>La malattia è poco ricorrente nei nostri ambienti.  <b>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post-floritura.</b></p> <p><b>*Utilizzabile non più di 2 volte l'anno, indipendentemente dall'avversità. Tale limitazione è valida dalla fase di "bottoni rosa" fino alla raccolta.</b></p>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afide verde</b> <i>Myzus persicae</i> <i>B. helycrisi</i>	<b>Interventi chimici:</b> negli impianti dove le infestazioni afidiche sono elevate e ricorrenti si consiglia di intervenire assai precocemente, nella fase di "bottone rosa". Nel caso si rendano necessari trattamenti di post-fioritura, intervenire tempestivamente, prima dell'accartocciamento fogliare, <b>evitando assolutamente il ricorso a trattamenti tardivi.</b>  <b>Sospendere i trattamenti chimici quando il 50% degli individui delle colonie è in forma alata.</b>	Imidacloprid * Thiamethoxam* Acetamiprid* Clotianidin* Fluvalinate** Flonicamid (1) Spirotetramat (2)	<b>Contro gli afidi sono consentiti al massimo un intervento pre-fiorale e due interventi nel periodo post-fiorale.</b> <b>*Prodotti in alternativa tra loro; è consentito un unico intervento, indipendentemente dal fitofago da controllare, nella fase di "bottoni rosa", almeno 10 giorni prima della fioritura.</b> <b>**Al massimo 1 intervento all'anno con questo prodotto, esclusivamente nella fase di pre-fioritura, solo se nell'apezzamento non siano stati effettuati, nell'anno precedente, interventi acaricidi.</b> <b>(1) Ammesso 1 trattamento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afide farinoso</b> <i>Hyalopterus spp.</i>	<b>Soglia:</b> si interviene alla presenza delle prime colonie.	Thiamethoxam (1) Imidacloprid (1) Acetamiprid (1) Flonicamid (2)	<b>Intervenire in maniera localizzata su piante infestate.</b> <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Tripidi</b> <i>Taeniothrips meridionalis</i> <i>Thrips major</i>	<b>Soglia:</b> presenza del parassita in fioritura. Intervenire solo su nettarine.	Spinosad <sup>^</sup> Alfacipermetrina (1)(3) Ciflutrin(1) (3) Cipermetrina (1) (3) Deltametrina (1) (3) Lambda-cialotrina(1) (3) Zeta-cipermetrina (1) (3) Acrinatrina (2)	<b>Ammessi 2 interventi l'anno contro questa avversità.</b> <b>^Al massimo 3 interventi indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) In pre o post-fioritura; al massimo 1 intervento.</b> <b>(3) Solo in pre-fioritura; al massimo 1 intervento.</b>
<b>Tripidi estivi</b> <i>Thrips major</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Soglia:</b> presenza del parassita	Acrinatrina Spinosad (1) Etofenprox (2)	<b>Ammesso un intervento all'anno contro questa avversità.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<p><b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione dei rami più infestati; - spazzolatura delle branche</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>Soglia:</b> presenza di infestazioni diffuse o di danno sui frutti osservato nelle annate precedenti. <b>Intervenire alla fuoriuscita delle neanidi di prima generazione.</b> <b>Su varietà medio-tardive, solo dove si abbia esperienza di danno sui frutti, è ammesso un secondo intervento, in corrispondenza della fuoriuscita delle neanidi di seconda generazione.</b></p>	<p>Olio minerale bianco(1) Clorpirifos metile (2)(4) Polisolfuro di calcio*** Pyriproxyfen (2)(3) Fosmet (2)(4) Spirotetramat (5) Buprofezin (6)</p>	<p>I trattamenti vanno eseguiti curando bene la bagnatura della parte legnosa della pianta. (1)Utilizzare alla dose di 1-1,5 l/hl, solo contro la prima generazione; per evitare fenomeni di fitotossicità non usare nelle ore più calde e distanziare di almeno 20 gg da eventuali interventi con prodotti contenenti zolfo. Sulle nettarine si consiglia di provarlo su piccole superfici prima dell'impiego. <b>(2) Prodotto ammesso per un solo trattamento all'anno contro questa avversità.</b> ***Intervento fondamentale, da effettuare nella fase di "ingrossamento gemme"- "bottoni rosa"; i polisolfuri hanno una azione collaterale nei confronti di oidio, monilia e bolla. <b>(3) Impiegabile prima della fioritura.</b> <b>(4)Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Cocciniglia S. José</b> <i>Comstockaspis perniciosa</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza del parassita. <b>Interventi chimici:</b> Intervenire contro le forme svernanti al rigonfiamento delle gemme - bottoni rosa.</p>	<p>Olio minerale bianco Polisolfuro di calcio* Pyriproxyfen(1) Fosmet (2) Spirotetramat (3) Buprofezin (4)</p>	<p>*Intervento fondamentale, da effettuare nella fase di "ingrossamento gemme"- "bottoni rosa" I polisolfuri hanno una azione collaterale nei confronti di oidio, monilia e bolla. <b>(1)Al massimo 1 trattamento l'anno indipendentemente dall'avversità; impiegabile prima della fioritura.</b> <b>(2) Al massimo 1 trattamento l'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>

<p><b>Cidia</b></p>	<p><b>E' obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nel periodo della scamicatura.</b></p>	<p>Confusione o disorientamento sessuale</p>	<p>Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima generazione. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali, in particolare sul lato esposto ai venti dominanti.</p>
<p><i>Cydia molesta</i></p>	<p><b>Si raccomanda l'applicazione del metodo della confusione sessuale ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.</b></p> <p><b>Interventi chimici</b>  <b>Soglia:</b>  - I generazione: <b>30</b> catture/settimana;  - altre generazioni: <b>10</b> catture /settimana;  Le soglie non sono vincolanti per le aziende che applicano i metodi della Confusione o del Disorientamento sessuale.  <b>Solo negli impianti in fase di allevamento (al massimo 2 anni) si può intervenire in presenza del fitofago.</b></p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>, var. <i>Aizawai</i>  Metossifenozone (1)  Etofenprox(6)  Indoxacarb(2)  Fosmet (3)(4)  Clorpirifos etile(2)(4)  Thiacloprid(5)  Spinosad (7)  Emamectina (8)  Clorantniliprole (9)</p>	<p>(1) <b>Al massimo 4</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (2) <b>Al massimo 2</b> interventi l'anno.  (3) <b>Al massimo 2</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (4) <b>Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet al massimo 4</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (5) <b>Se si usano altri neonicotinoidi, è impiegabile a partire da giugno, con 1</b> intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità; se non si utilizzano altri neonicotinoidi, al massimo <b>2</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (6) <b>Al massimo 2</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (7) <b>Al massimo 3</b> interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.  (8) <b>Al massimo 2</b> interventi l'anno.  (9) <b>Al massimo 2</b> interventi l'anno. Non impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%.</p>

<p><b>Anarsia</b> <i>Anarsia lineatella</i></p>	<p><b>E' obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nel periodo della scamicatura.</b></p> <p><b>Si raccomanda l'applicazione del metodo della confusione sessuale, in combinazione con quella della cidia, ove le caratteristiche del frutteto lo consentono.</b></p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>6-7 catture per trappola a settimana o 10 catture/trappola per 2 settimane consecutive.</b></p> <p>Solo negli impianti in fase di allevamento si può intervenire anche contro la generazione svernante, in presenza del fitofago. Per innesti a dimora o impianti "a gemma dormiente", in presenza del fitofago, nella fase di ripresa vegetativa, effettuare trattamenti localizzati</p>	<p>Confusione o disorientamento sessuale</p> <p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> var. <i>Aizawai</i></p> <p>Metossifenozone (1) Etofenprox (5) Indoxacarb (9) Clorpirifos etile (2)(3) Thiacloprid(4) Spinosad (6) Emamectina (7) Clorantniliprole (8)</p>	<p>Collocare gli erogatori prima dell'inizio del volo degli adulti di prima generazione. Intensificare la densità degli erogatori sulle fasce perimetrali, in particolare sul lato esposto ai venti dominanti;</p> <p><b>(1) Al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(3) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Se si usano altri neonicotinoidi, è impiegabile a partire da giugno, con 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità; se non si utilizzano altri neonicotinoidi, al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(7) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(8) Al massimo 2 interventi l'anno. Non impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%.</b> <b>(9) Al massimo 4 interventi all'anno.</b></p>
<p><b>Mosca mediterranea</b> <i>Ceratitis capitata</i></p>	<p>Installare trappole cromotropiche gialle.</p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulti per trappola per settimana.</b></p>	<p>Etofenprox (1) Fosmet (2)(3) Lambda-cialotrina (4) Ciflutrin (4) Deltametrina (4) Zeta-cipermetrina (4) Alfacipermetrina (4) Cipermetrina (4)</p>	<p><b>Al massimo 2 interventi per tale avversità</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità.</b> <b>(3) Tra Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>

<b>Fitofagi secondari</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	Generalmente é sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli antagonisti naturali. <b>Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente, al superamento della soglia del 60% di foglie infestate.</b>	Exitiazox Tefubenpyrad Fenazaquin (1) Etoxazole Pyridaben Abamectina Acequinocil	<b>Nei confronti di questo fitofago è ammesso un solo trattamento all'anno.</b> <b>Non sono ammessi trattamenti dopo la raccolta.</b> <b>(1) Impiegabile fino al 30/11/2012.</b> Per la sua azione acarofrenante si raccomanda l'uso dello zolfo in polvere nei trattamenti contro l'oidio e la ruggine.
<b>Afidi bruno e nero</b> <i>Brachycaudus spp.</i>	<b>Non sono ammessi trattamenti di difesa specifici</b> , essendo indirettamente controllati dagli interventi effettuati nei confronti dell'afide verde.		Danno origine ad infestazioni saltuarie; compaiono prima dell'afide verde.
<b>Afidone lignicolo</b> <i>Pterochloroides persicae</i>	<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>		Provoca infestazioni solo in inverni particolarmente miti, a carico di piante isolate, producendo abbondante melata.
<b>Cicaline</b> <i>Empoasca spp.</i>		Etofenprox (1) Imidacloprid (2) Thiamethoxam (2) Buprofezin (3)	<b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Solo negli impianti in allevamento (2 anni) ammessi al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Capnode dei fruttiferi</b> <i>Capnodis tenebrionis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità; - mantenere le piante in buono stato vegetativo limitando gli stress idrici; - eliminazione delle erbe infestanti (ricovero per gli adulti svernanti); - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento e applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti; - estirpazione delle piante colpite e distruzione dell'apparato radicale mediante bruciatura entro la metà di luglio; - raccolta manuale degli adulti, soprattutto nei giovani impianti, dove l'operazione può essere effettuata agevolmente e con frequenza. Evitare nuovi impianti in zone collinari siccitose e non irrigue. <b>Interventi chimici</b> Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti.	Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Miridi</b>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> presenza consistente.	Etofenprox	<b>Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

## PESCO

### Controllo delle infestanti

<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4%	5	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso lungo la fila o alla base della pianta con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b> <b>(1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</b> <b>(2) Al massimo 1 l/ha all'anno. Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b> <b>(3) Impiegabile solo in impianti in allevamento fino a 3 anni.</b> <b>(4) Al massimo 1 l/ha per ciascun trattamento.</b> <b>(5) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento.</b> <b>(6) Prodotti in alternativa tra loro.</b>
	- Oxifluorfen 22,9% (1)	1	
	- Carfentrazone 6,45% (2)(6)	1	
	- Pendimetalin 38,72% (3)	2	
Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (5)(6)	1,6	
Monocotiledoni	Fluazifop-p-butile 13,4% (4)	2	

**Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.**

# ALBICOCCO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Monilia</b> <i>Monilia fructigena, M.laxa</i>	<p><b>Interventi agronomici</b>            In fase di impianto scegliere un sesto adeguato alla vigoria del portinnesto e della varietà; razionalizzare gli apporti azotati e idrici; asportare, con la potatura, i rami malati e i frutti mummificati per abbassare la massa d'inoculo.</p> <p><b>Interventi chimici</b>            -Periodo fiorale: intervenire preventivamente in pre-fioritura e, se la stagione è particolarmente umida, piovosa e fredda, ripetere il trattamento alla fine della fioritura.</p>	<i>Bacillus subtilis</i> Polisolfuro di calcio* Cyprodinil+Fludioxonil(4) Cyprodinil(4) Fenexamide(4) Tebuconazolo(2)(3) Fenbuconazolo(1) (3) Propiconazolo(1) (3) Bitertanolo(1)(3) Ciproconazolo(1) (3) Boscalid+Piraclostrobin(5) (6) Boscalid (6)	<p><b>Al massimo 3 interventi l'anno contro questa avversità, con esclusione del trattamento con Polisolfuro di calcio.</b>            * Da impiegare nella fase di rigonfiamento gemme  <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con IBE, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(3) Non ammesse formulazioni Xn.</b>  <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>  <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(6) Con prodotti contenenti Boscalid al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i>	<p><b>Interventi agronomici:</b>            - limitare la concimazione azotata e l'irrigazione;            - asportare e bruciare i rametti colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici</b>            Trattamento estintivo alla caduta delle foglie.</p>	Prodotti rameici (3) Thiram (1) Captano (2)	<p><b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>  <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno in alternativa al Thiram. Ammesse solo formulazioni Xn.</b>  <b>(3) Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno". Non ammessi interventi in post-fioritura.</b></p>
<b>Oidio</b> <i>Podosphaera tridactyla</i>	<p><b>Interventi chimici</b>            Negli impianti solitamente colpiti intervenire preventivamente nella fase di "scamiciatura" ed "inizio ingrossamento frutti".            Negli altri casi trattare alla comparsa dei primi sintomi.</p>	Zolfo Bitertanolo (1) Fenbuconazolo (1) Miclobutanil (1) Tebuconazolo (1)(2) Ciproconazolo (1) Boscalid+Piraclostrobin(2) (4) Quinoxifen(3) Bupirimate	<p><b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con IBE, indipendentemente dall'avversità. Non ammesse formulazioni Xn.</b>  <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(3) Al massimo 3 interventi l'anno.</b>  <b>(4) Con prodotti contenenti Boscalid al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<b>Ruggine</b> <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i>	<p>La difesa nei confronti di questa crittogama raramente si rende necessaria.</p> <p><b>Interventi chimici</b>            Sono giustificati solo in condizioni climatiche predisponenti (estati particolarmente umide e piovose).</p>	Zolfo	

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Capnode dei fruttiferi</b> <i>Capnodis tenebrionis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità; - mantenere le piante in buono stato vegetativo limitando gli stress idrici; - eliminazione delle erbe infestanti (ricovero per gli adulti svernanti); - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti; - estirpazione delle piante colpite e distruzione dell'apparato radicale mediante bruciatura entro la metà di luglio; - raccolta manuale degli adulti, soprattutto nei giovani impianti, dove l'operazione può essere effettuata agevolmente e con frequenza. Evitare nuovi impianti in zone collinari siccitose e non irrigue. <b>Interventi chimici</b> Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti.	Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Anarsia</b> <i>Anarsia lineatella</i>	<b>E' obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni in numero di 1-2 per zona omogenea.</b>  <b>Interventi chimici</b> - solo sulle varietà tardive, trattare al superamento della soglia di 7 catture/trappola a settimana o 10 catture/trappola in due settimane.	Confusione o disorientamento sessuale  <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> var. <i>Aizawai</i> Metossifenozone Etofenprox (1) Indoxacarb Thiacloprid (2) Spinosad (3) Emamectina (4) Clorantraniliprole (5)	<b>Ammesso un solo trattamento all'anno con prodotti di sintesi.</b>  <b>(1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra Imidacloprid, Acetamiprid e Thiacloprid.</b> <b>(3) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</b>
<b>Mosca mediterranea</b> <i>Ceratitis capitata</i>	Installare trappole cromotropiche gialle.  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulti per trappola per settimana.</b>	Etofenprox* Lambda-cialotrina** Deltametrina**	<b>Al massimo 2 interventi per tale avversità.</b>  *Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. ** Al massimo 1 intervento con questi piretroidi.

<b>Fitofagi secondari</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Cocciniglia S.Josè</b> <i>Comstockaspis perniciososa</i>	<b>Soglia:</b> presenza di infestazioni sui rami e danni sui frutti riscontrati nell'annata precedente. <b>Interventi chimici:</b> Intervenire contro le forme svernanti	Olio minerale Polisolfuro di calcio * Pyriproxyfen(1) Spirotetramat (2) Buprofezin (3)	*Intervenire nella fase di "bottoncino bianco" - "ingrossamento gemme"; il polisolfuro è attivo anche nei confronti della monilia e dell'oidio. <b>(1) Al massimo 1 trattamento l'anno; impiegabile prima della fioritura.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno.</b>
<b>Recurvaria, Cheimatobia</b> <b>Tortricidi ricamatori</b> <i>Recurvaria nanella,</i> <i>Operophtera brumata</i> <i>Archips spp.</i>	<b>Soglia:</b> All'osservazione dei primi germogli infestati	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. Kurstaki	
<b>Afide farinoso</b> <i>Hyalopterus pruni</i>	<b>Soglia:</b> si interviene alla comparsa delle prime colonie	Pirimicarb* Imidacloprid (1) Acetamiprid (1)	<b>E' ammesso un solo intervento l'anno contro l'avversità. Intervenire in maniera localizzata sulle piante infestate.</b> * Sospendere i trattamenti un mese prima della raccolta. <b>(1) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra Imidacloprid, Acetamiprid e Thiacloprid.</b>
<b>Moscerino</b> <i>Drosophila suzukii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele; si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.		I piretroidi e gli esteri fosforici previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro questo parassita.

## ALBICOCCO

### Controllo delle infestanti

<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha/anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4%	5	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso lungo la fila o alla base della pianta con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b>  <b>(1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</b> <b>(2) Impiegabile solo in impianti in allevamento fino a 3 anni.</b> <b>(3) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento.</b>
	- Oxifluorfen 22,9% (1)	1	
	- Pendimetalin 38,72% (2)	2	
Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (3)	1,6	

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

# SUSINO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Corineo</b> <i>Coryneum beijerinckii</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - limitare la concimazione azotata e l'irrigazione; - asportare e bruciare i rametti colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici</b> Trattamenti estintivi a caduta foglie e durante il riposo invernale.</p>	<p>Prodotti rameici (1)</p>	<p>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”. Non ammessi interventi in post-fioritura.</p>
<p><b>Monilia</b> <i>Monilia fructigena,</i> <i>M.laxa</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b> In fase di impianto scegliere un sesto adeguato alla vigoria del portinnesto e della varietà; razionalizzare gli apporti azotati e idrici; asportare, con la potatura, i rami malati e i frutti mummificati.</p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Periodo fiorale: l'intervento è ammesso, qualora si verificano condizioni favorevoli alla malattia, solo se indicato sul bollettino fitosanitario regionale.</b> Periodo pre-raccolta: sono giustificati in ambienti soggetti a forte umidità (fondovalle), per varietà sensibili o per quelle destinate a medi e lunghi periodi di conservazione.</p>	<p><i>Bacillus subtilis</i> Polisolfuro di calcio* Cyprodinil+Fludioxonil(4) Cyprodinil(4) Fenexamide(4) Tebuconazolo(2)(3) Fenbuconazolo(1) (3) Propiconazolo(1) (3) Ciproconazolo(1) (3) Boscalid+Piraclostrobin(5) (6) Boscalid (6)</p>	<p>* Da impiegare nella fase di "ingrossamento gemme"- "bottoni rosa"; i polisolfuri hanno azione anche nei confronti delle cocciniglie.</p> <p><b>Al massimo 3 interventi l'anno contro questa avversità, con esclusione del trattamento con Polisolfuro di calcio.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con IBE, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Non ammesse formulazioni Xn.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Con prodotti contenenti Boscalid al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Ruggine</b> <i>Tranzschelia pruni-spinosae</i></p>	<p><b>Interventi chimici</b> Sulle varietà più sensibili (varietà europee) e in condizioni climatiche predisponenti (caldo-umido), gli interventi chimici vanno effettuati alla comparsa delle prime pustole sulle foglie.</p>	<p>Zolfo Ciproconazolo(1)(3) Tebuconazolo (2)(3)</p>	<p><b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con IBE, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Non ammesse formulazioni Xn.</b></p>
<p><b>BATTERIOSI</b> <b>Cancro batterico delle drupacee</b> <i>Xanthomonas campestris</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b> Impiego di materiale vivaistico certificato; potatura e bruciatura delle parti infette; disinfezione delle grosse ferite e delle ampie superfici di taglio.</p> <p><b>Interventi chimici</b> In presenza accertata della malattia: - 3-4 trattamenti durante la caduta delle foglie a cadenza di 8-10 giorni; - eventuale trattamento subito dopo la potatura invernale e/o nella fase di ingrossamento delle gemme, se persiste l'umidità.</p>	<p>Prodotti rameici (1)</p>	<p>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”. Non ammessi interventi in post-fioritura.</p>

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Capnode dei fruttiferi</b> <i>Capnodis tenebrionis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità; - mantenere le piante in buono stato vegetativo limitando gli stress idrici; - eliminazione delle erbe infestanti (ricovero per gli adulti svernanti); - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento e della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti; - estirpazione delle piante colpite e distruzione dell'apparato radicale mediante bruciatura entro la metà di luglio; - raccolta manuale degli adulti, soprattutto nei giovani impianti, dove l'operazione può essere effettuata agevolmente e con frequenza. Evitare nuovi impianti in zone collinari siccitose e non irrigue. <b>Interventi chimici</b> Intervenire nel periodo primaverile-estivo alla presenza degli adulti.	Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Cidie</b> <i>Cydia funebrana</i> <i>Cydia molesta</i>	<b>E' obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nel periodo della scamicatura.</b> <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> nei confronti della prima generazione, gli interventi sono giustificati solo in caso di scarsa allegazione; nei confronti delle generazioni successive intervenire al superamento della soglia ( <b>10 catture/trappola/settimana</b> )	Etofenprox(1) Fosmet(2) Spinosad (1) Acrinatrina (3) Thiacloprid (4) Clorantroliprole (5) Emamectina (6)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Contro questa avversità al massimo 1 intervento e comunque non più di 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, di cui uno in primavera e uno nel periodo estivo.</b> <b>(4) Al massimo 1 intervento l'anno.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</b> <b>(6) Al massimo 2 interventi l'anno e solo nei confronti della <i>Cydia funebrana</i>.</b>
<b>Tripidi</b> <i>Taeniothrips meridionalis</i> <i>Thrips major</i>	<b>Soglia indicativa:</b> presenza del parassita in fioritura, su produzioni destinate al consumo fresco. Intervenire nella fase di "caduta petali"	Acrinatrina (1) Deltametrina Ciflutrin Lambda-cialotrina	<b>Amnesso un solo intervento nei confronti di questa avversità.</b> <b>(1) Contro questa avversità al massimo 1 intervento e comunque non più di 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, di cui uno in primavera e uno nel periodo estivo.</b>

<b>Tentredine</b> <i>Hoplocampa spp.</i>	<b>Interventi chimici</b> Sulle varietà caratterizzate da scarsa allegazione, intervenire alla caduta dei petali. Negli altri casi fare riferimento alla <b>soglia indicativa</b> di <b>50 catture/trappola nel corso della fioritura.</b>	Imidacloprid (1) <sup>o</sup>	<b>Ammesso un solo trattamento all'anno contro questa avversità.</b> <b>(1) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra Imidacloprid, Acetamiprid e Thiacloprid.</b> <sup>o</sup> <b>Non ammesso l'impiego in immediata pre-fioritura.</b>
<b>Cocciniglia S.Josè</b> <i>Comstockaspis pernicioso</i>	<b>Soglia:</b> presenza del parassita  <b>Interventi chimici:</b> Intervenire contro le forme svernanti	Olio minerale Polisolfuro di calcio* Fosmet (1) Spirotetramat (2) Buprofezin (3)	*Intervenire nella fase di "bottone bianco" - "ingrossamento gemme". Il polisolfuro è attivo anche nei confronti della monilia e dell'oidio. <b>(1) Al massimo 1 intervento nei confronti dell'avversità e massimo 2 interventi complessivi l'anno sulla coltura.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età.</b>
<b>Fitofagi secondari</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>60% di foglie infestate</b>	Clofentezine Pyridaben Etoxazole	<b>E' ammesso un unico intervento acaricida all'anno.</b>
<b>Parlatoria dei fruttiferi</b> <i>Parlatoria oleae</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> presenza con danni sui frutti nelle annate precedenti.  Intervenire, alla massima schiusura delle uova, nei confronti della prima (maggio) o di entrambe le generazioni (maggio, luglio), in funzione dell'epoca di maturazione dei frutti.	Olio minerale bianco* Polisolfuro di calcio** Fosmet (1)	* <b>Utilizzare alla dose di 1,5 l/ha; per evitare fenomeni di fitotossicità non impiegare contro la generazione estiva.</b> ** Intervento di completamento, da effettuare nella fase di "gemma rigonfia"- "bottone bianco". Il polisolfuro è attivo anche nei confronti della monilia e dell'oidio. <b>(1) Al massimo 1 intervento nei confronti dell'avversità e massimo 2 interventi complessivi l'anno sulla coltura.</b>
<b>Afidi verdi</b> <i>Brachycaudus helychrisi,</i> <i>Myzus persicae</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>3% di organi infestati</b>	Pirimicarb* Flonicamid (1) Imidacloprid (2) Acetamiprid (2) Thiamethoxam(2) Spirotetramat (3)	Il trattamento di "caduta petali", effettuato nei confronti dei tripidi, è generalmente risolutivo anche nei confronti degli afidi. * <b>Impiegabile una sola volta ed almeno 30 giorni prima della raccolta.</b> <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra Imidacloprid, Acetamiprid e Thiacloprid.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<p><b>Afide farinoso</b>  <i>Hyalopterus pruni</i></p>	<p><b>Interventi chimici</b>  <b>Soglia:</b>  si interviene alla comparsa delle prime colonie</p>	<p>Flonicamid (1)  Imidacloprid (2)  Acetamiprid (2)  Thiamethoxam (2)</p>	<p><b>Amnesso un solo intervento nei confronti di questa avversità.</b>  <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(2) Indipendentemente dall'avversità al massimo 1 intervento all'anno tra Imidacloprid, Acetamiprid e Thiacloprid.</b></p>
--	---	--	---

## SUSINO

### Controllo delle infestanti

<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9%(1) - Carfentrazone 6,45% (2)(4)	5 1 1	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati è ammesso lungo la fila o alla base della pianta con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b> <b>(1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</b> <b>(2) Al massimo 1 l/ha all'anno. Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b> <b>(3) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento.</b> <b>(4) Prodotti in alternativa tra loro.</b>
Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (3)(4)	1,6	

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

# CILIEGIO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Moniliosi</b> <i>Monilia laxa</i> <i>Monilia fructigena</i>	Sintomi o danni in anni precedenti.  <b>Interventi chimici:</b> al rigonfiamento gemme con polisolfuro e alla sfioritura con altri principi attivi.	<i>Bacillus subtilis</i> Polisolfuro di calcio*  Propiconazolo** Fenexamide** Tebuconazolo** Fenbuconazolo** Bitertanolo** Boscalid+ Piraclostrobin**(1) Ciprodinil+Fludioxonil** Boscalid**(1)	<b>Al massimo tre interventi all'anno contro questa avversità.</b>  <b>* Da impiegare nella fase di "rigonfiamento gemme".</b>  <b>** Al massimo due interventi all'anno e non oltre la fase di "scamicatura".</b> <b>(1) Prodotti contenenti Boscalid impiegabili per massimo 2 interventi.</b>
<b>Bolla</b> <i>Taphrina cerasi</i>  <b>Corineo</b> <i>Coryneum bejerinckii</i>  <b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	<b>Interventi chimici:</b> al bruno, nelle fasi di caduta foglie e rigonfiamento gemme.	Prodotti rameici (1) Thiram (2)	<b>(1) Al massimo due interventi all'anno.</b> <b>Ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno".</b> <b>Non ammessi interventi in post-fioritura.</b>  <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, solo nei confronti di bolla e corineo.</b>

Fitofagi principali	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Afide nero</b> <i>Myzus cerasi</i>	<b>Soglia:</b> presenza del fitofago sull' <b>1% dei getti</b> o esperienza di danni in anni precedenti.	Imidacloprid* Acetamiprid* Thiamethoxam* Pirimicarb Piretro naturale Fluvalinate (1)	<b>Al massimo 1 intervento l'anno con prodotti di sintesi.</b>  <b>*Neonicotinoidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, dei quali non più di 1 con Imidacloprid o Thiametoxam.</b> <b>(1) Impiegabile solo in pre-fioritura.</b>

<b>Cocciniglia di S. Josè</b> <i>Comstockaspis pernicioso</i>  <b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudalacaspis pentagona</i>  <b>Cocciniglia a virgoia</b> <i>Lepidosaphes ulmi</i>	<b>Soglia: presenza.</b>	Polisolfuro di calcio Olio minerale bianco Fosmet (1) Spirotetramat (2) Buprofezin (3)	<b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, solo nei confronti di <i>C. pernicioso</i> e <i>P. pentagona</i>.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire nella fase di bottoni rosa su larve di prima e di seconda età. Impiegabile solo contro <i>Comstockaspis pernicioso</i>.</b>
<b>Mosca delle ciliegie</b> <i>Rhagoletis cerasi</i>	<b>Soglia:</b> catture nelle trappole cromotropiche o a feromoni. Intervenire con trattamenti adulicidi all'inizio delle catture e/o larvicida all'inizio invaiatura. -Le varietà a maturazione precoce (entro maggio) in genere sfuggono all'attacco.	Etofenprox (1) Thiamethoxam (2) Fosmet (1)(3)	<b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Neonicotinoidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, dei quali non più di 1 con Imidacloprid o Thiametoxam.</b> <b>(3) Fare attenzione a possibili rischi di fitotossicità, utilizzare esclusivamente su cv. "Ferrovia", non miscelare con altri formulati, utilizzare a volumi normali (10 – 12 hl/ha), non concentrare la soluzione.</b>
<b>Capnode dei fruttiferi</b> <i>Capnodis tenebrionis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità; - mantenere le piante in buono stato vegetativo limitando gli stress idrici; - eliminazione delle erbe infestanti (ricovero per gli adulti svernanti); - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento e la chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti; - estirpazione delle piante colpite e distruzione dell'apparato radicale mediante bruciatura entro la metà di luglio; - raccolta manuale degli adulti, soprattutto nei giovani impianti, dove l'operazione può essere effettuata agevolmente e con frequenza. Evitare nuovi impianti in zone collinari siccitose e non irrigue.		
<b>Rodilegni</b> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i>	Uncinamento delle larve all'osservazione delle rosura	Trappole e feromoni per cattura massale	
<b>Scolitidi</b> <i>Scolytus rugulosus</i>	Eliminare con la potatura e bruciare i rami colpiti. Non lasciare in campo cataste di materiale di potatura.		

<p><b>Cheimatobia o falena</b>  <i>Operophtera brumata</i>  <b>Tignola delle gemme</b>  <i>Argyresthia ephippella</i>  <b>Archips rosana</b>  <i>Archips rosanus</i>  <b>Tignola dei fruttiferi</b>  <i>Recurvaria nanella</i></p>	<p><b>soglia:</b>  presenza di organi infestati.    Intervenire in post-fioritura.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i></p>	
<p><b>Cimicetta</b>  <i>Monosteira unicastata</i></p>	<p><b>Soglia:</b>  comparsa dell' infestazione.</p>	<p>Etofenprox(1)  Thiacloprid (2)</p>	<p><b>(1) Ammesso un solo intervento l'anno indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(2) Neonicotinoidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità, dei quali non più di 1 con Imidacloprid o Thiametoxam.</b></p>
<p><b>Moscerino</b>  <i>Drosophila suzukii</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b>  si consiglia il monitoraggio con trappole innescate con esche di aceto di succo di mele; si consiglia di eliminare tempestivamente tutti i frutti colpiti.</p>		<p>I piretroidi e gli esteri fosforici previsti per la difesa da altre avversità possono essere efficaci anche contro questo parassita.</p>

## CILEGIO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9% (1)	5 1	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b>  (1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate. (2) Al massimo 1 l/ha per ciascun trattamento. (3) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento.
	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (3)	1,6	
	Monocotiledoni	Fluazifop-p-butile 13,4% (2)	2	

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

# MANDORLO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Corineo, bolla e cancri batterici.</b></p> <p><i>Coryneum beijerinckii</i> <i>Taphrina deformans</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - limitare la concimazione azotata e l'irrigazione; - asportare e bruciare i rametti colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> trattamenti estintivi da effettuarsi nelle fasi di caduta foglie e rigonfiamento gemme.</p>	Prodotti rameici (1)	<b>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”. Non ammessi interventi in post-fioritura.</b>
<p><b>Moniliosi</b></p> <p><i>Monilia laxa e</i> <i>Monilia fructigena</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - razionalizzazione delle concimazioni azotate e delle irrigazioni; - eliminazione e distruzione dei frutti mummificati.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>-periodo florale:</b> intervenire preventivamente in pre-fioritura e, se la stagione è particolarmente umida, piovosa e fredda, ripetere il trattamento alla fine della fioritura.</p>	Tebuconazolo (1) Ciproconazolo (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi complessivi all'anno, nelle fasi di pre e post-fioritura.</b>
<p><b>Cancro dei nodi</b></p> <p><i>Fusicoccum amygdali</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> nel corso della potatura, asportare i rami ammalati e bruciare il materiale di risulta.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>solo in presenza accertata della malattia</b> 1-3 trattamenti durante la caduta delle foglie 1-2 interventi al rigonfiamento delle gemme.</p>	Prodotti rameici (1)	<b>(1) Ammessi interventi solo autunnali e invernali “al bruno”. Non ammessi interventi in post-fioritura.</b>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Cimicetta</b> <i>Monosteira unicastata</i>	<b>Soglia:</b> comparsa dell' infestazione.	Imidacloprid*	* Tra Imidacloprid, Thiacloprid e Thiamethoxam al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> <i>Hyalopterus pruni</i> <i>Appelia schwartzi</i>	<b>Interventi chimici:</b> da effettuarsi nella fase di caduta petali e successivamente, in caso di reinfestazione. <b>Soglia:</b> 1 % dei germogli infestati.	Pirimicarb Imidacloprid (1) Thiacloprid (1)	<b>Ammesso un solo intervento all'anno nei confronti dell'avversità.</b> <b>(1) Tra Imidacloprid, Thiacloprid e Thiamethoxam al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>  <b>Cocciniglia S. Josè</b> <i>Comstockaspis perniciososa</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione dei rami più infestati; - spazzolatura delle branche  <b>Interventi chimici:</b> intervenire con i polisolfuri alla fine dell'inverno. Integrare la difesa con trattamenti nei confronti delle neanidi di prima generazione.	Olio minerale bianco* Polisolfuro di calcio**	I trattamenti vanno eseguiti curando bene la bagnatura della parte legnosa della pianta. * <b>Utilizzare alla dose di 1-1,5 l/hl, solo contro la prima generazione; per evitare fenomeni di fitotossicità non usare nelle ore più calde e distanziare di almeno 20 gg da eventuali interventi con prodotti contenenti zolfo.</b> ** Il polisolfuro ha una azione collaterale nei confronti di monilia, bolla e corineo.
<b>Capnide dei fruttiferi</b> <i>Capnodis tenebrionis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiegare materiale di propagazione che risponda alle norme di qualità; -mantenere le piante in buono stato vegetativo limitando gli stress idrici; - eliminazione delle erbe infestanti (ricovero per gli adulti svernanti); - quando possibile, dissotterrare il colletto delle piante con sintomi localizzati di deperimento e della chioma ed applicare intorno alla base della pianta una rete metallica a maglia fitta, per catturare gli adulti emergenti; -estirpazione delle piante colpite e distruzione dell'apparato radicale mediante bruciatura entro la metà di luglio; - raccolta manuale degli adulti, soprattutto nei giovani impianti, dove l'operazione può essere effettuata agevolmente e con frequenza. Evitare nuovi impianti in zone collinari siccitose e non irrigue.		

## MANDORLO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9% (1)	5 1	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati è ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b>  (1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

# MELO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Ticchiolatura</b> <i>Venturia inaequalis</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> adottare un turno fisso o allungato in funzione della varietà, dei diversi microclimi, dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida. In assenza di infezioni in atto, interrompere i trattamenti anticchiolatura dopo la fase del frutto "noce".</p> <p><b>Interventi agronomici:</b> - negli impianti attaccati si consiglia interrare le foglie colpite, trattate preventivamente con urea (dose massima di 1q/ha); - dalla fioritura in poi, distruzione delle erbe infestanti; nei frutteti inerbiti eseguire frequenti trinciature fino alla fase di frutto noce.</p>	<p>polisolfuro di Ca idrossido rame° ossicloruro rame° poltiglia bordolese ° propineb*° metiram*° dithianon ° dodina° captano (4) pyrimethanil** cyprodinil**</p> <p>trifloxystrobin (1) Boscalid+Piraclostrobin(1)</p> <p>bitertanolo****(3) difenconazolo****(3) fenbuconazolo****(3) miclobutanil****(3) penconazolo****(3) tebuconazolo****(3) tetraconazolo****(3) ciproconazolo****(3) fluazinam***(2)</p>	<p>° <b>impiegabili anche in miscela con i prodotti endoterapici</b></p> <p>* <b>Ditiocarbammati: impiegabili fino alla fase di frutto "noce" e per un massimo di 2 interventi.</b></p> <p>** <b>Anilinopirimidine: non ammessi più di 4 interventi nel corso dell'annata.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b></p> <p>*** <b>Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p>**** <b>IBE: non effettuare più di 4 interventi nel corso dell'annata, indipendentemente dall'avversità da controllare; è consigliabile impiegarli in miscela con anticrittogamici a differente meccanismo d'azione.</b> <b>(2) Fare attenzione al tempo di carenza di 60 giorni.</b> <b>(3) Non ammesse formulazioni Xn.</b> <b>(4) Al massimo 3 interventi l'anno.</b> Non impiegare la dodina sulla Golden Delicious e su altre varietà a buccia chiara.</p>

<p><b>Oidio</b> <i>Oidium farinosum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> asportare, durante la potatura invernale, i rametti con gemme oidiate ed eliminare, in primavera-estate, i germogli colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> - per varietà più recettive poste in zone a rischio si consiglia di agire preventivamente nella fase di pre-fioritura; negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi.</p>	<p>polisolfuro di Ca** zolfo</p> <p>bitertanolo*(2) difenconazolo*(2) fenbuconazolo*(2) miclobutanil*(2) penconazolo*(2) bupirimate* tebuconazolo*(2) ciproconazolo*(2) tetraconazolo*(2) quinoxifen (1) trifloxystrobin° Boscalid+Piraclostrobin°</p>	<p>** da impiegare nella fase di rigonfiamento gemme su varietà sensibili ( gruppo Delicious, Summerred, gruppo Gala, Jonagold, Florina, Fuji, Braeburn, ecc.)</p> <p><b>*Non effettuare più di 4 interventi nel corso dell'annata, indipendentemente dall'avversità da controllare.</b></p> <p>°Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro. <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</b> <b>(2) Ammesse solo formulazioni non Xn.</b></p>
<p><b>Cancri e disseccamenti rameali</b> <i>Nectria galligena et al.</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> nel corso della potatura asportare e bruciare i rami colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> intervenire ad inizio caduta foglie e nella fase di ingrossamento delle gemme.</p>	<p>idrossido di rame ossicloruro di rame poltiglia bordolese ditianon</p>	
<p><b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora spp.</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza accertata della malattia.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> Intervenire sulla chioma, nel periodo primaverile, e al colletto sia in primavera che in autunno.</p> <p><b>Interventi agronomici:</b> - evitare l'impianto in zone soggette a ristagni di acqua o in terreni poco permeabili; - impiegare portinnesti tolleranti; - effettuare interventi di drenaggio.</p>	<p>fosetil Al M-metalaxil * idrossido di rame ossicloruro di rame poltiglia bordolese</p>	<p><b>Interventi localizzati.</b></p> <p><b>*AmMESSO solo l'impiego di formulati granulari</b></p>

Fitofagi principali	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Afide grigio</b> <i>Dysaphis plantaginea</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> vista la difficoltà di controllare l'insetto dopo la fioritura, si consiglia di intervenire cautelativamente prima della comparsa dei "bottoni rosa".</p>	<p>Azadiractina Imidacloprid* Thiamethoxam* Acetamiprid* Clotianidin* Pirimicarb° Flonicamid (1) Fluvalinate (2) Spirotetramat (3)</p>	<p>*<b>Impiegabili, in alternativa tra loro, una sola volta all'anno, indipendentemente dal fitofago da controllare, nella fase di "orecchiette di topo" - "mazzetti affioranti".</b> ° <b>Impiegabile 2 volte all'anno indipendentemente dal fitofago da controllare.</b> <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, solo in pre-fioritura.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Carpocapsa</b> <i>Cydia pomonella</i></p>	<p>Si consiglia l'applicazione del metodo della confusione sessuale, ove le caratteristiche dell'impianto lo consentono.</p> <p><b>E' obbligatorio l'uso delle trappole a ferormoni, in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nella fase di caduta petali.</b></p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> 2 adulti per trappola catturati in una o due settimane consecutive; superamento dell'1% di frutti con fori iniziali di penetrazione (rilievo effettuato su almeno 100 frutti/ha).</p>	<p>Erogatori di feromoni <i>Bacillus thuringiensis</i> Granulo-Virus Diflubenzuron (1) Flufenoxuron (1)(2) Tebufenozide (1) Metossifenozide (1) Etofenprox (3) Indoxacarb (4) Clorpirifos etile (5)(7) Fosmet (6)(7) Thiacloprid (8) Spinosad (9) Clorantraniliprole (10) Emamectina (11)</p>	<p><b>(1) Ammessi 3 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità e solo entro la fine di maggio.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 1 intervento l'anno.</b> <b>(5) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(7) Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</b> <b>(8) Al massimo 1 intervento l'anno. Non ammesso contro la I generazione. Solo nel caso in cui sulla coltura non siano impiegati altri neonicotinoidi (Imidacloprid, Thiamethoxam, Acetamiprid, Clotianidin): impiegabile anche in I generazione; impiegabile 2 volte l'anno; nella stessa annata non può comunque essere impiegato su due generazioni consecutive.</b> <b>(9) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(10) Al massimo 2 interventi l'anno. Non impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con contenuto di sabbia superiore all'80%.</b> <b>(11) Al massimo 2 interventi l'anno.</b></p>

<p><b>Cocciniglia S. Josè</b> <i>Comstockaspis perniciosia</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza del parassita. <b>Interventi chimici:</b> Intervenire preferibilmente contro le forme svernanti e, solo in caso di forti infestazioni, anche alla migrazione delle neanidi.</p>	<p>Polisolfuro di Ca Olio bianco Pyriproxyfen(1) Clorpirifos metile (2)(3) Fosmet (2)(3) Spirotetramat (4) Buprofezin (5)</p>	<p>Il polisolfuro è attivo anche nei confronti di ticchiolatura, cancri rameali e oidio. <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno; impiegabile prima della fioritura.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno contro questa avversità.</b> <b>(3) Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</b> <b>(4) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 1 intervento l'anno.</b></p>
<p><b>Afide lanigero</b> <i>Eriosoma lanigerum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> nel corso della potatura , allontanare i rami colpiti; limitare i grossi tagli e lesioni varie. <b>Interventi chimici:</b> su infestazioni in atto intervenire al superamento della <b>soglia</b> di 10 colonie vitali su 100 organi controllati. Verificare l'entità della parassitizzazione in quanto, spesso, l'attività del parassita <i>Aphelinus mali</i> è sufficiente a contenere le infestazioni.</p>	<p>Pirimicarb * Thiamethoxam (1) Acetamiprid(1) Imidacloprid (1) Spirotetramat (2)</p>	<p><b>Interventi localizzati.</b>  * <b>Prodotto impiegabile massimo 2 volte all'anno indipendentemente dal fitofago da controllare.</b> <b>(1) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Acetamiprid e Clotianidin al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Rodilegno rosso</b> <i>Cossus cossus</i></p>	<p>Effettuare la <b>cattura massale</b>, installando non meno di 10 trappole per ettaro entro la prima metà di maggio e l'uncinamento delle larve all'osservazione della rosura.</p>		
<p><b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza del fitofago. Effettuare la <b>cattura massale</b>, installando 5-10 trappole per ettaro, entro la prima metà di maggio.  <b>Interventi chimici:</b> <b>è obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni.</b> Intervenire 3 settimane dopo l'inizio del volo e ripetere l'intervento dopo 20 giorni.  Nei giovani impianti è consigliabile la tecnica dell'uncinatura.</p>		

<b>Mosca mediterranea</b> <i>Ceratitis capitata</i>	Installare trappole cromotropiche gialle.  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulti per trappola per settimana.</b>	Ciflutrin* Deltametrina* Etofenprox*^	<b>Al massimo 2 interventi per tale avversità</b>  * Al massimo 1 intervento l'anno, prodotti in alternativa tra loro. ^Prodotto impiegabile una sola volta l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Fitofagi secondari</b> <b>Afide verde</b> <i>Aphis pomi</i>	<b>Criteri d'intervento</b>  Le infestazioni sono generalmente controllate dai trattamenti nei confronti dell'afide grigio.	<b>Principi attivi</b>  Azadiractina Pirimicarb* Clotianidin**(1) Acetamiprid (1) Thiamethoxam (1) Flonicamid (2) Spirotetramat (3)	<b>Limitazioni d'uso e note</b>  <b>Amnesso un solo intervento nei confronti di questa avversità.</b> *Prodotto impiegabile massimo 2 volte all'anno indipendentemente dal fitofago da controllare. (1) Tra Imidacloprid, Thiamethoxam, Acetamiprid e Clotianidin al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. **Amnesso 1 trattamento l'anno, nella fase di post-fioritura. (3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli antagonisti naturali. Occasionalmente, può essere necessario intervenire chimicamente, al superamento della <b>soglia dell'80 - 90% di foglie infestate.</b>	Tefubenpyrad Fenazaquin (1) Etoxazole Exitiazox Clofentezine Pyridaben Abamectina Mylbemectina Acequinocil	<b>Nei confronti di questi fitofagi è amnesso un solo trattamento all'anno.</b> <b>Non sono amnessi trattamenti dopo la raccolta.</b> <b>(1) Impiegabile fino al 30/11/2012.</b> Per la sua azione acarofrenante si raccomanda l'uso dello zolfo in polvere nei trattamenti contro l'oidio.
<b>Sesia</b> <i>Sinanthedon typhiaeformis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> asportare le parti infestate e favorire la rapida cicatrizzazione dei tagli utilizzando paste cicatrizzanti.		I trattamenti contro la carpocapsa sono efficaci anche nei confronti di questa avversità.
<b>Cicaline</b> <i>Empoasca</i> spp. e altre	Nessun trattamento		

<p><b>Antonomo</b> <i>Anthonomus pomorum</i></p>	<p>Negli impianti a rischio (zone collinari vicino a boschi) o dove vi sono stati danni nell'anno precedente si consiglia il controllo, per scuotimento, nella fase di gemme gonfie.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> soglia: con fioritura abbondante, trattare quando si rilevano 50 adulti ogni 100 battute di rami su 50 piante/ha; 10 adulti, in caso di scarsa fioritura.</p>		<p>Al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità.</p>
<p><b>Pandemis</b> <i>Pandemis cerasana</i></p> <hr/> <p><b>Archips</b> <i>Archips spp.</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> nei confronti della generazione svernante intervenire al superamento del 20% di organi occupati dalle larve.</p> <p>Nei confronti delle generazioni successive trattare al superamento della soglia di 15 adulti di <i>Pandemis</i> catturati per trappola in 2 settimane o 30 adulti come somma delle 2 specie.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> Flufenoxuron (1)(2) Metossifenoziide(1) Tebufenozide(1) Clorpirifos-metile(3) Indoxacarb Spinosad (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6)</p>	<p>Al massimo due interventi l'anno con prodotti di sintesi contro questa avversità.</p> <p>(1) Ammessi 3 interventi complessivi all'anno con Diflubenzuron, Metossifenoziide, Flufenoxuron e Tebufenozide, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità e solo entro la fine di maggio.</p> <p>(3) Al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità. Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</p> <p>(4) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p> <p>(6) Al massimo 2 interventi l'anno. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</p>
<p><b>Orgia</b> <i>Orgia antiqua</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> raccolta e distruzione delle ovature invernali, in occasione delle operazioni di potatura delle piante.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> in presenza di infestazioni larvali.</p>	<p>Confusione sessuale <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Flufenoxuron (1)(2) Diflubenzuron (2)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità e solo entro la fine di maggio.</p> <p>(2) Ammessi 3 interventi complessivi all'anno con Diflubenzuron, Metossifenoziide, Flufenoxuron e Tebufenozide, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Ragna del melo</b> <i>Hyponomeuta malinellus</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> soppressione dei nidi con la potatura invernale.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> alla schiusura delle uova.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i></p>	<p>La presenza del parassita si verifica spesso nelle zone interne, in presenza di biancospino, melo selvatico, boschi, ecc.</p>

<p><b>Pieride del melo</b></p> <p><i>Aporia crataegi</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> soppressione dei nidi con la potatura invernale.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> alla schiusura delle uova.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. kurstaki</p>	<p>La presenza del parassita si verifica spesso nelle zone interne, in presenza di biancospino, melo selvatico, boschi ecc.</p>
--	--	--	---

## MELO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9% (1) - MCPA 25% (3) - Carfentrazone 6,45% (2)(6) - Fluroxypir 20,6% - Pendimetalin 38,72% (4) - Oxadiazon 34,1% (4)	5 1 1,5 1 2 2 4	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b> <b>(1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</b> <b>(2) Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b> <b>(3) Impiegabile in miscela con Glifosate nel periodo fine estate-inizio autunno.</b> <b>(4) Impiegabile solo in impianti in allevamento fino a 3 anni.</b> <b>(5) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</b> <b>(6) Prodotti in alternativa tra loro.</b>
	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (5)(6)	1,6	
	<b>Spollonante</b>	- Carfentrazone 6,45% (1) - Pyraflufen-ethyl 2,6% (2)(3)	0,9-1 1,6	<b>(1) Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</b> <b>(2) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</b> <b>(3) Prodotti in alternativa tra loro.</b>

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

# PERO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Ticchiolatura</b> <i>Venturia pirina</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> Adottare un turno fisso o allungato in funzione della varietà, dei diversi microclimi, dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida. In assenza di infezioni in atto, interrompere i trattamenti antiticchiolatura dopo la fase del frutto "noce".</p> <p><b>Interventi agronomici:</b> - negli impianti attaccati si consiglia interrare le foglie colpite, trattate preventivamente con urea (dose massima di 1q/ha); - dalla fioritura in poi, distruzione delle erbe infestanti; nei frutteti inerbiti eseguire frequenti trinciature fino alla fase di frutto noce.</p>	<p>Polisolfuro di Ca</p> <p>Idrossido rame° Ossicloruro rame° Poltiglia bordolese °</p> <p>Propineb*° Metiram*° Tiram°* Dithianon ° Dodina°</p> <p>Pyrimetanil (1) Cyprodinil (1)(2)</p> <p>Trifloxystrobin (3) Boscalid+Piraclostrobin(3) (4)</p> <p>Bitertanolo(5)(6) Difenconazolo(5) (6) Fenbuconazolo(5) (6) Miclobutanil(5) (6) Penconazolo(5) (6) Tetraconazolo(5) (6) Tebuconazolo(5) (6) Ciproconazolo(5) (6)</p>	<p>° <b>Impiegabili anche in miscela con i prodotti endoterapici.</b></p> <p><b>* Ditiocarbammati: impiegabili per non più di due interventi l'anno indipendentemente dall'avversità, fino alla fase di frutto "noce" o, nelle cv. sensibili alla maculatura, fino a 40 gg dalla raccolta;</b> <b>(1) Al massimo 4 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Con prodotti contenenti Cyprodinil al massimo 4 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b> <b>(4) Con prodotti contenenti Boscalid al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) IBE: non effettuare più di 3 interventi nel corso dell'annata, indipendentemente dall'avversità da controllare;</b> <b>(6) Non ammesse formulazioni Xn.</b></p>

<p><b>Maculatura bruna</b> <i>Stemphylium vesicarium</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> evitare i ristagni idrici e limitare le irrigazioni, soprattutto quelle sovrachioma; interrare le foglie colpite trattate preventivamente con urea, raccogliere e distruggere i frutti colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>solo in presenza accertata della malattia</b>, effettuare trattamenti dalla fase di caduta petali fino alla pre-raccolta, con turni fissi, variabili in funzione dell'intensità della malattia.</p> <p>Nei pereti indenni si consiglia di effettuare rilievi settimanali per poter intervenire alla comparsa delle prime macchie.</p>	<p><i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>sbs plantarum</i> Idrossido di rame Ossicloruro di rame Poltiglia bordolese</p> <p>Tiram*</p> <p>Tebuconazolo** Boscalid+Piraclostrobin(1) Trifloxystrobin(1) Cyprodinil+Fludioxonil (2)</p> <p>Boscalid (3) Fludioxonil (4)</p>	<p><b>Ammessi gli interventi solo nelle varietà sensibili nei confronti di questa avversità: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Passacrassana, Kaiser, General Leclerc.</b></p> <p><b>* Ditiocarbammati: massimo due trattamenti l'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>Ne è consentito l'uso fino a 40 giorni dalla raccolta.</b></p> <p><b>** Prodotto ammesso per massimo 3 interventi all'anno e comunque non più di 3 IBE complessivi. Non ammesse formulazioni Xn.</b></p> <p><b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b> <b>(2) Al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Con prodotti contenenti Cyprodinil al massimo 4 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 3 interventi l'anno considerando anche i trattamenti effettuati impiegando la miscela con Piraclostrobin.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno. Con prodotti contenenti Fludioxonil al massimo 4 interventi l'anno.</b></p>
<p><b>Cancri e disseccamenti rameali</b> <i>Nectria galligena et al.</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> nel corso della potatura asportare e bruciare i rami colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> intervenire ad inizio caduta foglie e nella fase di ingrossamento delle gemme.</p>	<p>Idrossido di rame Ossicloruro di rame Poltiglia bordolese</p>	
<p><b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora cactorum</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza accertata della malattia.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> Intervenire sulla chioma, nel periodo primaverile, e al colletto sia in primavera che in autunno.</p> <p><b>Interventi agronomici:</b> - evitare l'impianto in zone soggette a ristagni di acqua o in terreni poco permeabili; - impiegare portinnesti tolleranti; - effettuare interventi di drenaggio.</p>	<p>Fosetil Al</p>	<p><b>Interventi localizzati.</b></p>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Psilla</b> <i>Cacopsylla pyri</i>	Preferire i principi attivi più selettivi per gli interventi contro carpocapsa, ricamatori e cocciniglie; ricorrere ai lavaggi per ridurre i danni da melata e controllare lo sviluppo del fitofago. <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> presenza diffusa del fitofago e danni da melata.	Olio minerale Abamectina (1) Spirotetramat (2)	(1) <b>Al massimo 2 interventi l'anno, entro la fine di giugno.</b> (2) <b>Al massimo 2 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità, 1 contro questa avversità. Il prodotto va posizionato sulle uova.</b>
<b>Carpocapsa</b> <i>Cydia pomonella</i>	Si consiglia l'applicazione del metodo della confusione sessuale, ove le caratteristiche dell'impianto lo consentono.  <b>E' obbligatorio l'uso delle trappole a ferormoni, in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nella fase di caduta petali.</b>  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2 adulti per trappola catturati in una o due settimane consecutive.</b>	Erogatori di feromoni <i>Bacillus thuringiensis</i> Granulo-Virus Diflubenzuron(1) Tebufenozide(1) Metossifenoziide(1) Clorpirifos etile(2)(4) Fosmet (3)(4) Spinosad (5) Clorantraniliprole (6) Emamectina (7)	(1) <b>Ammessi 3 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (2) <b>Al massimo 3 interventi l'anno.</b> (3) <b>Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (4) <b>Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</b> (5) <b>Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (6) <b>Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</b> (7) <b>Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Cocciniglia S. Josè</b> <i>Comstockaspis perniciosia</i>	<b>Soglia:</b> presenza del parassita.  <b>Interventi chimici:</b> Intervenire preferibilmente contro le forme svernanti e, in caso di forti infestazioni, anche alla migrazione delle neanidi.	Polisolfuro di Ca Olio bianco Pyriproxyfen(1) Clorpirifos metile (2)(3) Fosmet (2)(3) Spirotetramat (4) Buprofezin (5)	Il polisolfuro è attivo anche nei confronti di ticchiolatura e cancri rameali. (1) <b>Al massimo 1 intervento l'anno; impiegabile prima della fioritura.</b> (2) <b>Al massimo 2 interventi l'anno contro questa avversità.</b> (3) <b>Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</b> (4) <b>Al massimo 2 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità, 1 contro questa avversità.</b> (5) <b>Al massimo 1 intervento l'anno.</b>

<b>Tentredine</b> <i>Hoplocampa brevis</i>	Installare, entro l'inizio di Marzo, almeno 2 trappole cromotropiche bianche per appezzamento. <b>Soglia:</b> 20 adulti /trappola catturati dall'inizio del volo o 10% di corimbi infestati. <b>Interventi chimici:</b> unico trattamento da effettuarsi nella fase di caduta petali.	Imidacloprid* Acetamiprid* Thiamethoxam*	<b>Amnesso al massimo 1 intervento l'anno contro questa avversità.</b>  * <b>Al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b>
<b>Rodilegno rosso</b> <i>Cossus cossus</i>	In presenza di infestazioni in atto effettuare la <b>cattura massale</b> , installando non meno di 10 trappole per ettaro, entro la prima metà di maggio.		
<b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i>	In presenza di infestazioni in atto effettuare la <b>cattura massale</b> , installando 5-10 trappole per ettaro, entro la prima metà di maggio.  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> presenza del parassita. <b>E' obbligatorio l'uso di trappole a ferormoni.</b> Intervenire 3 settimane dopo l'inizio del volo e ripetere l'intervento dopo 20 giorni.		
<b>Mosca mediterranea</b> <i>Ceratitis capitata</i>	Installare trappole cromotropiche gialle.  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2% di frutti con punture fertili; 10 catture di adulti per trappola per settimana.</b>  In caso di controllo larvicida intervenire al superamento della soglia In caso di controllo adulticida impiegare le esche proteiche avvelenate alle prime catture irrorando a filari alterni la parte più soleggiata delle piante, utilizzando 200 litri/ha di soluzione	Ciflutrin* Deltametrina* Etofenprox* <sup>^</sup>  Esche proteiche con Deltametrina	* <b>Al massimo 1 intervento l'anno, prodotti in alternativa tra loro.</b> <sup>^</sup> <b>Prodotto impiegabile una sola volta l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<b>Fitofagi secondari</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Agrilo</b> <i>Agrilus sinuatus</i>	<b>Interventi agronomici:</b> asportare e bruciare i rami infestati dalle larve.		
<b>Afide grigio</b> <i>Dysaphis pyri</i>	<b>Interventi chimici:</b> trattare al superamento della soglia del 5% di piante colpite.  Le infestazioni afidiche sono indirettamente controllate dagli interventi effettuati nei confronti della tentredine.	Imidacloprid* Acetamiprid* Flonicamid °	* <b>Al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b> ° <b>Amnesso 1 trattamento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Cecidomia fogliare</b> <i>Dasineura pyri</i>	Negli impianti in produzione gli attacchi di cecidomia sono indirettamente controllati dagli interventi effettuati nei confronti della tentredine.		

<b>Ragnetto rosso</b> <i>Panonychus ulmi</i> <i>Tetranychus urticae</i>	Generalmente è sufficiente l'azione di contenimento svolta dagli antagonisti naturali. <b>Interventi chimici al superamento della soglia del 60% di foglie infestate.</b>	Clofentezine Exitiazox Tefubenpyrad Fenazaquin (1) Etoxazole Pyridaben Acequinocil	<b>Amnesso 1 trattamento all'anno nei confronti dell'avversità.</b> <b>(1) Impiegabile fino al 30/11/2012.</b>
<b>Pandemis</b> <i>Pandemis cerasana</i>  <b>Archips</b> <i>Archips podanus</i>	<b>Interventi chimici:</b> nei confronti della generazione svernante intervenire al superamento del 20% di organi occupati dalle larve.  Nei confronti delle generazioni successive trattare al superamento della <b>soglia</b> di 15 adulti di <i>Pandemis</i> catturati per trappola in 2 settimane o 30 adulti come somma delle due specie.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Metossifenzozide (1) Tebufenozide (1) Clorpirifos-metile(2)(3) Indoxacarb Spinosad (4) Clorantraniliprole (5) Emamectina (6)	<b>Al massimo due interventi l'anno con prodotti di sintesi contro queste avversità.</b> <b>(1) Ammessi 3 interventi complessivi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Indipendentemente dall'avversità ammessi complessivamente 6 interventi l'anno con Clorpirifos etile, Clorpirifos metile e Fosmet.</b> <b>(4) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</b> <b>(6) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Orgia</b> <i>Orgia antiqua</i>	<b>Interventi agronomici:</b> raccolta e distruzione delle ovature invernali, in occasione delle operazioni di potatura delle piante. <b>Interventi chimici</b> <b>soglia:</b> presenza di infestazioni larvali.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	
<b>Eriofide rugginoso</b> <i>Epirimerus pyri</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>nella fase di caduta petali, solo nel caso si siano avuti danni sui frutti nell'annata precedente.</b>	Olio minerale Zolfo proteinato Exitiazox+Fenazaquin(1) Fenazaquin (1)	<b>Amnesso al massimo 1 intervento all'anno.</b> <b>(1) Fenazaquin impiegabile fino al 30/11/2012.</b>
<b>Eriofide vescicoloso</b> <i>Eriophies pyri</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>nella fase di rottura gemme , solo nel caso si siano avuti danni sui frutti nell'annata precedente.</b>	Olio bianco Zolfo proteinato	<b>Amnesso al massimo 1 intervento all'anno.</b>

## PERO

### Controllo delle infestanti

Epoca	Infestanti	Principi attivi	Dose (kg-l/ha - anno)	Limitazioni d'uso e note
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4% - Oxifluorfen 22,9% (1) - MCPA 25% (3) - Carfentrazone 6,45% (2)(6) - Pendimetalin 38,72% (4) - Oxadiazon 34,1% (4)	5 1 1,5 1 2 4	<p><b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b></p> <p>(1) Impiegabile a dose ridotta (0,3-0,45 l/intervento) in miscela con Glifosate.</p> <p>(2) Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</p> <p>(3) Impiegabile in miscela con Glifosate nel periodo fine estate-inizio autunno.</p> <p>(4) Impiegabile solo in impianti in allevamento fino a 3 anni.</p> <p>(5) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</p> <p>(6) Prodotti in alternativa tra loro.</p>
	Dicotiledoni	Pyraflufen-ethyl 2,6% (5)(6)	1,6	
	<b>Spollonante</b>	- Carfentrazone 6,45% (1)(3) - Pyraflufen-ethyl 2,6% (2)(3)	0,9-1 1,6	<p>(1) Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 l/ha all'anno. In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.</p> <p>(2) Al massimo 0,8 l/ha/trattamento e 1,6 l/ha/anno, indipendentemente dall'impiego.</p> <p>(3) Prodotti in alternativa tra loro.</p>

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

## NASHI

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Cancri e disseccamenti rameali</b></p> <p><i>Nectria galligena et al.</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> nel corso della potatura asportare e bruciare i rami colpiti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> intervenire ad inizio caduta foglie e nella fase di ingrossamento delle gemme.</p>	<p>Idrossido di rame Ossicloruro di rame Poltiglia bordolese</p>	

Fitofagi principali	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Carpocapsa</b></p> <p><i>Cydia pomonella</i></p>	<p>Si consiglia l'applicazione del metodo della confusione sessuale, ove le caratteristiche dell'impianto lo consentono.</p> <p><b>E' obbligatorio l'uso delle trappole a ferormoni, in numero di 1-2 per zona omogenea, da posizionare nella fase di caduta petali.</b></p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> <b>2 adulti per trappola catturati in una o due settimane consecutive.</b></p>	<p>Erogatori di feromoni</p> <p><i>Bacillus thuringiensis</i> Granulo-Virus</p> <p>Spinosad*</p>	<p><b>*Al massimo 3 trattamenti.</b></p>
<p><b>Cocciniglia S. Josè</b></p> <p><i>Comstockaspis perniciososa</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza del parassita.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> Intervenire preferibilmente contro le forme svernanti e, in caso di forti infestazioni, anche alla migrazione delle neanidi.</p>	<p>Polisolfuro di calcio Olio bianco</p>	<p>Il polisolfuro è attivo anche nei confronti dei cancri rameali.</p>
<p><b>Afide grigio</b></p> <p><i>Dysaphis pyri</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> trattare al superamento della <b>soglia</b> del 5% di piante colpite.</p>		

<p><b>Agrilo</b> <i>Agrilus spp.</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> asportare e bruciare i rami infestati dalle larve.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> nel corso dell'estate prima della deposizione delle uova.</p> <p><b>Soglia:</b> presenza del fitofago.</p>		
<p><b>Rodilegno rosso</b> <i>Cossus cossus</i></p>	<p><b>Cattura massale</b>, installando non meno di 10 trappole per ettaro, entro la prima metà di maggio. Uncinamento delle larve all'osservazione della rosura.</p>		
<p><b>Rodilegno giallo</b> <i>Zeuzera pyrina</i></p>	<p><b>Cattura massale</b>, installando 5-10 trappole per ettaro, entro la prima metà di maggio. Uncinamento delle larve all'osservazione della rosura.</p>		

## NASHI

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	- Glifosate 30,4%	5	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati è ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b>

**Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.**

## ACTINIDIA

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> favorire l'arieggiamento dei frutti e contenere lo sviluppo vegetativo razionalizzando gli interventi di potatura, irrigazione e fertilizzazione.  <b>Interventi chimici:</b> da effettuarsi solo in seguito a piogge abbondanti e ripetute.	Iprodione	<b>Amnesso al massimo 1 intervento l'anno.</b>
<b>Marciume del colletto</b> <i>Phytophthora spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare l'impianto in zone soggette a ristagni di acqua o in terreni poco permeabili; - effettuare interventi di drenaggio.  <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> accertata presenza della malattia.	M-Metalaxil Prodotti rameici	
<b>BATTERIOSI</b> <b>Seccume dei rami</b> <i>Pseudomonas spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> Disinfettare accuratamente i grossi tagli di potatura. Asportare e bruciare i rami colpiti.	Prodotti rameici	
<b>Cancro batterico</b> <i>Pseudomonas syringae</i> <i>pv. actinidiae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare esclusivamente materiale di propagazione prodotto da aziende vivaistiche autorizzate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 214/2005; - effettuare concimazioni equilibrate; - effettuare una potatura che consenta un buon arieggiamento della chioma; -effettuare la disinfezione degli attrezzi da taglio con sali di ammonio quaternario (benzalconio cloruro); - disinfettare le superfici di taglio e ricoprirle con mastici protettivi; - evitare irrigazioni sovrachioma; - monitorare frequentemente gli impianti; - tagliare ed eliminare le parti infette ad una distanza di almeno 60 cm al di sotto dell'area colpita.  <b>Interventi chimici</b> Interventi dopo la raccolta fino a fine inverno.	Prodotti rameici	Dalla ripresa vegetativa in poi il rame può dare fenomeni di fitotossicità, soprattutto su Kiwi giallo.

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Cocciniglia bianca</b> <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminazione dei rami più infestati; - spazzolatura delle branche.  <b>Interventi chimici:</b> <b>in corrispondenza della fuoriuscita delle neanidi di prima generazione. Solo dove si abbia esperienza di danno sui frutti è ammesso un secondo intervento.</b> <b>Soglia:</b> presenza.	Olio minerale Buprofezin (1)	Interventi localizzati su piante infestate. <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno. Intervenire preferibilmente alla migrazione delle neanidi di prima generazione.</b>
<b>Cicaline</b> <i>Empoasca vitis</i>	Nessun trattamento		

## ACTINIDIA

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
Periodo primavarile e autunnale	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate 29% Carfentrazone 6,45% (1)	5 1	<b>Il diserbo chimico con i prodotti indicati e ammesso solo localizzato lungo la fila, con aggiunta o meno di solfato ammonico (4-5 kg/ha).</b>  (1) Al massimo 1 l/ha all'anno. Impiegare 0,3 l/ha per ciascun intervento. . In impianti in allevamento fino a 3 anni, al massimo 2 l/ha all'anno.

Le dosi in tabella sono riferite alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva.

## CEREALI (frumento duro, frumento tenero, orzo, farro, avena, triticale)

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Carie</b> <i>Tilletia</i> spp.</p> <hr/> <p><b>Carboni</b> <i>Ustilago</i> spp.</p> <hr/> <p><b>Mal del piede</b> vari</p>	<p>Utilizzare sementi sane e conciate industrialmente; nel caso di impiego di seme non conciato o di seme prodotto in azienda effettuare la concia.</p> <p>Effettuare concimazioni equilibrate. Non eccedere nella densità di semina. Facilitare lo sgrondo delle acque nel terreno. Non è consentito il ristoppio della stessa specie</p>		<p><b>Ammissa solo la concia delle sementi con i principi attivi registrati.</b></p>
<p><b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp.</p>	<p><b>Interventi agronomici</b> - Evitare semine fitte; - Concimazioni azotate equilibrate;</p> <p><b>Soglia di intervento:</b> <b>Interventi da realizzare in base alle indicazioni dei Bollettini Fitosanitari.</b></p>	<p>Tebuconazolo Propiconazolo Procloraz (Ciproconazolo+Procloraz) Pyraclostrobin</p>	<p><b>Interventi da realizzare in base alle indicazioni dei Bollettini Fitosanitari e solo su frumento duro e frumento tenero.</b></p> <p><b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi con anticrittogamici all'anno.</b></p>
<p><b>Oidio</b> <i>Erysiphe graminis</i></p>	<p><b>Interventi agronomici</b> - Evitare semine fitte; - Concimazioni azotate equilibrate; - varietà resistenti e tolleranti;</p> <p><b>Soglia di intervento:</b> <b>10-12 pustole uniformemente distribuite sulle ultime due foglie.</b></p>	<p>Azoxystrobin Pyraclostrobin Ciproconazolo Tebuconazolo Propiconazolo Procloraz Triadimenol Tetraconazolo Flutriafol (Ciproconazolo+Procloraz) Picoxystrobin</p>	<p><b>Interventi da realizzare in base alle indicazioni dei Bollettini Fitosanitari e solo su frumento duro e frumento tenero.</b></p> <p><b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi con anticrittogamici all'anno.</b></p>

<b>Ruggini</b> <i>Puccinia graminis,</i> <i>Puccinia recondita,</i> <i>Puccinia striiformis</i>	<b>Interventi agronomici</b> - Evitare semine fitte; - Concimazioni azotate equilibrate; - varietà resistenti e tolleranti; - varietà precoci; <b>Soglia di intervento:</b> <b>comparsa uredosori sulle ultime due foglie.</b>	Azoxytrobina Pyraclostrobina Ciproconazolo Tebuconazolo Propiconazolo Triadimenolo Tetraconazolo Flutriafolo (Ciproconazolo+Procloraz) Picoxystrobina	<b>Interventi da realizzare in base alle indicazioni dei Bollettini Fitosanitari e solo su frumento duro e frumento tenero.</b>  <b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi con anticrittogamici all'anno.</b>
<b>Septoria</b> <i>Septoria nodorum,</i> <i>Septoria tritici</i>	<b>Interventi agronomici</b> - Evitare semine fitte; - Concimazioni azotate equilibrate;	Azoxytrobina Pyraclostrobina Ciproconazolo Propiconazolo Tetraconazolo (Ciproconazolo+Procloraz) Picoxystrobina	<b>Interventi da realizzare in base alle indicazioni dei Bollettini Fitosanitari e solo su frumento duro e frumento tenero.</b>  <b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 2 interventi con anticrittogamici all'anno.</b>

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi dei cereali</b> <i>vari</i>	<b>Nessun intervento chimico.</b> Le infestazioni possono essere ostacolate evitando semine precoci.	Le popolazioni afidiche sono naturalmente contenute entro limiti non dannosi da svariati entomofagi (larve di sirfidi, cecidomidi e crisopidi, larve e adulti di coccinellidi, imenotteri afididi, ecc.).	<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Altri fitofagi</b> Elateridi, Zabro gobbo, Criocera, Cecidomia, ecc.	<b>Nessun intervento chimico.</b> Le infestazioni sono normalmente contenute e non dannose.		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>

## CEREALI

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico basate sulle rotazioni.

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Preparazione letti di semina</b>	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate 30,4*+ solfato ammonico	1-3 + 4-5	<b>Prodotto impiegabile solo in caso di semina su sodo.</b> <b>* Non ammesso su triticale e farro.</b>

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
---------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------------------

<b>Post-emergenza</b>	Falaride, avena, alopecuro e loglio.	Diclofop-methyl 27,3 (3) Fenoxaprop-p-ethyl 5,24+ Mefenpir-dietile 2,86 (1) (3) Tralkossidim 34,67 (2) (3) Clodinafop-propargyl 8,08 (1) (3) (Pinoxaden 5,05) (4) (Pinoxaden 2,53+Clodinafop-p. 2,53) (5)	2-2,5 0,75-1,5 1,7 0,25-0,75 1 1-1,2	Intervenire ai primi stadi di sviluppo delle infestanti sia monocotiledoni che dicotiledoni. <b>I graminicidi non sono impiegabili su avena e triticale.</b> <b>Sul farro non è ammesso alcun intervento di diserbo.</b>  <b>(1) Non ammesso per il diserbo dell'orzo.</b> <b>(2) Impiegabile su frumento tenero dalla levata al 2° nodo.</b>  <b>(3) Non ammesso per il diserbo del triticale.</b> <b>(4) Ammesso solo su frumento duro, frumento tenero e orzo.</b>  <b>(5) Ammesso solo su frumento duro e frumento tenero.</b>
	Dicotiledoni: composite, ombrellifere, leguminose e crucifere.	Metsulfuron metile 20 (4) Triasulfuron 20 Tribenuron metile 75 (4) Tribenuron metile 50 (4) Tifensulfuron metile 75 (4) (Tribenuron metile 1 + Mecoprop-P 73,4) (4) Bifenox 40,8 (4) Tritosulfuron 71,4 (4) (Tritosulfuron 12,5 + Dicamba 50) (4)	0,015-0,020 0,037 0,05-0,08 0,020-0,025 0,03-0,05 1,1 2 0,05-0,07 0,3-0,4	
	In presenza di diffuse infestazioni di papavero, veronica, viola.	Metribuzin 35 (4)	0,2	
	In presenza di gallio	Fluroxipir 17,18 (3) Amidosulfuron 75 (3) (Clopiraldid 1,8+ MCPA 18,2 + Fluroxipir 3,6) (3) (Florasulam 0,25+Fluroxipir 14,5) (4) Florasulam 4,84	0,75-1 0,02-0,04 3,5-4 1,5-1,8 0,1-0,125	
	Dicotiledoni-Graminacee	(Pyroxsulam 70,8 + Florasulam 14,2) (5) (Iodosulfuron-metil-s 0,79 + Fenoxaprop-p-etile 6,32 + Mefenpir-dietile 2,37) (5) (Mesosulfuron-metile 3+Iodosulfuron-m.-s.0,6+ Mefenpir dietile 9) (5) (Mesosulfuron-metile 3+Iodosulfuron-m.-s. 3+ Mefenpir dietile 9) (5) (Pinoxaden 3,03+Clodinafop-p.3,03+ Florasulam 0,76) (5) (Amidosulfuron 6+Iodosulfuron-metile 0,83+ Propoxycarbazone s. 14) (5) (Propoxycarbazone s. 16,8+Iodosulfuron-m. 1) (5)	0,265 1,25 0,4-0,5 0,25-0,3 0,67-1 0,3-0,4 0,33	

## MAIS

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Carbone comune</b> <i>Ustilago maydis</i>	<b>Interventi agronomici</b> -concimazioni equilibrate -ampie rotazioni		<b>Ammessa la concia delle sementi.</b>  Si consiglia di utilizzare ibridi resistenti.
<b>Marciume del fusto</b> <i>Gibberella zeae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti		
<b>Virus del nanismo maculato del mais</b> (MDMV)	<b>Interventi preventivi</b> - eliminazione tempestiva delle sorgenti d'infezione all'interno e in prossimità delle colture, con particolare riguardo alle graminacee infestanti ospiti dei virus.		
<b>Virus del nanismo giallo dell'orzo</b> (BYDV)			
<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	Evitare la coltivazione in successione a prati di leguminose per almeno due anni. <b>Soglia alla semina: presenza accertata.</b>  Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali ripetute lungo la fila.	Teflutrin Clorpirifos Zeta-cipermetrina	<b>Ammessi solo interventi localizzati alla semina.</b>

<p><b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i></p>	<p>Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per identificare l'inizio del volo. A trebbiatura avvenuta effettuare un'accurata sfibratura degli stocchi.</p> <p><b>Interventi chimici</b> Intervenire alla fuoriuscita delle prime larve.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> <i>Trichogramma maidis</i> Diflubenzuron Alfa-cipermetrina (1) Cyflutrin (1) Deltametrina(1) Lambda-cialotrina(1) Cipermetrina(1) Zeta-cipermetrina(1) Etofenprox(1) Indoxacarb (2) Clorantraniliprole (3)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Al massimo 2 interventi l'anno. Non è impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</p>
<p><b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.</p>	<p><b>Soglia:</b> presenza diffusa di attacchi iniziali.</p>	<p>Cyflutrin(1) Deltametrina(1) Lambda-cialotrina(1) Cipermetrina(1) Alfa-cipermetrina(1) Etofenprox(1)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Afidi dei cereali</b> <i>Rhopalosiphum padi</i>, <i>Metopolophium dirhodum</i>, <i>Sitobion avenae</i>, <i>Schizaphis graminum</i></p>	<p><b>Non sono ammessi interventi chimici specifici.</b></p>		
<p><b>Diabrotica</b> <i>Diabrotica virgifera virgifera</i></p>	<p><b>Indicazioni agronomiche:</b> la rotazione colturale è sufficiente a contenere il parassita. In altre situazioni installare trappole cromotropiche gialle e seguire le indicazioni dei bolletini per eventuali trattamenti.</p> <p><b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> il trattamento si giustifica con catture di 50 adulti/settimana per due settimane consecutive, solo nel caso in cui si preveda la coltura del mais anche nell'anno successivo.</p>	<p>Alfacipermetrina (1) Ciflutrin (1) Deltametrina(1) Lambda-cialotrina (1)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità. Vietati i trattamenti in fioritura.</p>

## MAIS - Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi(l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glyphosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-3+ 3,5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettano lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Aclonifen 49,6 Pendimetalin 38,72 Acetochlor 36,7 ° + antidoto Dichlormid Isoxaflutole 4,27 (1) S-Metolaclor 86,5 Clomazone 30,74 Petoxamide 56,6 Dimetenamide-P 63,9 Terbutilazina 50 (2) (Flufenacet 17,4 + Terbutilazina 29) (Flufenacet 48 + Isoxaflutolo 10) (Isoxaflutolo 3,97+Thiencarbazone-m. 1,59+ Cyprosulfamide 2,62) (3) (Isoxaflutolo 4,23+ Cyprosulfamide 4,23) (3)	1,5-2 2-2,5 4 1,2-2,2 1,5 0,25-0,3 2 1-1,3 1,5 2,25-2,5 0,7 1,5-2 1,7-2,2	<b>Ricorrere al diserbo di pre-emergenza solo in previsione di forte inerbimento (esperienza di anni precedenti).</b> <b>Il diserbo di pre-emergenza deve essere localizzato sulla fila.</b> <b>°Impiegabili solo formulati "Xi".</b> <b>(1) Impiegabile solo nelle aziende in cui negli anni precedenti sia stata riscontrata la presenza di <i>Abutilon</i>.</b> <b>Impiegabile o in pre-emergenza o in post-emergenza.</b> <b>(2) Impiegabile solo con formulati nei quali è inserita con altre s.a.; al massimo 0,75kg di s.a. per anno.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca.</b>

<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Rimsulfuron 25	0,04 - 0,06*	<p><b>* In caso di doppio intervento, non superare il dosaggio complessivo di g 60.</b></p> <p><b>** In caso di doppio trattamento, non superare il dosaggio complessivo di 2 litri.</b></p> <p>° Impiegabile non oltre lo stadio di tre foglie della coltura. Impiegabile solo nelle aziende in cui negli anni precedenti sia stata riscontrata la presenza di <i>Abutilon</i>. Impiegabile o in pre-emergenza o in post-emergenza.</p> <p>^ Impiegabile fino alla terza foglia e prima della emergenza delle infestanti; utilizzare solo formulati "Xi".</p> <p>(1) Impiegabile solo contro equiseti.</p> <p>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca. Con prodotti contenenti Isoxaflutole al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'epoca.</p>
		Nicosulfuron 4	0,7 - 1,2 **	
		Sulcotrione 26	1	
		Tifensulfuron-methyl 75	0,01	
		Foramsulfuron 2,33+Isoxadifen 2,33	2-2,7	
		Mesotrione 9,1	0,5-1	
		Mesotrione 5,58+S-Metolaclo 46,5	2	
		Acetochlor 36,7 ^ + antidoto Dichlormid (Isoxaflutolo 3,97+Thiencarbazone-m. 1,59+	3	
		Cyprosulfamide 2,62) (2)	1,5-2	
		(Isoxaflutolo 4,23+ Cyprosulfamide 4,23) (2)	1,7-2,2	
		Tembotrione 4,31	1,1-2,25	
	Dicotiledoni	Isoxaflutole 4,27°	1,2	
		Prosulfuron 75+Dicamba 70	0,025+0,275	
		Dicamba 21	0,8 - 1	
		Fluroxipir 17,18	0,6 -0,8	
		Florasulam 0,1+Fluroxipir 14,57	1	
		Clopiralid 75	0,15	
	MCPA 25 (1)	0,25-0,45		
	Tritosulfuron 71,4	0,05-0,07		
	Tritosulfuron 25 + Dicamba 50	0,15-0,20		

## SORGO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Carbone</b> <i>Sphacelotheca sorghi</i>	<b>Interventi agronomici</b> -concimazioni equilibrate -ampie rotazioni		Si consiglia di utilizzare ibridi resistenti. <b>Ammissa la concia del seme.</b>
<b>Marciume delle plantule e dello stelo</b> <i>Fusarium, Pythium, ecc.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - evitare semine troppo fitte - evitare somministrazioni eccessive di azoto e squilibri idrici - fare ricorso a ibridi resistenti o tolleranti		Si consiglia di utilizzare ibridi resistenti. <b>Ammissa la concia del seme.</b>

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali ripetute lungo la fila.		<b>Non è ammissa la geodisinfestazione.</b>
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	Si consiglia l'utilizzo di trappole a feromone per identificare l'inizio del volo. A trebbiatura avvenuta effettuare un'accurata sfibratura degli stocchi.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	Intervenire alla comparsa delle prime larve.
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>			<b>Non sono ammessi interventi chimici</b>
<b>Afidi dei cereali</b> <i>Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae, Schizaphis graminum</i>			<b>Non sono ammessi interventi chimici</b>

## SORGO

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi(l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glyphosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-2,5+ 3,5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettano lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni	Aclonifen 49,6	1 - 1,5	<b>Ricorrere al diserbo di pre-emergenza solo in previsione di forte inerbimento (esperienza di anni precedenti).</b>
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Terbutilazina 17,4 + S-Metolaclo 28,9	2 – 3,5	
	Dicotiledoni	Dicamba 50 + Prosulfuron 5 Bentazone 87	0,3 – 0,4 1,1-1,5	

# GIRASOLE

## Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteria d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Peronospora del girasole</b> <i>Plasmopara helianti</i>	Impiego varietà resistenti. <b>Concia obbligatoria del seme.</b> Rotazione almeno triennale.		<b>Ammessa solo la concia delle sementi</b>
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> <b>Marciume carbonioso dello stelo</b> <i>Macrophomina phaseolina</i> e <i>Sclerotium bataticola</i> <b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i> ed altre <b>Marciume del colletto</b> <i>Phoma</i> spp. <b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp.	<b>Non ammessi trattamenti.</b> Impiego, ove possibile, di varietà resistenti. Rotazione triennale.		
<b>Muffa grigia</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Non ammessi trattamenti</b> Si consiglia l'impiego di varietà a ciclo medio-breve, per sfuggire alle piogge autunnali.		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> Sarchiature. Maggiore densità di semina. Evitare la coltivazione in successione a prati di leguminose.		E' ammessa solo la concia delle sementi
<b>Nottue</b> <i>Scotia</i> spp.	<b>Non sono ammessi trattamenti</b> Sarchiature. Maggiore densità di semina.		
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i>	Generalmente non dannosi. <b>Non ammessi trattamenti.</b>		
<b>Piralide del girasole</b>	<b>Non ammessi trattamenti.</b> Interramento residui colturali. Rotazione almeno triennale.		

# GIRASOLE

## Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, rotazione. )

Epoca d'intervento	Infestanti	Principi attivi (%)	Dosi(l-kg/ha)	Limitazioni d'uso e note
Pre-semina	Monocotiledoni e dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonio	1,5-2,5 + 3-5	Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettono lavorazioni meccaniche.
Pre-emergenza	Dicotiledoni e graminacee	Oxifluorfen 23,6 S-Metolaclor 87,3 Oxadiazon 34,1 Pendimetalin 38,72	0,5-0,7 1 1,5 2-2,5	Ricorrere al diserbo di pre-emergenza solo in previsione di forte inerbimento (esperienza di anni precedenti).
	Dicotiledoni	Aclonifen 49,6	2,5-3	
Post-emergenza	Dicotiledoni	Aclonifen 49,6 * Tribenuron 50% (1)	1 – 1,5 0,04	* impiegare in interventi precoci (2-4 foglie vere). **Impiegabile solo su coltura tollerante agli erbicidi imidazolinoni; trattare quando la coltura è in una stadio di sviluppo compreso tra le due e le sei foglie. (1) Impiegabile solo su cultivar resistenti.
	Dicotiledoni e graminacee	Imazamox 3,7**	0,75	
	Graminacee	Ciclossidim 10,9 Propaquizafop 9,7	1-2 0,8	
		Quizalofop-etile isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1,5-2,5 1-1,5	

# BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Cercospora</b> <i>Cercospora beticola</i>	Intervenire alla comparsa delle prime pustole. Ripetere l'intervento secondo l'andamento stagionale, la gravità dell'infezione e l'epoca di estirpamento. Effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata (mattina) in modo da bagnare la pagina inferiore delle foglie.	Prodotti rameici* Bitertanolo** Difenconazolo** Flutriafol** Propiconazolo** Tetraconazolo** Fenbuconazolo** Ciproconazolo** Procloraz** Ciproconazolo+Procloraz** Azoxystrobin** (Difenconazolo+Fenpropidin)**	* <b>Non superare 2 trattamenti all'anno.</b> ** <b>Amnesso al massimo 1 trattamento all'anno con uno dei principi attivi indicati. Non ammesse formulazioni Xn.</b> Evitare interventi su bietolai ad estirpazione precoce (entro luglio). Per semine primaverili e estirpazioni tardive, si consiglia l'impiego di varietà resistenti o tolleranti.
<b>Oidio</b> <i>Mycosphaera betae</i>	Intervenire in presenza di sintomi diffusi.	Zolfo	
<b>Mal dello sclerozio</b> <i>Sclerotium rolfsii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazione almeno quadriennale; - concimazioni azotate equilibrate; - eliminazione dei residui vegetali infetti; - adeguati volumi di adacquamento nelle irrigazioni; - evitare ristagni idrici; - operare più sarchiature; - evitare l'inquinamento degli appezzamenti con terreno proveniente da coltivazioni infette.		

<b>Rizomania</b> <i>Polymyxa betae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazione almeno quadriennale; - eliminazione dei residui vegetali infetti; - semina anticipata; - impiego di varietà resistenti o tolleranti; - adeguati volumi di adacquamento nelle irrigazioni; - evitare ristagni idrici; - evitare l'inquinamento degli appezzamenti con terreno proveniente da coltivazioni infette.		
---	--	--	--

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> <i>Aphis fabae</i>			<b>Nessun trattamento.</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Al superamento della soglia effettuare la geodisinfestazione localizzata alla semina.</b>  <b>Soglia: 15 larve/mq</b>  Con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali ripetute lungo la fila.	Teflutrin (1) (2) Zeta-cipermetrina (1) (2)	<b>Evitare la coltivazione in successione a prati di leguminose per almeno 2 anni.</b> <b>(1) L'impiego di tale prodotto non è computato nel numero complessivo di interventi ammessi con piretroidi.</b> <b>(2) Prodotti in alternativa tra loro.</b>
<b>Altica</b> <i>Chaetocnema tibialis</i>	<b>Soglia: 2-5 fori/plantula con piante a 2 foglie vere.</b>	Alfacipermetrina Deltametrina Cyflutrin Cipermetrina Lambda-cialotrina Zeta-cipermetrina	<b>Ammesso 1 trattamento all'anno contro questo fitofago.</b> <b>Indipendentemente dall'avversità sono ammessi complessivamente 3 interventi all'anno con Piretroidi e Etofenprox.</b>

<b>Cleono</b> <i>Temnorhinus mendicus</i>	<b>Contro gli adulti, al manifestarsi dei primi danni effettuare un intervento dapprima limitato alle fasce perimetrali, e successivamente, se necessario, a pieno campo prima dell'ovodeposizione.</b>	Alfacipermetrina Deltametrina Cyflutrin Cipermetrina Lambda-cialotrina Fluvalinate Zeta-cipermetrina	<b>Ammesso 1 trattamento all'anno contro questo fitofago. Indipendentemente dall'avversità sono ammessi complessivamente 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox.</b>
<b>Lisso</b> <i>Lixus junci</i>	<b>Intervenire contro gli adulti prima dell'ovodeposizione solo in caso di forte infestazione.</b>	Alfacipermetrina Deltametrina Cyflutrin Cipermetrina Lambda-cialotrina Fluvalinate (Imidacloprid + Cyflutrin)	<b>Ammesso 1 trattamento all'anno contro questo fitofago. Indipendentemente dall'avversità sono ammessi complessivamente 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox.</b>
<b>Casside</b> <i>Cassida spp.</i>	<b>Intervenire in caso forti presenze di adulti.</b> Preferire interventi localizzati sui primi focolai o sui bordi degli appezzamenti.	Alfacipermetrina Cyflutrin Fluvalinate Cipermetrina Deltametrina (Imidacloprid + Cyflutrin)	<b>Ammesso 1 trattamento all'anno contro questo fitofago. Indipendentemente dall'avversità sono ammessi complessivamente 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox.</b>
<b>Nottue defogliatrici</b> <i>Mamestra brassicae</i> <i>Laphygma exigua</i>	<b>In caso di forti infestazioni intervenire contro le giovani larve.</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina Cyflutrin Cipermetrina Lambda-cialotrina Zeta-cipermetrina Etofenprox	<b>Piretroidi e Etofenprox: ammesso 1 trattamento all'anno contro questi fitofagi. Indipendentemente dall'avversità sono ammessi complessivamente 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox.</b>
<b>Nematode della bietola</b> <i>Heterodera schachtii</i>	Sospendere la coltura nei terreni infestati per almeno 5 anni; ricorrere a lunghi avvicendamenti coltivando graminacee. Evitare di contaminare gli appezzamenti con terreno proveniente da campi infetti.		

## BARBABIETOLA

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiature e rotazioni )

Epoca d'intervento	Infestanti	Principi attivi (%)	Dose (kg-l/ha)	Limitazioni d'uso e note
<b>Pre-semina</b>	Monocotiledoni e Dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1-3 + 4-5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettono lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Contro infestanti di difficile controllo in post-emergenza ( <i>Veronica, Galium</i> , ecc.)	- Cloridazon 65*(1) - Metamitron 70* - Lenacil 80 * - Ethofumesate 44,6*	2 2 0,3 1	Localizzato sulla fila, su una superficie di terreno non superiore a 1/3 del totale, con 1/3 della dose riportata in tabella. <b>* Miscelare non più di due prodotti.</b> <b>(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni.</b>
<b>Post-emergenza precoce (DMR)</b>	Dicotiledoni  * da utilizzare in presenza di poligono convolvolo, crucifere, veronica, ecc..  ** in presenza di poligono aviculare, chenopodi, amaranto, ecc. ***ombrellifere  ^ <i>Cirsium</i>  ^^ migliora l'azione su infestanti difficili ( <i>Galium</i> , Poligoni, ecc.)	- Phenmedipham 15,9 - Ethofumesate 21,1 - (Phenmedipham 5,9 + Desmedifam 1,5 + Ethofumesate 12,2) - Chloridazon 65 *(1) - Metamitron 70**  -Triflusulfuron-metile 50***  - Clopyralid 10 ^  - Lenacil 80 ^^	0,5-1 0,5 0,6-1 0,5 0,5  0,03-0,04  0,5-0,7  0,1	Trattamenti precocissimi anche con bietole in emergenza, da ripetere a 8-10 giorni. Aggiungere alla miscela 0,5 l di Olio bianco. E' possibile utilizzare altri formulati commerciali con miscele pre-costituite di principi attivi rispettando le dosi degli stessi riportate in tabella. <b>Non sono ammessi più di 3 trattamenti all'anno.</b> <b>(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni.</b>

<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni  * da utilizzare in presenza di poligono convolvolo, crucifere, veronica, ecc..  ** in presenza di poligono aviculare, chenopodi, amaranto, ecc. ***ombrellifere  ^ <i>Cirsium</i>  ^^ migliora l'azione su infestanti difficili ( <i>Galium</i> , Poligoni, ecc.)	Phenmedipham 15,9 Ethofumesate 20 (Phenmedipham 5,9 + Desmedifam 1,5 + Ethofumesate 12,2) Chloridazon 65*(1) Metamitron 70**  Triflusaluron-metile 50***  Clopyralid 10 ^  Lenacil 80^^	1-2 0,7  1-1,5 0,6-1,5 0,6-1,5  0,04-0,05  1-1,2  0,1-0,2	<b>Tecnica da adottare in sostituzione della DMR solo in caso di difficoltà di accesso al campo causata da un andamento stagionale sfavorevole.</b> Aggiungere alla miscela 0,5 l di Olio bianco. E' possibile utilizzare altri formulati commerciali con miscele pre-costituite di principi attivi rispettando le dosi degli stessi riportate in tabella. <b>Non sono ammessi più di 2 trattamenti all'anno.</b> <b>(1) Al massimo 2,6 kg/ha di sostanza attiva ogni 3 anni.</b>
	Graminacee	Ciclossidim 10,9 Clethodim 25 * Propaquizafop 9,7 Quizalofop-etile isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1-2 0,6 0,8 1,5-2,5 1-1,5	Da utilizzare preferibilmente non in miscela con i dicotiledonici.  *E' consigliato l'impiego solo sulle varietà primaverili.

# POMODORO

## Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Peronospora</b> (<i>Phytophthora infestans</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> Al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (massimo tre giorni) impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa o con attività curativa e persistenza prolungata</p>	<p>Composti rameici Dodina Fosetil Al Ditianon Metalaxil (1) Metalaxil-M (1) Benalaxil (1) Benalaxil-M (1) Cimoxanil (2) Azoxytrobina (3) (4) Pyraclostrobina (4) Famoxadone (4) Propamocarb (5) Iprovalicarb (6) Dimetomorf (6) Mandipropamide (6) Zoxamide (7) Propineb (8) Metiram (8) Cyazofamid (9) Ametocradina (10)</p>	<p>E' consigliabile non impiegare i composti rameici nella fase di piena fioritura.</p> <p>(1) <b>Al massimo 3 interventi all'anno con fenilammidi.</b> (2) <b>Al massimo 3 interventi all'anno.</b> (3) <b>Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (4) <b>Indipendentemente dall'avversità Azoxytrobina, Pyraclostrobina e Famoxadone non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</b> (5) <b>Al massimo 2 interventi all'anno.</b> (6) <b>Con i CAA al massimo 4 interventi all'anno.</b> (7) <b>Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (8) <b>Prodotti in alternativa tra loro per un massimo di 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. Interventi da sospendere a 21 giorni dalla raccolta.</b> (9) <b>Al massimo 3 interventi all'anno.</b> (10) <b>Al massimo 3 interventi all'anno.</b></p>
<p><b>Marciumi del colletto</b> (<i>Pythium spp.</i> <i>Phytophthora spp.</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - impiego di seme sano; - adottare ampie rotazioni; - ridurre eccessi di umidità; - preferire metodi di irrigazione a goccia.</p>	<p>Propamocarb (1)</p>	<p>(1) <b>Soltanto formulati autorizzati per trattamenti fogliari in pieno campo.</b></p>
<p><b>Marciumi radicali</b> (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - scelta di varietà resistenti; - ampie rotazioni; - eliminazione delle piante malate.</p>		

<p><b>Alternariosi</b> (<i>Alternaria alternata</i>) (<i>Alternaria porri</i> f.sp. <i>solani</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di seme sano;</li> <li>• Ampie rotazioni colturali;</li> <li>• Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b> Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso questo patogeno. Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10 giorni.</p>	<p>Composti rameici Azoxystrobin (1) (2) Pyraclostrobin (2)+ Metiram (4) Difenoconazolo (3)</p>	<p>(1) <b>Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (2) <b>Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</b> (3) <b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 3 interventi all'anno con IBE.</b> (4) <b>Interventi da sospendere a 21 giorni dalla raccolta.</b></p>
<p><b>Septoriosi</b> (<i>Septoria lycopersici</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impiego di seme sano;</li> <li>• Ampie rotazioni colturali;</li> <li>• Evitare ristagni idrici e limitare le irrigazioni.</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b> Solitamente non sono necessari interventi specifici poiché gli antiperonosporici di contatto sono attivi anche verso questo patogeno. Per attacchi gravi e in zone particolarmente umide è consigliabile un trattamento alla comparsa dei primi sintomi seguito, se necessario, da un altro dopo 8-10 giorni.</p>	<p>Composti rameici Pyraclostrobin (1) + Metiram (3) Difenoconazolo (2)</p>	<p>(1) <b>Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</b> (2) <b>Indipendentemente dall'avversità al massimo 3 interventi all'anno con IBE.</b> (3) <b>Interventi da sospendere a 21 giorni dalla raccolta.</b></p>

<p><b>Tracheomicosi</b> (<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>)</p> <p>(<i>Verticillium dahliae</i>) (<i>Verticillium albo-atrum</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Distruggere i residui della vegetazione infetta.</li> <li>• Effettuare lunghe rotazioni (almeno 4 anni) con qualsiasi coltura nel caso di tracheofusariosi, con colture non suscettibili (graminacee) nel caso di tracheoverticilliosi.</li> <li>• Impiego di cultivar tolleranti o resistenti.</li> </ul>	<p><i>Trichoderma viride</i> <i>Trichoderma harzianum</i></p>	
<p><b>Cladosporiosi</b> (<i>Cladosporium fulvia fulvum</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare ampie rotazioni;</li> <li>- ridurre eccessi di umidità;</li> <li>- preferire metodi di irrigazione a goccia.</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire in presenza di sintomi; la malattia provoca danni economici soltanto eccezionalmente.</li> </ul>	<p>Composti rameici</p> <p>Boscalid(1)+Pyraclostrobin(2) Ciproconazolo (3)</p>	<p><b>In genere è controllata dai trattamenti antiperonosporici.</b></p> <p><b>(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(2) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</b></p> <p><b>(3) Con IBE al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Non ammesse formulazioni Xn.</b></p>
<p><b>Oidio</b> (<i>Leveillula taurica</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b></p> <p>Le condizioni ottimali per l'infezione si verificano soprattutto in primavera con temperature superiori a 20 °C ed elevata umidità</p> <p>Non essendo una malattia molto diffusa intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi ripetendolo se le condizioni sono favorevoli al fungo dopo 8-10 giorni.</p>	<p><i>Ampelomyces quisqualis</i></p> <p>Zolfo</p> <p>Azoxystrobin (1) (2)</p> <p>Ciproconazolo (3)</p> <p>Difenoconazolo (3)</p> <p>Penconazolo (3)</p> <p>Tetraconazolo(3)</p> <p>Tebuconazolo (3)</p> <p>Miclobutanil (3)</p> <p>Triadimenol (3)</p> <p>Pyraclostrobin (1) + Boscalid (6)</p> <p>Pyraclostrobin (1)+ Metiram (4)(5)</p> <p>Bupirimate</p> <p>Cyflufenamid</p>	<p><b>Al massimo 2 interventi per tale avversità con prodotti di sintesi; esecuzione di un terzo trattamento contro l'avversità solo per i trapianti eseguiti dopo la prima decade di maggio.</b></p> <p><b>(1) Indipendentemente dall'avversità Azoxystrobin, Pyraclostrobin e Famoxadone non possono essere complessivamente impiegati più di 3 volte all'anno.</b></p> <p><b>(2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p> <p><b>(3) Con IBE al massimo 3 interventi indipendentemente dall'avversità. Ammesse solo formulazioni non Xn.</b></p> <p><b>(4) Interventi da sospendere a 21 giorni dalla raccolta.</b></p> <p><b>(5) L'applicazione di tale formulato è consigliato solo in caso di contemporanea presenza di oidio e peronospora</b></p> <p><b>(6) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p>

<b>Muffa grigia</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - ridurre eccessi di umidità - preferire metodi d'irrigazione a goccia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>sbs plantarum</i>	La miscela (Piraclostrobin+Boscalid) è efficace anche nei confronti di questa avversità.
<b>BATTERIOSI</b> <b>Maculatura batterica</b> ( <i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i> )  <b>Picchiatura batterica</b> ( <i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> • Impiegare seme sano • Impiegare piantine sane • Evitare eccessi di umidità e metodi di irrigazione ad aspersione. • Effettuare rotazioni di almeno 2-3 anni.  <b>Interventi chimici:</b> Dopo la comparsa dei primi sintomi intervenire chimicamente ogni 7-10 giorni fino alla fioritura.	Prodotti rameici Acibenzolar-s-metil (1)	I patogeni si conservano nel terreno sui residui colturali infetti, pertanto è consigliabile bruciare tali residui. (1) Da utilizzare prima della comparsa dei sintomi.
<b>FITOPLASMI</b> <b>STOLBUR</b> (Virescenza ipertrofica )	<b>Interventi agronomici:</b> • eliminare le piante infette • ampie rotazioni • lotta ai vettori (cicaline ) • accurato controllo delle infestanti		
<b>VIROSI</b> ( <i>CMV, ToMV, PVY, TSWV</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> I criteri di intervento si basano essenzialmente su azioni preventive: • Impiego di piantine certificate virus esenti o virus controllate per il trapianto; • Accurato controllo delle erbe infestanti presenti in prossimità del campo prima del trapianto (da effettuare con pirodiserbo o sfalcio). • Nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza dei vettori (Afidi - Tripidi) per un tempestivo controllo di essi.		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
	Uso di varietà tolleranti o resistenti al	<i>Beauveria bassiana</i>	<b>(1) Tra Acetamiprid, Imidacloprid e Thiamethoxam al</b>

<p><b>Tripidi</b> (<i>Frankliniella occidentalis</i>)</p>	<p>TsWV <b>Interventi chimici:</b> Intervenire nelle prime fasi di infestazione.</p>	<p><i>Orius levigatus</i>  Azadiractina Acetamiprid (1) Spinosad (2)</p>	<p><b>massimo di 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Afidi</b> (<i>Myzus persicae</i>) (<i>Macrosiphum euphorbiae</i>)</p>	<p><b>Soglia di intervento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelle zone ad alto rischio per le virosi la soglia di intervento è rappresentata dalla sola presenza delle prime colonie.</li> <li>• Nelle zone a basso rischio per le virosi si può attendere che il 10% delle piante siano infestate da colonie in accrescimento.</li> </ul>	<p>Azadiractina Piretrine naturali Pirimicarb Alfacipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1) Fluvalinate (1) Ciflutrin (1) Cipermetrina (1) Zeta-cipermerina (1) Imidacloprid (2) Thiamethoxam (2) Acetamiprid (2) Flonicamid (3) Etofenprox (4)</p>	<p>Si consiglia di controllare accuratamente la coltura subito dopo il trapianto per evitare la trasmissione di virus. L'impiego di olio minerale (da solo o in miscela) determina una azione repellente nei confronti degli afidi.</p> <p>(1) <b>Al massimo 2 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> (2) <b>Prodotti in alternativa tra loro per un massimo di 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (3) <b>Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (4) <b>Al massimo 2 interventi l'anno, in alternativa ai Piretroidi.</b></p>
<p><b>Mosca minatrice</b> (<i>Liriomyza trifolii</i>) (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intervenire solo in caso di infestazione diffusa e tale da compromettere la produzione.</li> <li>• Porre l'attenzione sul pelato</li> </ul>	<p>Azadiractina Spinosad (1) Acetamiprid (2)</p>	<p><b>Valutare con attenzione la presenza di tale dittero al fine di evitare la confusione con la <i>Tuta absoluta</i> ed effettuare interventi non idonei al controllo.</b> <b>Al massimo 2 interventi per questa avversità.</b> (1) <b>Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (2) <b>Tra Acetamiprid, Imidacloprid e Thiamethoxam al massimo di 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>

<p><b>Elateridi</b> (<i>Agriotes spp.</i>)</p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> In caso di attacchi consistenti evitare la successione della coltura.</p>	<p>Teflutrin(1)(2) Zeta-cipermetrina (1)(2) Clorpirifos etile (3)</p>	<p><b>(1) Da applicare solo al terreno al momento del trapianto lungo la fila.</b> Utilizzato in formulazione granulare non va conteggiato nel</p>
--	--	---	--

	Le lavorazioni superficiali modificano le condizioni igrometriche del terreno e favoriscono l'approfondimento delle larve <b>Interventi chimici:</b> Intervenire in modo localizzato al trapianto ove è stata accertata la presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della presenza.		numero delle limitazione dei piretroidi. <b>(2) Prodotti in alternativa tra loro.</b>  <b>(3) Da utilizzare solo in formulazione granulare da distribuire al terreno</b>
<b>Nottue terricole</b> <i>(Agrotis ipsilon)</i> <i>(Agrotis segetum)</i>	<b>Soglia di intervento:</b> <b>1 larva ogni 5 m lineari lungo le diagonali dell'appezzamento in 4 punti, su piante all'inizio dello sviluppo</b>	Piretro naturale Alfametrina o Alfacipermetrina (1) Deltametrina(1) Ciflutrin(1) Cipermetrina (1) Zeta-Cipermetrina (1) Clorpirifos (2)	<b>Intervenire in maniera localizzata su banda lungo la fila</b>  <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno con Piretroidi indipendentemente dalla avversità</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento indipendentemente dalla avversità</b>
<b>Nottue fogliari carpofaghe</b> <i>(Heliothis armigera)</i> <i>(Plusia gamma)</i> <i>(Spodoptera spp.)</i>	<b>Soglia di intervento:</b> <b>Intervenire alla presenza delle prime larve.</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Indoxacarb (6) Alfametrina o Alfacipermetrina (1) Cipermetrina (1) Deltametrina(1) Ciflutrin(1) Lambda cialotrina(1) Zeta-Cipermetrina (1) Clorpirifos metile (2) Spinosad (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (7)	Si consiglia di impiegare le trappole a feromoni per una esatta indicazione della presenza degli adulti e la nascita delle larve. <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno con Piretroidi indipendentemente dalla avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento all'anno.</b> <b>(3) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno, 3 in presenza di <i>Tuta absoluta</i>.</b> <b>(6) Al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(7) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<b>Aleurodidi</b> <i>(Trialeurodes vaporariorum,</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>nelle aree a forte rischio di virosi intervenire all'inizio delle infestazioni.</b>	Azadiractina Piretro naturale Ciflutrin (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno con Piretroidi indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento all'anno con Neonicotinoidi</b>
---	--	---	--

<i>Bemisia tabaci</i>	<b>Nelle altre aree intervenire alla presenza di 10 neanidi per foglia.</b>	Zetacipermetrina (1) Acetamiprid (2) Imidacloprid (2) Thiamethoxam (2) Flonicamid (3)	<b>indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Tignola del pomodoro</b> <i>(Tuta absoluta)</i>	<b>Interventi biotecnici:</b> Impiegare trappole a feromone per monitorare la presenza del parassita.  <b>Interventi biologici:</b> Salvaguardare l'azione dei nemici naturali, tra quali risultano efficaci alcuni Eterotteri predatori <i>Macrolophus caliginosus</i> e <i>Nesidiocoris tenuis</i> e alcuni Imenotteri parassitoidi di uova ( <i>Trichogramma</i> spp.)  <b>Soglia di intervento:</b> <b>Presenza del fitofago</b>  <b>Interventi chimici:</b> - Si consiglia di intervenire al manifestarsi delle prime gallerie sulle foglie - Ogni s.a. va ripetuta due volte a distanza di 7-10 giorni - Alternare le ss.aa. disponibili per evitare fenomeni di resistenza	Azadiractina (1) <i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i> Indoxacarb (2) Spinosad (3) Metaflumizone (4) Emamectina (5) Clorantraniliprole (6)	<b>(1) Al momento sono autorizzati solo formulati commerciali impiegabili in fertirrigazione.</b> <b>(2) Al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(5) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(6) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<b>Ragnetto rosso</b> <i>(Tetranychus urticae)</i>	<b>SOGLIA</b> <b>Presenza diffusa</b>	<i>Phytoseiulus persimilis</i> <i>Beauveria bassiana</i>	<b>Al massimo 2 interventi per tale avversità con prodotti di sintesi; esecuzione di un terzo trattamento contro l'avversità solo per i trapianti eseguiti dopo la prima</b>
---	--	---	--

	E' bene alternare le diverse sostanze attive con diverso meccanismo d'azione al fine di attenuare fenomeni di resistenza (ad esempio il Clofentezine in alternativa con gli altri acaricidi)	Exitiazox Etoxazole Fenazaquin (1) Abamectina (2) Bifenazate Fenpiroximate Tebufenpirad Clofentezine Acequinocil	<b>decade di maggio.</b>  (1) <b>Al massimo 1 intervento. Impiegabile fino al 30/11/2012.</b> (2) <b>Al massimo 1 intervento, indipendentemente dalla avversità.</b>
<b>Dorifora</b> <i>(Leptinotarsa decemlineata)</i>	<b>SOGLIA:</b> Infestazione generalizzata	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>tenebrionis</i>	Da impiegare contro larve giovani.
<b>Cimice verde</b> <i>(Nezara viridula)</i>	<b>Limitare l'intervento alle sole coltivazioni ove è stata rilevata una presenza diffusa e significativa di cimici</b>	Piretro naturale	Limitare il trattamento alle fasce perimetrali dell'apezzamento, soprattutto su quelle ai lati di fossi, cavedagne e incolti.
<b>Afidi</b> <b>Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> <b>- Immersione delle piantine prima del trapianto</b>	Thiametoxam (1)	(1) Da effettuarsi prima del trapianto.
<b>Nematodi galligeni</b> <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - effettuare rotazioni con specie poco sensibili - eliminare e distruggere i residui della coltura precedente - evitare ristagni idrici - impiegare varietà tolleranti/resistenti - utilizzo di pannelli di semi di brassica (1)  <b>Interventi fisici:</b> - solarizzare il terreno con telo di P.E. trasparente dello spessore di mm 0,05 durante i mesi di giugno-agosto per almeno 50 giorni	Azadiractina (2)	Presente nei terreni prevalentemente sabbiosi. (1) Da utilizzare alla dose di 2,5 t/ha, 7-10 giorni prima del trapianto, con interrimento a 15-20 cm e bagnatura successiva. (2) Se ne consiglia l'utilizzo solo in colture pacciamate.

## POMODORO

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina Pre-trapianto</b>		Glifosate 30,4 + solfato ammonico  Metribuzin 35 * S-Metolaclor 86,5 Pendimetalin 38,72	1,5-3 + 3-5  0,5 1 -1,5 1,75	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettano lavorazioni meccaniche. *Non utilizzare nei terreni sabbiosi.</b>
<b>Pre-emergenza</b>		Aclonifen 49,6 Metribuzin 35*	1,5-2 0,15-0,25	<b>*Non utilizzare nei terreni sabbiosi.</b>
<b>Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e monocotiledoni	Oxadiazon 34,86 ° Aclonifen 49 (Flufenacet 60 + Metribuzin 35) ° Metribuzin 35 S-Metolaclor 86,5 Pendimetalin 38,72 Flufenacet 60	1 1,5-2 0,85+0,5 0,5 1 -1,5 1,75 0,6-0,8	° Da utilizzare laddove si preveda la presenza di <i>Solanum nigrum</i> .
<b>Post-emergenza Post-trapianto</b>	Dicotiledoni  Graminacee	Metribuzin 35 Rimsulfuron 25  Quizalofop-etile isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5 Ciclossidim 10,9 Clethodim 25 Propaquizafop 9,7	0,2-0,5 0,03-0,05  1 -1,5 1-1,5 1,5-2,5 0,6 0,8-1	

**COLZA**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria brassicae</i>  <b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>  <b>Peronospora</b> <i>Peronospora parasitica</i>	<b>Non ammessi trattamenti</b>		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
-----------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------------

<p><b>Meligete</b> <i>Meligethes aeneus</i></p>	<p>Intervenire in pre-fioritura al superamento della soglia di <b>6-8 insetti/pianta</b>.</p>	<p>fluvalinate(1) lambda-cialotrina (1) deltametrina (1) acetamiprid (2)</p>	<p><b>Al massimo 1 intervento l'anno contro l'avversità.</b> <b>(1)Piretroidi: ammesso 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Altica d'inverno del colza</b> <i>Psylliodes chrysocephala</i></p> <p><b>Punteruolo dello stelo</b> <i>Ceuthorrhynchus napi</i></p> <p><b>Tentredine</b> <i>Athalia rosae</i></p> <p><b>Afide ceroso</b> <i>Brevicoryne brassicae</i></p>	<p>Per il monitoraggio dell'altica controllare le piantine dallo stadio di foglie cotiledonari a quello di 2-3 foglie vere. <b>Soglia: erosioni sul 25-30% delle piante.</b></p> <p>Per il monitoraggio del punteruolo utilizzare bacinelle trappola di colore giallo riempite di acqua più bagnante e collocarle nella fascia perimetrale della coltivazione, tenendole sempre al di sopra della vegetazione. <b>La soglia è di 10 adulti/vaschetta nelle 24 ore o di 40 - 50 adulti/settimana</b> dalla ripresa vegetativa primaverile fino a quando il fusto non raggiunge l'altezza di 20 cm.</p> <p><b>Intervenire contro le larve in caso di forte infestazione.</b></p> <p>Intervenire quando viene superata la <b>soglia di 2 colonie/m<sup>2</sup></b></p>	<p>fluvalinate (1)(4) deltametrina (1)(5) lambda-cialotrina(1)(6) acetamiprid (2)(3)</p>	<p><b>Ammesso un solo trattamento contro queste avversità.</b></p> <p><b>(1)Piretroidi: ammesso 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Impiegabile solo nei confronti dell'altica.</b> <b>(4) Non impiegabile contro Tentredine e Punteruolo.</b> <b>(5) Non impiegabile contro Tentredine.</b> <b>(6) Non impiegabile contro punteruolo.</b></p>

## COLZA

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi(l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Metazachlor 43,5	2,5	
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Metazachlor 43,5	2	
	Dicotiledoni	Clopiraliid 10	1-1,2	
	Graminacee	Ciclossidim 10,9	1-2	
		Propaquizafop 9,7	1	
		Quizalofop-etile isomero D 4,93	1 -1,5	
		Quizalofop-p-etile 5	1 -1,5	

## CIPOLLA

### Difesa fitosanitaria

Avversità	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora schleideni</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare eccessi di concimazione azotata - razionalizzazione della pratica irrigua, evitando gli eccessi idrici <b>Interventi chimici:</b> intervenire solo in corrispondenza di piogge persistenti, umidità atmosferica elevata e temperature non elevate.	Prodotti rameici Benalaxil (1) Metalaxil-M (1) Cymoxanil (2) Iprovalicarb(4) Azoxystrobin (3) (Piraclostrobin(3)+Dimetomorf (4))	(1) Al massimo 2 interventi l'anno. (2) Al massimo 3 interventi l'anno. (3) Al massimo 2 interventi l'anno. (4) Al massimo 3 interventi l'anno.
<b>Ruggine</b> <i>Puccinia porri</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso di varietà a maturazione non tardiva; - ampie rotazioni		
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ricorso a varietà resistenti; - ampie rotazioni; - impiego di seme sano; - dopo l'estirpazione far asciugare i bulbi in campo.		
<b>Muffa grigia</b> <i>Botritis squamosa</i> e <i>Botritis allii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare gli eccessi irrigui e di concimazione azotata <b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di condizioni climatiche favorevoli e alla comparsa dei primi sintomi	Cyprodinil + Fludioxonil** Pyrimethanil**	** Al massimo 2 interventi l'anno; prodotti in alternativa tra loro.

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mosca dei bulbi</b> <i>Delia antiqua</i> , <i>D. platura</i>	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo dopo aver accertato la presenza dell' infestazione.	Piretrine naturali Deltametrina (1)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità.
<b>Tripidi</b> <i>Thrips spp.</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> 15-20 individui/pianta e non oltre lo stadio di 3 foglie.	Acrinatrina* Deltametrina* Lambda-cialotrina* Alfa-cipermetrina* Cipermetrina* Etofenprox* Spinosad (1)	<b>Ammessi 3 interventi all'anno contro questa avversità.</b> * Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi, Acrinatrina e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità. (1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> uso di seme o piantine esenti da nematodi.		

<b>Fitofagi occasionali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> localizzati alla semina e ammessi solo in caso di accertata presenza con specifici monitoraggi.	Clorpirifos	
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazione diffusa	Deltametrina Lambda-cialotrina Cipermetrina Etofenprox	<b>Ammesso 1 solo trattamento all'anno nei confronti del parassita.</b> <b>Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afidi</b> <i>Myzus ascalonicus</i> ed altre specie	<b>Interventi chimici:</b> solo in caso di presenza diffusa e su giovani impianti	Piretrine naturali	

## CIPOLLA

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-3+3,5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettono lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Pendimethalin 38,72 Cloridazon 65 (1)	2 1	<b>(1) Al massimo 2,6 kg/ha di s.a. ogni tre anni.</b>
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee  Dicotiledoni annuali  composite e ombrellifere da seme; <i>Cirsium arvense</i> .  Graminacee	Pendimethalin 38,72  Oxifluorfen 48* Ioxinil 23  Clopiralid 10 °  Quizalofop-etile-isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5 Ciclossidim 10,9 Propaquizafop 9,7	1 -1,5  0,03-0,25 0,15 -0,85  0,5-1  1 -1,5 1 -1,5 1-2 0,8	Trattamenti ripetuti finché prosegue l'emergenza delle infestanti. Per migliorare l'azione è consentito l'aggiunta di olio minerale bianco (da evitare nelle prime fasi della coltura). * se ne sconsiglia l'uso nei primi stadi della coltura (1-2 foglie), per problemi di fitotossicità; ° intervenire all' emergenza delle specie da seme indicate.

**CIPOLLA DA SEME**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora schleideni</i> )	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare eccessive concimazioni azotate</li> <li>- razionalizzare la pratica irrigua evitando gli eccessi idrici</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b>            intervenire in presenza di condizioni climatiche favorevoli (piogge persistenti, umidità relativa alta, temperature non elevate)</p>	Prodotti rameici Benalaxil (1) Metalaxil-M (1) Cimoxanil (2) Azoxistrobin(3) (Piraclostrobin(3)+Dimetomorf(4)) Iprovalicarb (4)	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</p> <p>(2) Al massimo 3 interventi l'anno.</p> <p>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</p> <p>(4) Al massimo 3 interventi l'anno.</p>
<b>Botrite</b> ( <i>Botrytis squamosa</i> , <i>B.allii</i> )	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare eccessive concimazioni azotate</li> <li>- razionalizzare la pratica irrigua evitando gli eccessi idrici</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b>            intervenire in presenza di condizioni climatiche favorevoli e alla comparsa dei primi sintomi</p>	Cyprodinil + Fludioxonil** Pyrimethanil**	<p>** Al massimo 2 interventi l'anno; prodotti in alternativa tra loro.</p>
<b>Fusariosi</b> ( <i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cepae</i> )	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare ampie rotazioni</li> <li>- impiegare varietà tolleranti</li> <li>- impiegare seme sano</li> </ul>		

<b>Fitofagi</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
-------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

<b>Mosche dei bulbi</b> ( <i>Delia antiqua</i> , <i>D.platura</i> )	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo dopo aver accertato la presenza dell'infestazione	Deltametrina (1)	<b>(1)Al massimo 2 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> <b>soglia:</b> 15-20 individui/pianta	Acrinatrina* Alfa-cipermetrina* Cipermetrina* Deltametrina* Lambda-cialotrina* Etofenprox* Spinosad (1)	<b>*Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi, Acrinatrina e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</b>
<b>Nematodi</b> ( <i>Dytilenchus dipsaci</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme esente dal nematode		

<b>Fitofagi occasionali</b> <input type="checkbox"/>	<b>Criteria d'intervento</b> <input type="checkbox"/>	<b>Principi attivi e ausiliari</b> <input type="checkbox"/>	<b>Limitazioni d'uso e note</b> <input type="checkbox"/>
<b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in maniera localizzata alla semina e solo in caso di presenza accertata con specifici monitoraggi	Clorpirifos	
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse	Deltametrina* Lambda-cialotrina* Etofenprox*	<b>* Al massimo 2 interventi l'anno con piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afidi</b> ( <i>Myzus ascalonicus</i> e altre specie)	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse e su giovani impianti	Piretrine naturali	

## CIPOLLA DA SEME

### Controllo delle infestanti

Epoca d'intervento	Infestanti	Principi attivi (%)	Dosi (l-kg/ha)	Limitazioni d'uso e note
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate 30,4	1,5-3	
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Pendimetalin 38,72 Cloridazon 65 (1)	2 1	<b>(1) Al massimo 2,6 kg/ha di s.a. ogni tre anni.</b>
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee  Dicotiledoni  composite e ombrellifere da seme; <i>Cirsium arvense</i>  Graminacee	Pendimetalin 38,72  Oxifluorfen 48 Ioxinil 23  Clopiralid 10*  Ciclossidim 10,9 Propaquizafop 9,7 Quizalofop-etile isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1-1,5  0,03-0,25 0,15 – 0,85  0,5-1  1-2 0,8 1- 1,5 1-1,5	<b>Impiegare le dosi più basse nelle fasi iniziali di sviluppo della coltura.</b>  <b>*Da impiegare dopo la seconda foglia vera.</b>

## AGLIO

### Difesa fitosanitaria

Avversità	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Peronospora</b> <i>Peronospora schleideni</i></p>	<p><b>Interventi chimici</b> In presenza di condizioni termoigrometriche favorevoli alla malattia (piogge ripetute e alta umidità).</p>	<p>Piraclostrobin+Dimetomorf (1)</p>	<p>(1) Con QoI (Piraclostrobin e Azoxistrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Marciume verde-azzurro</b> <i>Penicillium</i> spp.</p> <p><b>Marciume bianco</b> <i>Sclerotium cepivorum</i></p> <p><b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp.</p> <p><b>Elmintosporiosi</b> <i>Helminthosporium alli</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare ristagni idrici</li> <li>- lunghe rotazioni</li> <li>- zappatura tra le file</li> <li>- utilizzare aglio "da seme" sano</li> <li>- sgranatura dei bulbi dopo adeguato riscaldamento per evitare possibili ferite</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b> disinfezione chimica secca o umida esclusivamente sui bulbilli.</p>		<p>Ammessa solo la disinfezione dei bulbi.</p>

<b>Ruggine dell'aglio</b> <i>Puccinia allii</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - distruzione del materiale infetto - lunghe rotazioni  <b>Interventi chimici:</b> <b>intervenire alla comparsa dei sintomi.</b>	Prodotti rameici Azoxistrobin(1) Tebuconazolo	<b>(1) Con QoI (Piraclostrobin e Azoxistrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas fluorescens, ecc.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni colturali - utilizzare aglio da seme esente da batteri - eliminazione dei residui infetti - è sconsigliato irrigare con acque inquinate  <b>Interventi chimici:</b> <b>ammessi solo in caso di condizioni climatiche favorevoli e alla comparsa dei primi sintomi</b>	Prodotti rameici	<b>I residui colturali infetti non vanno interrati.</b>

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Nematode degli steli e dei bulbi</b> <i>Ditylenchus dipsaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - rotazioni quinquennali con piante che nella zona non sono generalmente attaccate dal nematode (cereali, barbabietola da zucchero, etc.) - evitare avvicendamenti con erba medica, spinacio, cipolla e lattuga (piante ospiti del nematode). <b>Interventi chimici:</b> sconsigliati.		<b>Non sono consentite fumigazioni con prodotti chimici ad azione nematocida.</b>
<b>Mosca dell'aglio</b> <i>Suillia univittata</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - cattura con attrattivi alimentari degli adulti svernanti <b>Interventi chimici</b> Interventi precoci contro gli adulti svernanti e contro le larve appena nate.	Azadiractina	

## AGLIO

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento)

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-2,5+ 3,5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettano lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	dicotiledoni e graminacee	pendimethalin 38,72 metazaclor 43,5 oxadiazon 34,86	2,5 1,5-2 1	
<b>Post-emergenza</b>	dicotiledoni graminacee  dicotiledoni e graminacee	oxifluorfen 48 ioxinil 23  propaquizafop 9,7 quizalofop-etile-isomero D 4,93 quizalofop-p-etile 5  metazaclor 43,5 pendimethalin 38,72	0,05-0,25 0,15 – 0,85  1 1 – 1,5 1-1,5  1,5-2 1,5	Trattamenti ripetuti finché prosegue l'emergenza delle infestanti. Per migliorare l'azione è consentito l'aggiunta di olio minerale bianco (da evitare nelle prime fasi della coltura).

## FINOCCHIO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> <i>Plasmopara nivea</i>	<b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Fitoftora</b> <i>Phytophthora syringae</i>	<b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - bassa densità d'impianto - moderate irrigazioni - evitare gli eccessi d'azoto	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i> Ciprodinil + Fludioxonil	<b>Al massimo un intervento all'anno.</b>
<b>BATTERIOSI</b> <b>Marciume batterico</b> <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare di lesionare le piante durante le lavorazioni colturali - asportare e distruggere le piante colpite <b>Interventi chimici:</b> in presenza di sintomi	Prodotti rameici	

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis</i> spp.	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Lambda-cialotrina* Spinosad (1)	<b>*Ammesso un solo intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (1) Al massimo 3 interventi all'anno.</b>
<b>Nottue defogliatrici</b> <i>Mamestra brassicae</i>	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse.	<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>	
<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ammessi solo nei primi stadi di sviluppo.	Lambda-cialotrina*	<b>*Ammesso un solo intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b>

<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>ammessa la geodisinfestazione solo in caso di accertata presenza con specifici monitoraggi.</b>	Teflutrin	
<b>Afidi</b> varie specie	<b>Interventi chimici:</b> <b>ammessi solo in caso di infestazioni diffuse.</b>	Piretrine naturali Lambda-cialotrina*	<b>*Ammesso un solo intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b>

## FINOCCHIO

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina o pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-2,5+ 3,5	<b>Intervenire solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettano lavorazioni meccaniche.</b>
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone 30,74 (1) Clorprofam 40,8	0,3 4-6	<b>(1) Impiegabile solo su coltura a semina diretta.</b>
<b>Pre-emergenza Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Oxadiazon 34,86 Pendimetalin 38,72	1-1,5 2,5	
<b>Post-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee  Graminacee	Pendimetalin 38,72 Linuron 37,6  Ciclossidim 10,9	2,5 0,5-1  1-2	
<b>Post-emergenza</b>	Graminacee  Dicotiledoni e graminacee	Ciclossidim 10,9  Clorprofam 40,8	1-2  4-6	

## CAVOLFIORE - CAVOLO BROCCOLO - CAVOLO CAPPuccio - CAVOLO RAPA - CAVOLO VERZA

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora brassicae,</i> <i>Peronospora parasitica</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni - raccolta e distruzione delle prime foglie ammalate - impiego di cultivar resistenti <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Propamocarb Metalaxil * <sup>^</sup> M-Metalaxil* <sup>o</sup>	* Ammessi 2 trattamenti all'anno ^ Autorizzato solo su cavolo verza. ° Autorizzato solo su cavolfiore e cavolo broccolo.
<b>Alternaria</b> <i>Alternaria brassicae, A. brassicicola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - ampie rotazioni - raccolta e distruzione piante infette - concimazioni equilibrate <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici  Azoxystrobin** <sup>(1)</sup> Boscalid+Piraclostrobin (1)(2) Difenconazolo* <sup>(3)</sup>	* Autorizzato solo su cavolfiore. ** Autorizzato solo su cavolfiore e cavolo cappuccio. (1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Ammesso solo su cavolo broccolo e su cavolfiore. (3) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Ruggine bianca</b> <i>Albugo candida</i>	<b>Interventi chimici:</b> alla comparsa della malattia	Prodotti rameici	
<b>Marciumi basali</b> <i>Sclerotinia sp., Rhizoctonia solani, Phoma lingam</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme conciato; effettuare ampie rotazioni - raccolta e distruzione piante infette - concimazioni equilibrate  <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa della malattia.	<i>Trichoderma</i> spp. (4) <i>Coniothyrium minitans</i> (4)(5) Tolclofos-metile (1) Boscalid+Piraclostrobin (2)(3)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Ammesso solo su cavolo broccolo, nei confronti della <i>Sclerotinia</i> . (3) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Non ammesso su cavolo rapa. (5) Impiegabile solo nei confronti di <i>Sclerotinia</i> .

<b>BATTERIOSI</b> <b>Marciume nero</b> <i>Xanthomonas campestris</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - sospendere per almeno 3 anni la coltivazione di crucifere nei campi infetti; - asportare e distruggere le piante colpite. <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Marciume molle</b> <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - durante i periodi particolarmente umidi, evitare di lesionare le piante durante le lavorazioni colturali - asportare e distruggere le piante colpite <b>Interventi chimici:</b> in presenza di sintomi	Prodotti rameici	
<b>Fitofagi</b>	<b>Criteria d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afide ceroso del cavolo</b> <i>Brevicoryne brassicae</i>	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse.	Piretrine naturali Azadiractina(3)(4) Pirimicarb Imidacloprid(1) Thiamethoxam (1)(2) Acetamiprid (1)(3) Lambda-cialotrina(5)(6) Zeta-cipermetrina(5)(6) Cipermetrina(5)(3) Ciflutrina(5) Deltametrina (3)(5) Etofenprox(7)(8) Spirotetramat (9)	Ammessi 2 interventi complessivi all'anno. (1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto. (2) Autorizzato solo su cavolo broccolo. (3) Non ammesso su cavolo rapa. (4) Non ammesso su c. broccolo. (5) Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina. (6) Non ammesso su c. verza e c. rapa. (7) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (8) Ammesso solo su c. cappuccio e c. verza. (9) Al massimo 2 interventi all'anno, solo su cavolo verza e cavolo cappuccio.

<p><b>Nottue defogliatrici</b>  <i>Mamestra brassicae</i>,  <i>Pieris brassicae</i>, <i>Pieris rapae</i>.</p>	<p><b>Interventi chimici:</b>  in presenza di infestazione, interventi tempestivi contro le larve di 1<sup>a</sup> età.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i>  Azadiractina(1)(2)  Lambda-cialotrina(3)(4)  Zeta-cipermetrina(3)(4)  Cipermetrina(3)  Ciflutrina(3)  Deltametrina(1)(3)  Alfa-cipermetrina(3)(5)  Indoxacarb(1)(6)  Etofenprox(7)(8)  Spinosad (1)(9)  Metaflumizone (10)  Emamectina(11)  Clorantraniliprole (12)  [Clorantraniliprole(12)+Lambda-cialotrina (3)](13)</p>	<p>(1) Non ammesso su cavolo rapa.  (2) Non ammesso su c. broccolo.  (3) Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina.  (4) Non ammesso su c. verza e c. rapa.  (5) Ammesso solo su cavolfiore e c. cappuccio; impiegabile solo contro <i>P. brassicae</i>.  (6) Al massimo 3 interventi l'anno.  (7) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità  (8) Non ammesso su cavolfiore, cavolo broccolo e cavolo rapa.  (9) Al massimo 3 interventi l'anno.  (10) Al massimo 2 interventi l'anno; ammesso solo su cavolo cappuccio.  (11) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Pieris brassicae</i>; non autorizzato su c. rapa.  (12) Al massimo 2 interventi l'anno. Non ammesso su cavolfiore e cavolo rapa.  (13) Non ammesso su cavolo rapa. Impiegabile solo contro <i>Pieris brassicae</i>.</p>
---	---	--	---

<p><b>Altica</b> <i>Phyllotreta</i> spp.</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> alla comparsa degli adulti.</p>	<p>Deltametrina (1)(4) Thiamethoxam (2)(3) Acetamiprid (2)(4)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina. (2) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto. (3) Autorizzato solo su cavolo broccolo. (4) Non ammesso su cavolo rapa.</p>
<p><b>Afidi, Altica</b></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.</p>	<p>Thiamethoxam (1)</p>	<p>(1) Da effettuarsi prima del trapianto. Ammesso solo per cavolo broccolo.</p>
<p><b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.</p>	<p><b>Soglia: 2-3 larve/mq</b> <b>Interventi chimici:</b> al trapianto.</p>	<p>Teflutrin (1) Zeta-cipermetrina (2)</p>	<p>Ammesso 1 intervento localizzato all'anno. (1) Autorizzato solo su cavolfiore e cavolo cappuccio. (2) Non ammesso su cavolo rapa.</p>
<p><b>Punteruoli</b> <i>Baris</i> spp., <i>Ceuthorrhyncus</i> spp.</p>			

## CAVOLFIORE - CAVOLO BROCCOLO - CAVOLO CAPPuccio - CAVOLO RAPA - CAVOLO VERZA

### Controllo delle infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi(1-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4 ° + solfato ammonico	1,5-2,5+ 3,5	°Impiegare solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettono lavorazioni meccaniche.  *Ammesso solo su cavolfiore. (1) Ammesso solo su cavolfiore, c. cappuccio e c. verza.
		Oxadiazon 34,86*	1,2	
		Oxifluorfen 48	0,7-1,3	
		Pendimetalin 38,72 Napropamide 41,85 (1)	2,5 2-3	
<b>Post-trapianto</b>	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D 4,93 (1)	1 - 1,5	* Ammesso solo su cavolo cappuccio, c. verza e su cavolo broccolo. **Ammesso solo su cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore. (1)Ammesso solo su cavolfiore e cavolo cappuccio e c.verza.
		Quizalofop-p-etile 5 (1)	1-1,5	
		Propaquizafop 9,7 *	1	
		Ciclossidim 10,9**	1,5-2,5	
	Dicotiledoni e graminacee	Metazaclor 43,5	1,5	
		Dicotiledoni	Clopiralid 75	
	Piridate 45		0,5-2	

**CAVOLO DA SEME**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Moria delle piantine</b> ( <i>Pythium</i> spp.) □	<b>Interventi chimici:</b>  Intervenire in caso di condizioni favorevoli alla malattia	Propamocarb (Propamocarb+Fosetil) (1) Metalaxil-M (2)	<b>Al massimo un intervento all'anno contro questa avversità.</b> <b>(1) Ammesso per la difesa dei semenzai.</b> <b>(2) Ammesso solo su cavolfiore, verza, broccolo.</b>
<b>Sclerotinia</b> ( <i>Sclerotinia</i> spp.)	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - eliminare i residui colturali infetti - facilitare lo sgrondo delle acque <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei primi sintomi	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) Tolclofos-metile	<b>Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità.</b> <b>(1) Non ammesso su cavolo rapa.</b>
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora brassicae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare piantine sane - eliminare le prime foglie infette <b>Interventi chimici:</b> Intervenire in caso di condizioni favorevoli alla malattia o alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Propamocarb Metalaxil-M* Metalaxil**	<b>*Ammesso solo su cavolfiore, broccolo.</b> <b>**Ammesso solo su cavolo verza.</b>
<b>Alternariosi</b> ( <i>Alternaria brassicae</i> , <i>A. brassicicola</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare piantine sane - eliminare le piante infette <b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici (Piraclostrobin+Boscalid)(1)(2) Azoxystrobin (1)(3) Difenoconazolo(4)(5)	<b>(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Ammesso solo su c. broccolo e cavolfiore.</b> <b>(3) Ammesso solo su cavolfiore e c. cappuccio.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(5) Ammesso solo su cavolfiore.</b>
<b>Ruggine bianca</b> ( <i>Albugo candida</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	

<b>BATTERIOSI</b> <b>Marciume nero</b> <i>(Xantomonas campestris)</i> ☐	<b>Interventi agronomici:</b> - sospendere per almeno tre anni la coltivazione di crucifere nei campi infetti - eliminare e distruggere le piante infette <b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Marciume molle</b> <i>(Erwinia carotovora)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare e distruggere le piante infette - nei periodi particolarmente umidi evitare di lasonare le piante con le lavorazioni colturali - eliminare le crucifere infestanti <b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Fitofagi</b> ☐	<b>Criteri d'intervento</b> ☐	<b>Principi attivi e ausiliari</b> ☐	<b>Limitazioni d'uso e note</b> ☐
<b>Elateridi</b> <i>(Agriotes spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire al trapianto al superamento della <b>soglia di 2-3 larve/m<sup>2</sup></b>	Teflutrin(1)(2) Zeta-cipermetrina(1)(3)	<b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, effettuato in maniera localizzata; prodotti in alternativa tra loro.</b> <b>(2) Ammesso solo su cavolfiore e cappuccio.</b> <b>(3) Non ammesso su cavolo rapa.</b>
<b>Altiche delle crucifere</b> <i>(Phyllotreta spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa degli adulti	Deltametrina*(3) Thiamethoxam(1)(2) Acetamiprid (1)(3)	* <b>Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina e massimo 2 con Etofenprox.</b> <b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Autorizzato solo su cavolo broccolo.</b> <b>(3) Non ammesso su cavolo rapa.</b>

<p><b>Afide ceroso del cavolo</b> (<i>Brevicoryne brassicae</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> Intervenire in presenza di infestazioni diffuse</p>	<p>Imidacloprid (1) Acetamiprid (1)(2) Thiamethoxam (1)(3) Ciflutrin**° Cipermetrina**°° Deltametrina**(2) Lambda-cialotrina**^ Zeta-cipermetrina**° Alfa-cipermetrina**(4)</p>	<p>(1)Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Non ammesso su cavolo rapa. (3)Autorizzato solo su cavolo broccolo. (4)Non ammesso su c. broccolo, cavolo rapa e c. verza. ** Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina e massimo 2 con Etofenprox. °Ammesso solo su cavolfiore, c. broccolo e c. cappuccio. °°Ammesso solo su cavolfiore, broccolo, cappuccio, verza. ^Ammesso solo su cavolfiore e c. cappuccio.</p>
<p><b>Nottue defogliatrici</b> (<i>Mamestra brassicae</i>,<i>Pieris brassicae</i>,<i>P. rapae</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> Intervenire in presenza di infestazioni con trattamenti tempestivi contro larve di 1ª età</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina (1)(2) Lambda-cialotrina(3)(4) Zeta-cipermetrina(3)(4) Cipermetrina(3) Ciflutrina(3) Deltametrina(1)(3) Alfa-cipermetrina(3)(5) Indoxacarb(6) Etofenprox(3)(7) Spinosad(1)(8) Emamectina (9) Clorantraniliprole (10)</p>	<p>(1)Non autorizzato su c. rapa. (2)Non ammesso su c. broccolo. (3)Al massimo 3 interventi l'anno con piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità, di cui massimo 2 con Deltametrina e massimo 2 con Etofenprox. (4)Non ammesso su c. verza e c. rapa. (5)Ammesso solo su cavolfiore e c. cappuccio; impiegabile solo contro <i>P. brassicae</i>. (6)Al massimo 3 interventi l'anno. (7)Non ammesso su cavolfiore, cavolo broccolo e cavolo rapa. (8)Al massimo 3 interventi l'anno. (9) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Pieris brassica</i>; non autorizzato su c. rapa. (10) Al massimo 2 intervnti l'anno. Non ammesso su cavolfiore e cavolo rapa.</p>
<p><b>Punteruoli</b> (<i>Baris</i> spp., <i>Ceuthorrhynchus</i> spp.)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> alla comparsa degli adulti prima delle ovodeposizioni.</p>	<p>Teflutrin (1)(2)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, alla rincalzatura. (2) Ammesso solo su cavolfiore e cappuccio.</p>

<b>Cecidomia delle silique</b> <i>(Dasyneura brassicae)</i>			
--	--	--	--

## CAVOLO DA SEME

### Controllo delle infestanti

Integrare le tecniche di diserbo chimico con quelle di carattere agronomico (sarchiature, avvicendamento)

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4 ° + solfato ammonico	1,5-2,5+ 3,5	°Impiegare solo nel caso in cui le condizioni del terreno non permettono lavorazioni meccaniche.  *Ammesso solo su cavolfiore **Ammesso solo su cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore.
		Oxadiazon 34,86*	1,2	
		Oxifluorfen 48	0,7-1,3	
		Pendimetalin 38,72	2,5	
		Napropamide 41,85**	2-3	
<b>Post-trapianto</b>	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D 4,93 (1)	1 - 1,5	* Ammesso solo su cavolo cappuccio, c. verza e su cavolo broccolo. **Ammesso solo su cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolfiore. (1)Ammesso solo su cavolfiore e cavolo cappuccio e c.verza.
		Quizalofop-p-etile 5 (1)	1-1,5	
		Propaquizafop 9,7 *	1	
		Ciclossidim 10,9**	1-2	
	Dicotiledoni e graminacee	Metazaclor 43,5	1,5	
Dicotiledoni	Clopiralid 75	0,16		

## CARCIOFO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici Metalaxil-M Metalaxil Cimoxanil Fosetil Al Azoxystrobin°	Al massimo 2 interventi l'anno contro questa avversità, escluso l'impiego dei rameici. °Ammessi 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Leveillula taurica</i>	Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Zolfo Penconazolo(1) Tetraconazolo (1) Propiconazolo (1) Tebuconazolo(1) Ciproconazolo(1) Miclobutanil(1) Quinoxifen Azoxystrobin(2)	Al massimo 2 interventi l'anno contro questa avversità, escluso l'impiego dello zolfo.  (1)Ammesse solo formulazioni non Xn.  (2)Ammessi 2 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
<b>Marciumi del colletto</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotium rolfsii</i> , <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare le concimazioni eccessive , le rincalzature anticipate e le irrigazioni troppo frequenti; - evitare la coltivazione di altre colture suscettibili; - effettuare ampie rotazioni. <b>Interventi chimici:</b> vanno effettuati alla comparsa dei primi sintomi delle infezioni.	<i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Trichoderma</i> spp.	(1) Impiegabile solo contro la <i>Sclerotinia</i> .

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
----------	----------------------	-----------------	--------------------------

<p><b>Afidi</b> <i>Brachycaudus cardui,</i> <i>Aphis fabae,</i> <i>Myzus persicae</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa delle prime colonie, in corrispondenza delle prime fasi vegetative.</p>	<p>Piretrine naturali Pirimicarb Lambda cialotrina(1) Deltametrina(1) Imidacloprid</p>	<p><b>Amnesso un solo intervento all'anno con prodotti di sintesi.</b>  <b>(1)Al massimo 2 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Depressaria del carciofo</b> <i>Depressaria erinaceella</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> da effettuarsi in corrispondenza della nascita delle larve (inizi di Ottobre).</p> <p><b>Interventi agronomici:</b> asportare e distruggere a fine coltura i residui della vegetazione infestati dalle larve.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i>  Deltametrina(1) Spinosad (2) Emamectina (3)</p>	<p><b>Nei confronti del fitofago sono ammessi massimo 2 interventi all'anno con prodotti di sintesi.</b> <b>(1)Al massimo 2 interventi l'anno con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3)Al massimo 2 interventi l'anno.</b></p>
<p><b>Nottua del carciofo</b> <i>Gortyna xantenes</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> si consiglia l'utilizzo delle trappole a ferormone per segnalare il probabile inizio dell'infestazione; i trattamenti vanno effettuati in corrispondenza della nascita delle larve (gennaio -febbraio).</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i>  Alfa-cipermetrina^ Deltametrina^ Lambda-cialotrina^ Spinosad(1)</p>	<p><b>Nei confronti del fitofago sono ammessi al massimo 2 interventi all'anno con prodotti di sintesi.</b> <b>^ Piretroidi ammessi per un intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Cassida del carciofo</b> <i>Cassida deflorata</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di infestazione diffusa.</p>	<p>Piretrine naturali</p>	
<p><b>Lumache e limacce</b></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire alla loro comparsa.</p>	<p>Esche avvelenate con Metaldeide Fosfato ferrico</p>	
<p><b>Arvicole</b></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire con esche avvelenate in estate, quando la coltura non è in vegetazione e le arvicole escono all'aperto e hanno scarso alimento. Collocare l'esca in prossimità dei fori di uscita delle gallerie e nascoste alla vista degli uccelli.</p>	<p>Esche avvelenate con Cumarine</p>	<p><b>Consentito solo l'impiego delle esche.</b></p>

## CARCIOFO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni - Monocotiledoni	Glifosate 30,4	1,5 - 3	
<b>Post-trapianto o pre-ricaccio</b>	Dicotiledoni - Monocotiledoni	Glifosate 30,4* Pendimetalin 38,72* Oxifluorfen 48* Oxadiazon 34,86* Metazaclor 43,5	1,5 - 3 2,5 0,5-1,5 1-2 1,5-2	*evitare il contatto con la coltura, tramite l'uso di attrezzature schermanti.
<b>Copertura o pre-ricaccio</b>	Graminacee	Propaquizafop 9,7 Ciclossidim 10,9 Quizalofop-etile-isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1 1,5-2,5 1 - 1,5 1-1,5	

## MELONE - COCOMERO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<p><b>Peronospora</b> <i>Pseudoperonospora cubensis</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - realizzare ampie rotazioni colturali; - ridurre al minimo la bagnatura fogliare; - distruggere i residui colturali infetti.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> - con condizioni climatiche favorevoli (piogge persistenti e temperature comprese fra 15 e 22 °C) effettuare trattamenti cautelativi.</p>	<p>Prodotti rameici Propamocarb Fosetil Al Metalaxil (1) Metalaxil-M(1) Cimoxanil°(2) Dimetomorf ° (3) Iprovalicarb (3) Mandipropamide ° (3) Azoxystrobin (4) Fenamidone°(4) Cyazofamid (5) Famoxadone°(4) Ametocradina (6)° Pyraclostrobin ° (7) (4)</p>	<p>(1) Al massimo 2 interventi l'anno. ° Non ammesso su cocomero. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Con CAA (Iprovalicarb, Dimetomorf, Mandipropamide) al massimo 4 interventi l'anno; su cocomero al massimo 2 interventi l'anno con Iprovalicarb. (4) Con QOI (Azoxystrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone, Famoxadone e Pyraclostrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi l'anno. (6) Al massimo 2 interventi l'anno. (7) Al massimo 2 interventi l'anno.</p>
<p><b>Mal bianco</b> <i>Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginea</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - impiegare varietà resistenti o tolleranti (disponibili per il melone);</p> <p><b>Interventi chimici:</b> - intervenire alla comparsa dei primi sintomi ripetendo i trattamenti in base alla persistenza del principio attivo e al periodo di carenza dello stesso e considerando, anche, la raccolta scalare del prodotto .</p>	<p><i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Meptyldinocap(2) Fenbuconazolo (3) Penconazolo (3) Triadimenol°(3) Miclobutanil (3) Bupirimate Tetraconazolo (3) Propiconazolo° (3) Tebuconazolo (3) Quinoxifen Azoxystrobin (1) Trifloxystrobin (1) Cyflufenamid (4)</p>	<p>Non ammessi più di 3 interventi con prodotti di sintesi sul melone. Su cocomero è ammesso al massimo 1 intervento all'anno. ° Non ammesso su cocomero. (1) Con QOI (Azoxystrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone e Famoxadone) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Non ammesse formulazioni Xn. (4) Al massimo 2 interventi l'anno.</p>

<p><b>Cancro gommoso</b> <i>Didymella bryoniae</i></p>	<p>La malattia colpisce soprattutto il melone.</p> <p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare ampie rotazioni;</li> <li>- impiegare piante sane o seme conciato con benzimidazolici;</li> <li>- evitare di procurare lesioni alle piante;</li> <li>- evitare le irrigazioni a pioggia;</li> <li>- eliminare i residui colturali infetti.</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire ai primi sintomi.</li> </ul>	<p>Idrossido di rame Ossicloruro di rame Poltiglia bordolese</p> <p>Azoxystrobin (1)</p>	<p><b>(1) Con QOI (Azoxystrobin, Trifloxistrobin, Fenamidone e Famoxadone) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Malattie vascolari</b> <i>Fusarium oxysporum</i> <i>Verticillium dahliae</i> <i>Verticillium albo-atrum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei terreni infetti adottare rotazioni molto ampie;</li> <li>- evitare di procurare lesioni al colletto o alle radici delle piante;</li> <li>- impiegare varietà resistenti o tolleranti;</li> <li>- impiegare piante innestate su specie resistenti (per il melone);</li> <li>- eliminare prontamente le piante malate;</li> <li>- evitare irrigazioni per scorrimento.</li> </ul>	<p><i>Trichoderma harzianum</i> (1)</p>	<p><b>(1) Non ammesso su cocomero.</b></p>
<p><b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare ristagni idrici e non eccedere nelle irrigazioni;</li> <li>- evitare di procurare lesioni alle piante;</li> <li>- eliminare prontamente le piante malate.</li> </ul>	<p><i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i></p>	
<p><b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impiegare seme sano;</li> <li>- impiegare varietà tolleranti e/o resistenti;</li> <li>- adottare ampie rotazioni colturali;</li> <li>- eliminare la vegetazione infetta, senza interrirla;</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire in presenza di sintomi.</li> </ul>	<p>Prodotti rameici</p>	

<b>Virosi</b> <i>CMV, WMV-1, WMV-2, ZYMV</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare piante sane e varietà resistenti o tolleranti; - eliminare le piante infestanti, potenziali focolai di infezione; - impiegare nella pacciamatura film plastici afidi-repellenti; - eliminare le piante ammalate; - realizzare un controllo tempestivo nei confronti dei vettori (afidi).		
---	---	--	--

Fitofagi	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Afidi</b> <i>Aphis gossypii</i>	Ricorrere a lanci di predatori all'inizio delle infestazioni.  <b>Interventi chimici:</b> - <b>intervenire con infestazione consistente e diffusa sul 30% delle piante.</b>	Azadiractina Imidacloprid (1) Thiamethoxam (1) Acetamiprid (1) Etofenprox <sup>oo</sup> (2) Flonicamid (3) Fluvalinate <sup>oo</sup> (2) Deltametrina (2) Spirotetramat (3)	(1) <b>Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (2) <b>Tra Piretroidi e Etofenprox al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> (3) <b>Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <sup>oo</sup> <b>Amnesso solo su melone.</b> (3) <b>Al massimo 2 interventi all'anno.</b>
<b>Coccinella del melone</b> <i>Epilachna chrysomelina</i>	<b>Interventi chimici:</b> i trattamenti effettuati contro gli afidi permettono di contenere anche questa avversità.		
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare concimi con azione repellente (calcicocianammide). <b>Interventi chimici</b> <b>soglia: 5 larve/m<sup>2</sup>.</b>	Teflutrin Zeta-cipermetrina(2) Thiamethoxam (1)	<b>La geodisinfestazione deve essere localizzata.</b> <b>Al massimo 1 intervento l'anno nei confronti dell'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b> (1) <b>Applicazione pre-trapianto tramite immersione dei vassoi e per irrigazione sovrachioma.</b> (2) <b>Non ammesso su cocomero.</b>

<p><b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i></p>	<p>Lancio tempestivo di ausiliari sui primi focolai di infestazione, in rapporto di 4-5 a 1; in presenza di infestazione più ampia impiegare 8-10 predatori/mq.</p> <p><b>Interventi chimici:</b> - intervenire tempestivamente in presenza dei primi focolai.</p>	<p><i>Phytoseiulus persimilis</i> (1) <i>Amblyseius californicus</i> <i>Beauveria bassiana</i> Fenazaquin(2)(3) Abamectina (2) Tebufenpyrad Exitiazox Clofentezine (4) Etoxazole</p>	<p><b>Sono ammessi al massimo 2 interventi con acaricidi.</b> <b>(1) Nel caso di trattamenti acaricidi con Fluvalinate, evitare i lanci per 2-4 settimane.</b> <b>(2) Al massimo un trattamento all'anno; prodotti in alternativa tra loro.</b> <b>(3) Impiegabile fino al 30/11/2012.</b> <b>(4) Impiegabile solo su melone.</b></p>
---	--	--	---

## **MELONE - COCOMERO**

### **Controllo infestanti**

**Non è ammesso alcun diserbo chimico.**

## PATATA

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> <i>Phytophthora infestans</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di tuberi-seme sani; - scelta di varietà poco suscettibili; - eliminazione delle piante nate da tuberi rimasti nel terreno nelle annate precedenti; - ampie rotazioni; - concimazione equilibrata; - evitare le elevate densità di semina. <b>Interventi chimici:</b> da effettuarsi nelle annate umide, in particolare, negli impianti di 2° raccolto e su varietà sensibili.	prodotti rameici ditianon^ benalaxil^ benalaxil M^ metalaxil^ metalaxil-M^ fosetil-Al <sup>o</sup> ^ fluazinam^ cimoxanil*^ dimetomorph*^(1) iprovalicarb^(1) mandipropamide^(1) zoxamide^ (fluopicolide + propamocarb)^ propamocarb(2) (piraclostrobin+ dimetomorf)(1)(3) cyazofamide (4) famoxadone (3) ametoctradina (5)	* Da utilizzare preferibilmente in miscela. ^ Ammessi al massimo 2 interventi all'anno. ° Impiegabile solo in miscela con rame. (1) Con CAA (Dimetomorph, Iprovalicarb e Mandipropamide) al massimo 3 interventi l'anno. (2) Al massimo 3 interventi l'anno. (3) Con QoI (Piraclostrobin, Famoxadone) al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 3 interventi all'anno. (5) Al massimo 3 interventi all'anno.
<b>Alternariosi</b> <i>Alternaria solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> ampie rotazioni, impiego di tuberi sani. <b>Interventi chimici:</b> <b>intervenire solo in caso di infezioni su giovani piante.</b> Successivamente la malattia è indirettamente controllata dai trattamenti antiperonosporici.	prodotti rameici  (piraclostrobin+ dimetomorf)(1)(2)	(1) Con CAA (Dimetomorph, Iprovalicarb e Mandipropamide) al massimo 3 interventi l'anno. (2) Con QoI (Piraclostrobin, Famoxadone) al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Rizottoniosi</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> impiego di tuberi-seme sani, ampie rotazioni, ricorso al pre-germogliamento e a semine poco profonde per accelerare lo sviluppo della pianta nelle prime fasi di sviluppo.	Tolclofos-metile (1) Pencicuron (1)	(1) Ammesso solo per la concia dei tuberi-seme.
<b>Marciume secco</b> <i>Fusarium solani</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare di lesionare i tuberi durante la raccolta; - mantenere i locali di conservazione freschi e areati; - non destinare alla moltiplicazione i tuberi infetti.		

<b>Cancrena secca</b> <i>Phoma exigua</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare le lesioni al tubero; - distruggere tempestivamente i residui contaminati ; - porre i tuberi-seme appena raccolti per due settimane in ambienti caldi (18-20°C) al fine di favorire la cicatrizzazione delle ferite; - nelle zone ad alto rischio è buona norma ricorrere a varietà poco suscettibili;		
<b>Scabbia</b> <i>Helminthosporium solani,</i> <i>Spongospora subterranea,</i> <i>Streptomyces scabies</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiego di tuberi sani; - raccolta dei tuberi appena giunti a maturazione; - conservazione in locali freschi e asciutti; - ampie rotazioni; - mantenimento di un tasso di umidità regolare nel suolo.		
<b>VIROSI</b> <i>PVX, PVY, PLRV</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - uso di tuberi-seme qualificati sanitariamente (seme certificato con basso livello di infezione virale) - nella coltura per consumo fresco, con favorevoli condizioni di diffusione virale tramite afidi, rinnovare annualmente il seme da utilizzare; - anticipare o ritardare la semina per sfasare il ciclo colturale rispetto al momento di massima presenza degli afidi vettori; - eliminazione delle piante originate da tuberi residui di colture precedenti; - eliminazione delle piante spontanee; - rotazioni colturali		

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - evitare le irrigazioni tardive in prossimità della raccolta per evitare la risalita degli elateridi; <b>Interventi chimici</b> <b>Soglia:</b> accertata presenza di larve, nel terreno o sulla coltura precedente, mediante specifici monitoraggi (vasi-trappola). <b>Soglia alla rincalzatura:</b> accertata presenza di fori sui tuberi-seme.	Teflutrin^	^Impiegabile alla semina e alla rincalzatura.

<p><b>Tignola</b> <i>Phthorimaea operculella</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b> - impiego di tuberi esenti da infestazione</p> <p><b>Interventi chimici:</b> <b>è obbligatorio l'uso delle trappole a ferormoni;</b> controllare il fusto e i tuberi affioranti e intervenire nei confronti delle prime larve.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Deltametrina (1) Spinosad (2)</p>	<p>(1) Al massimo 2 interventi l'anno a tutto campo con piretroidi, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Dorifora</b> <i>Leptinotarsa decemlineata</i></p>	<p><b>Soglia:</b> infestazione diffusa.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> (EG2424) o var. <i>Tenebrionis</i>* Azadiractina Imidacloprid(1) Thiamethoxam(1) Acetamiprid(1) Clotianidin (1) Novaluron(2) Metaflumizone(2) Spinosad(3) Clorantraniliprole (4)</p>	<p>* Da impiegare alla schiusura delle uova e contro le larve giovani. (1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi l'anno; non impiegabile nelle zone vulnerabili ai prodotti fitosanitari e in terreni con un contenuto di sabbia superiore all'80%.</p>
<p><b>Afidi</b> <i>Macrosiphum euphorbiae,</i> <i>Myzus persicae, ecc.</i></p>	<p><b>Soglia:</b> infestazione diffusa.</p>	<p>Piretro naturale Azadiractina Imidacloprid (1) Thiamethoxam (1) Acetamiprid (1) Clotianidin (1)</p>	<p>Al massimo 2 interventi all'anno con prodotti di sintesi. (1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis ipsilon, Agrotis segetum</i></p>	<p><b>Soglia:</b> presenza diffusa delle larve.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Alfacipermetrina (1) Deltametrina(1) Ciflutrin(1) Zeta-Cipermetrina(1) Cipermetrina(1)</p>	<p>(1) Al massimo 2 interventi l'anno a tutto campo con piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</p>

## PATATA

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>pre-semina</b>	graminacee e dicotiledoni	- Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1-3 + 3-5	
<b>pre-emergenza</b>	dicotiledoni e graminacee	Metribuzin 35* Pendimethalin 38,72 (Flufenacet 60 + Metribuzin 35) ** Metazaclor 43,5** Clomazone 30,74 Aclonifen 49,6 Flufenacet 60	0,4-0,6 2,5 0,85+0,5 1-2 0,3 1,5-2 0,6-0,8	<b>*non impiegare su patate primaticcie se dopo si deve coltivare spinacio; sensibili le cv. Draga, Jaerla e Vivax.</b>  <b>** utilizzare la dose più bassa nei terreni sabbiosi e sulle varietà precoci.</b>
<b>post-emergenza</b>	dicotiledoni e graminacee  graminacee	Rimsulfuron 25 * Metribuzin 35 **  Propaquizafop 9,7 Ciclossidim 10,9	0,02 - 0,04 0,2-0,4  0,8-1 1,5-2,5	<b>* intervenire precocemente sulle infestanti, anche a basse dosi e con applicazioni ripetute.</b> <b>** se ne sconsiglia la miscela con il Rimsulfuron.</b>
<b>pre-raccolta</b>		Carfentrazone 6,45 (1)(3) Pyraflufen-ethyl 2,6 (2)(3)	1 0,8	<b>(1) Al massimo 1 l/ha all'anno. Applicare il prodotto entro 10 giorni dalla raccolta.</b> <b>(2) Al massimo 1,6 l/ha/anno.</b> <b>(3) Prodotti in alternativa tra loro.</b>

## PEPERONE

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Cancrena pedale</b> <i>Phytophthora capsici</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare varietà resistenti o anche varietà suscettibili, ma innestate su portinnesti resistenti;</li> <li>- evitare l'irrigazione per scorrimento;</li> <li>- eliminare tempestivamente le piante attaccate e distruggerle, senza interrare;</li> <li>- adottare, per quanto possibile, ampi turni irrigui;</li> <li>- sospendere la coltura per 5 anni nei terreni interessati da diffusi attacchi.</li> </ul> <b>Interventi chimici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei sintomi localizzando il trattamento soprattutto alla base delle piante.</li> </ul>	<i>Trichoderma</i> spp. Prodotti rameici Metalaxil-M(1) Benalaxil(1) Propamocarb	<b>(1) Al massimo 1 intervento complessivo all'anno.</b>
<b>Botrite</b> <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzare piante sane che non presentino imbrunimenti alla base del fusto;</li> </ul> <b>Interventi chimici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei sintomi.</li> </ul>	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs <i>plantarum</i> Ciprodinil + Fludioxonil Boscalid+Piraclostrobin (1) Fenexamid	<b>Al massimo 2 interventi contro questa avversità.</b> <b>(1) Con QoI (Piraclostrobin, Azoxystrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Oidio</b> <i>Leveillula taurica</i>	<b>Interventi chimici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- intervenire alla comparsa dei primi sintomi.</li> </ul>	<i>Ampelomyces quisqualis</i> Zolfo Bupirimate* Penconazolo* Tetraconazolo* Myclobutanil* Triadimenol* Tebuconazolo* Azoxystrobin*(1) Boscalid+Piraclostrobin *(1) Cyflufenamid (2)	<b>* Ammessi al massimo 2 trattamenti complessivi. Non ammesse formulazioni Xn.</b> <b>(1) Con QoI (Piraclostrobin, Azoxystrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>

<b>Batteriosi</b> <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare piante sane; - adottare ampie rotazioni dopo attacchi diffusi, evitando la successione al pomodoro; - evitare ristagni idrici; <b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Virosi</b> <i>PVY, TSWV, ToMV, TMV, AMV, CMV,</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare piante geneticamente resistenti; - impiegare piante certificate; - estirpare e distruggere le piante infette; - adottare ampie rotazioni. <b>Interventi chimici:</b> - intervenire nei confronti dei vettori (afidi, tripidi) per ostacolare la diffusione delle infezioni.		
<b>Sclerotinie</b> <i>Sclerotinia</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni; - evitare irrigazioni per scorrimento; - asportare e bruciare le piante ammalate.	Tolclofos metile	Massimo 1 trattamento l'anno.

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, Aphis fabae, Aphis gossypii</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>soglia:</b> - presenza di individui alati e colonie diffuse.	Azadiractina Piretro naturale Pirimicarb(1) Imidacloprid(2) Thiamethoxam(2) Acetamiprid(2) Spirotetramat(3)	Al massimo 2 interventi contro questa avversità. (1) Ha ridotta efficacia contro <i>Aphis gossypii</i> . (2) Al massimo 1 intervento all'anno con neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 2 interventi all'anno.
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes</i> spp.	<b>Interventi agronomici:</b> - con infestazioni in atto effettuare lavorazioni superficiali lungo la fila. <b>Interventi chimici: soglia:</b> 2 -3 larve/m <sup>2</sup> .	Teflutrin* Zeta-cipermetrina* Thiamethoxam (1)	Al massimo 1 intervento nei confronti dell'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto. *Intervento localizzato. (1) Applicazione pre-trapianto tramite immersione dei vassoi e per irrigazione sovrachioma.

<p><b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i></p>	<p><b>Interventi chimici</b> - <b>soglia:</b> più di 1 larva per 5 m lineari di fila in 4 punti disposti lungo la diagonale dell'appezzamento.</p>	<p>Ciflutrin(1) Deltametrina(1) Zeta-Cipermetrina(1) Lambda-cialotrina(1)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Lepidotteri nottuidi</b> <i>Heliothis armigera</i>, <i>Autographa gamma</i>, <i>Mamestra brassicae</i>, <i>Spodoptera</i> spp.</p>	<p><b>Interventi chimici</b> - <b>soglia:</b> intervenire alla comparsa delle larve.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Ciflutrin(1) Deltametrina(1) Zeta-Cipermetrina(1) Lambda-cialotrina(1) Indoxacarb(2) Spinosad (3) Emamectina (4) Clorraniliprole (5)</p>	<p>(1) Al massimo 1 intervento l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 4 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità, 3 in caso di presenza di <i>Tuta absoluta</i>. Impiegabile solo contro <i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera</i> spp. (5) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i></p>	<p>Installare le trappole a feromone entro metà maggio; intervenire sulla prima generazione subito dopo l'innalzamento del numero delle catture (orientativamente a metà giugno); sulla seconda generazione effettuare trattamenti cautelativi alla ripresa delle catture (metà luglio) tenendo protetti i frutti.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>Kurstaki</i> Indoxacarb(1) Etofenprox(2) Deltametrina(2) Zeta-Cipermetrina(2) Ciflutrin(2) Lambda-cialotrina(2) Acetamiprid (3) (Imidacloprid + Cyflutrin) (2)(3) Spinosad (4) Emamectina (5) Clorraniliprole (6)</p>	<p>(1) Al massimo 4 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Ammesso un solo trattamento all'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità. (3) Ammesso un solo intervento all'anno con neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità, 3 in caso di presenza di <i>Tuta absoluta</i>. (6) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>

<b>Tripidi</b> <i>Thrips tabaci,</i> <i>Frankliniella occidentalis</i>	<b>Interventi agronomici</b> A fine coltura distruggere i residui colturali infestati. <b>Interventi chimici</b> - <b>soglia:</b> intervenire alla comparsa delle neanidi.	<i>Beauveria bassiana</i> Azadiractina Piretro naturale Spinosad* Acetamiprid^ Acrinatrina**	*Amnesso 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità. ^ Amnesso un solo intervento all'anno con neonicotinoidi, indipendentemente dall'avversità. **Amnesso un trattamento all'anno.
<b>Acari</b> <i>Tetranychus urticae,</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>soglia:</b> intervenire all'inizio dell' infestazione.	<i>Beauveria bassiana</i> <i>Amblyseius californicus</i> Exitiazox Fenpyroximate Fenazaquin (1) Tebufenpirad Abamectina Bifenazate	Amnesso un solo trattamento acaricida all'anno. (1) Impiegabile fino al 30/11/2012.
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Misure agronomiche:</b> - ampie rotazioni soprattutto nei terreni sabbiosi; - impiego di ibridi resistenti.		Non è amnesso l'impiego di mezzi chimici ad azione nematocida
<b>Tignola del pomodoro</b> <i>Tuta absoluta</i>	<b>Interventi chimici</b> <b>Soglia: presenza</b>	<i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i> Azadiractina Spinosad (1) Indoxacarb (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 4 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.

## PEPERONE

### Controllo infestanti

Si ritiene opportuno adottare tecniche di diserbo chimico integrate con quelle di carattere agronomico (sarchiatura, avvicendamento )

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e monocotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico  Oxadiazon 34,86 Pendimetalin 38,72	1,5-3 + 3-5  1,5 2	
<b>Post-trapianto</b>	Monocotiledoni  Dicotiledoni e monocotiledoni	Ciclossidim 10,9  Clomazone 30,74*	1,5-2,5  0,4 -0,6	<b>*Impiego localizzato sulla fila; infestanti in pre-emergenza e fino a due foglie vere; la dose più alta in presenza di dicotiledoni.</b>

## ASPARAGO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri di intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note
<b>Ruggine</b> <i>(Puccinia asparagi)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare varietà resistenti o tolleranti</li> <li>- raccogliere e distruggere la vegetazione colpita</li> <li>- in autunno distruggere la parte aerea dell'asparagiaia</li> </ul> <b>Interventi chimici:</b> intervenire soprattutto nei giovani impianti e comunque 20-30 giorni dopo la fine della raccolta fino all'inizio di settembre	Prodotti rameici  Ciproconazolo(1)(2) Difenconazolo(1) (2) Tebuconazolo(1) (2) Azoxistrobin(3) Boscalid+Piraclostrobin(3)	<b>(1) Non ammesse formulazioni Xn.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno con IBE indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Stemfiliosi</b> <i>(Stemphylium vesicarium)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adottare ampi sestri d'impianto per ridurre i ristagni di umidità</li> <li>- in autunno distruggere la parte aerea dell'asparagiaia</li> </ul> <b>Interventi chimici:</b> intervenire solo in presenza della malattia	Difenconazolo(1)(2) Tebuconazolo(1)(2) Azoxistrobin (3) Boscalid+Piraclostrobin (3)	<b>(1) Non ammesse formulazioni Xn.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno con IBE indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Fusariosi</b> <i>(Fusarium spp.)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare ampie rotazioni</li> <li>- impiegare materiale di moltiplicazione sano</li> <li>- evitare ristagni idrici</li> <li>- distruggere le piante malate</li> </ul>		
<b>Mal vinato</b> <i>(Rhizoctonia violacea)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attuare ampie rotazioni</li> <li>- impiegare varietà non suscettibili e materiale di moltiplicazione sano</li> <li>- evitare ristagni idrici</li> <li>- distruggere le piante malate</li> </ul>		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri di intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mosca grigia dei semi</b> ( <i>Delia platura</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> raccogliere e distruggere i turioni infestati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire 20 giorni prima della presumibile data di emergenza dei primi turioni	Teflutrin(1) Deltametrina(2)	(1) Ammesso un solo trattamento con distribuzione microgranulare localizzata lungo le file. (2) Al massimo 1 intervento l'anno.
<b>Minatrice dei fusti</b> ( <i>Ophiomyia simplex</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> bruciare i residui colturali infestati		
<b>Criocere</b> ( <i>Crioceris spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> <b>soglia:</b> elevata presenza di larve o adulti	Spinosad	Al massimo 3 interventi contro questa avversità.
<b>Afide</b> ( <i>Brachycorynella asparagi</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> bruciare i residui colturali infestati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire, in maniera localizzata o a pieno campo, alla comparsa delle infestazioni	Piretrine naturali	
<b>Virosi</b> (AV 1, AV 2)	Impiegare materiale di propagazione sano ottenuto da micropropagazione in vitro da piante virus-esenti		

## ASPARAGO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-trapianto</b> <b>Pre-ricaccio</b> <b>Post-raccolta</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate 30,4	1,5-3	
<b>Pre-ricaccio</b>	Dicotiledoni e Graminacee  Dicotiledoni	Metribuzin 35 Pendimetalin 38,72 Oxadiazon 34,86  Dicamba 21,2	0,4-0,7 2,5 1,5  0,2-0,5	
<b>Post-raccolta</b>	Dicotiledoni (in particolare Convolvolo)  Graminacee	Oxadiazon 34,86  Dicamba 21,2  Ciclossidim 10,9 Propaquizafop 9,7	1,5  0,2-0,5  1,5-2,5 1	

**PORRO**  
**Difesa fitosanitaria**

Crittogame ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note ☐
<p><b>Peronospora</b>  <i>(Peronospora schleideni, Phytophthora porri)</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare eccessive concimazioni azotate</li> <li>- razionalizzare la pratica irrigua evitando gli eccessi idrici</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b>            intervenire in presenza di condizioni climatiche favorevoli (piogge persistenti, umidità relativa alta, temperature non elevate)</p>	<p>Prodotti rameici</p> <p>Azoxystrobin*(1)            Cimoxanil*            Propamocarb*</p>	<p><b>*Al massimo 3 interventi complessivi all'anno indipendentemente dall'avversità; prodotti in alternativa tra loro.</b></p> <p><b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Ruggine</b>  <i>(Puccinia porri)</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare di impiegare varietà tardive</li> <li>- attuare ampie rotazioni</li> <li>- eliminare e distruggere i residui colturali infetti</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b>            intervenire alla comparsa delle prime pustole</p>	<p>Prodotti rameici</p> <p>Azoxystrobin(1)</p>	<p><b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b></p>
<p><b>Botrite</b>  <i>(Botrytis squamosa, B.allii)</i></p>	<p><b>Interventi agronomici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evitare eccessive concimazioni azotate</li> <li>- razionalizzare la pratica irrigua evitando gli eccessi idrici</li> </ul> <p><b>Interventi chimici:</b>            intervenire in presenza di condizioni climatiche favorevoli e alla comparsa dei primi sintomi</p>	<p>Prodotti rameici</p>	

<b>Fitofagi</b> □	<b>Criteria d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Mosche dei bulbi</b> ( <i>Delia antiqua</i> , <i>D.platura</i> )	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo dopo aver accertato la presenza dell'infestazione	Deltametrina*(1) Azadiractina Piretrine naturali	*Al massimo un intervento l'anno. <b>(1) Al massimo 2 interventi all'anno con piretroidi indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> soglia: 15-20 individui/pianta	Deltametrina* Lambda-cialotrina* Azadiractina Spinosad**	*Al massimo 2 interventi all'anno con piretroidi indipendentemente dall'avversità. **Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.
<b>Nematodi</b> ( <i>Dytilenchus dipsaci</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> impiegare piantine esenti dal nematode		
<b>Elateridi</b> ( <i>Agriotes spp.</i> )			
<b>Nottue terricole</b> ( <i>Agrotis spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> ammessi solo in caso di infestazioni diffuse	Deltametrina* Lambda-cialotrina* Spinosad**	* Al massimo 2 interventi all'anno con piretroidi indipendentemente dall'avversità. **Al massimo 3 interventi l'anno indipendentemente dall'avversità.

## **PORRO**

### **Controllo delle infestanti**

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate (30,4)	1,5-3	
<b>Pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Clorprofam (40,8)	4-6	
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni e Graminacee	Clorprofam (40,8)	4-6	
	Graminacee	Ciclossidim (10,9)	1,5-2,5	

## SEDANO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Septoria</b> <i>Septoria apiicola</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - utilizzare varietà tolleranti; - eliminare la vegetazione infetta. <b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi, e ripetere le applicazioni con turni di 7-10 giorni.	prodotti rameici difenoconazolo (1)  azoxystrobin (2)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - limitare gli apporti azotati; - evitare elevate densità d'impianto.		
<b>Cercosporiosi</b> <i>Cercospora apii</i>	<b>Interventi chimici:</b> - alla comparsa dei sintomi.	prodotti rameici azoxystrobin(1)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare varietà tolleranti. <b>Interventi chimici:</b> - alla comparsa dei sintomi.	zolfo difenoconazolo (1)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas marginalis</i> <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - concimazioni azotate equilibrate; - evitare di provocare lesioni alle piante; - eliminazione della vegetazione infetta che non va interrata, - evitare di irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti.	prodotti rameici	

<b>VIROSI</b> CMV (virus del mosaico del cetriolo) CeMV (virus del mosaico del sedano)	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale di propagazione sano e certificato; - distruggere le piante infette; - eliminare le infestanti dai bordi degli appezzamenti - controllare gli insetti vettori (afidi, tripidi, mosche minatrici).		
--	---	--	--

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mosche minatrici</b> <i>Liriomyza trifolii</i> <i>Liriomyza huidobrensis</i>	<b>Interventi agronomici:</b> allontanare e distruggere i resti della vegetazione dopo la raccolta. <b>Interventi chimici:</b> in presenza di mine o punture.	azadiractina abamectina(1)	<b>Al massimo 2 interventi contro l'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Mosca del sedano</b> <i>Philophylla heraclei</i>	<b>Interventi chimici:</b> in caso di forti infestazioni sulle giovani piantine trapiantate.	deltametrina	<b>Al massimo 1 intervento contro l'avversità.</b>
<b>Afidi</b> <i>Disaphis spp., Myzus persicae, Cavariella aegopodi</i>	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei parassiti.	pirimicarb deltametrina lambda-cialotrina	<b>Al massimo 1 intervento contro l'avversità.</b>
<b>Tripidi</b> <i>Frankliniella spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione	spinosad (1) abamectina (2)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi chimici:</b> in presenza di infestazioni diffuse.	abamectina	<b>Al massimo 1 intervento contro l'avversità.</b>

## SEDANO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>- Preparazione del letto d'impianto</b> <b>-Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	glifosate 30,4	1,5 - 3	<b>Applicare le dosi maggiori con malerbe molto sviluppate.</b>
<b>pre-trapianto</b>	dicotiledoni e graminacee	pendimetalin 31,7	2,5-3	
<b>post-trapianto</b>	graminacee	fluazifop-p-butile 13,4	1 – 1,125	
	dicotiledoni e graminacee	linuron 37,6	0,5-1	

## SPINACIO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora farinosa</i> )	<b>Intrventi agronomici:</b> - raccogliere e distruggere le piante infette - impiegare seme sano e varietà resistenti  <b>Interventi chimici:</b> intervenire con andamento climatico umido o all'osservazione dei sintomi.	Prodotti rameici Propamocarb Cimoxanil Ditianon Metalaxil-M* Fosetil-AI	<b>Ammessi al massimo 3 interventi contro l'avversità.</b> <b>* Al massimo 2 interventi l'anno con fenilammidi.</b>
<b>Antracnosi</b> ( <i>Colletotricum dematium</i> ) <b>Cercosporiosi</b> ( <i>Cercospora beticola</i> )	<b>Interventi chimici:</b> intervenire con andamento climatico umido o all'osservazione dei sintomi	Prodotti rameici	
<b>Botrite</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei primi sintomi	Piraclostrobin+Boscalid (1)	<b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Oidio</b>	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei primi sintomi	Zolfo	

<b>Fitofagi</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Afidi</b> ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis fabae</i> )	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus.  <b>Interventi chimici:</b> Intervenire in presenza dei parassiti.  Eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale per impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus.	Azadiractina Piretrine naturali  Deltametrina(1) Lambda-cialotrina(1)	<b>(1)Al massimo 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b>

<p><b>Nottue</b> (<i>Agrotis</i> spp., <i>Mamestra</i> spp., <i>Autographa gamma</i> <i>Spodoptera littoralis</i>, ecc.)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza di focolai, solo su coltura da industria.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Piretrine naturali</p> <p>Deltametrina(1) Lambda-cialotrina(1) (2) Etofenprox(1) Indoxacarb(3) Spinosad (4)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità. (2) Ammesso solo nei confronti delle nottue fogliari. (3) Al massimo 1 intervento l'anno; non ammesso su <i>Heliothis</i>. (4) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità; ammesso solo su <i>Spodoptera</i> e <i>Heliothis</i>.</p>
<p><b>Mosca</b> (<i>Pegomya betae</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire all'osservazione di uova sul 5% delle piantine. Fitofago particolarmente temibile in autunno in presenza di temperature elevate.</p>	<p>Deltametrina(1)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Cleono</b> (<i>Temnorrhinus mendicus</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione.</p>	<p>Deltametrina(1)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Mosca minatrice</b> (<i>Liriomyza</i> spp.)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione.</p>	<p>Spinosad(1)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>
<p><b>Tripidi</b> (<i>Thrips tabaci</i>, <i>Frankliniella occidentalis</i>)</p>	<p><b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione.</p>	<p>Spinosad(1)</p>	<p>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</p>

## SPINACIO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b> □	<b>Principi attivi (%)</b> □	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate 30,4	1,5 – 3	
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Lenacil 80 S-Metolachlor 86,5 (1) Cloridazon 25 + Metamitron 37 (2) Metamitron 50	0,4-0,8 0,5 2,5-3 2-3	<b>(1) Impiegare nel periodo compreso tra febbraio e agosto.</b> <b>(2) Nello stesso appezzamento al massimo 1 volta ogni 3 anni.</b>
<b>Post-emergenza</b>	Dicotiledoni	Fenmedifam 15,9 Fenmedifam + Lenacil (15,9 +80)	1-2,5 1-2 + 0,3-0,5	
	Graminacee	Ciclossidim 10,9 Propaquizofop 9,7 Quizalofop-etile-isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1,5-2,5 1 1 – 1,5 1-1,5	

**ZUCCHINO**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Peronospora</b> ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare le piante infette; - limitare le irrigazioni.	prodotti rameici cyazofamid (1) cimoxanil (2) propamocarb (3) azoxistrobin (4) mandipropamide (5)(7) famoxadone (4) (ametotradina + dimetomorf) (6)(7) (pyraclostrobin + dimetomorf) (4)(7)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Al massimo 1 intervento l'anno. (4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Tra Azoxistrobin, Trifloxistrobin, Famoxadone e Pyraclostrobin, al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi l'anno. (6) Al massimo 2 interventi l'anno. (7) Tra mandipropamide e dimetomorf al massimo 3 interventi l'anno.
<b>Mal bianco</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi e ripetere i trattamenti in relazione alla persistenza del principio attivo utilizzato e dell'andamento stagionale.	zolfo meptyldinocap(1) bupirimate(2) bitertanololo (3) miclobutanil (3) triadimenol (3) penconazolo (3) tetraconazolo (3) fenbuconazolo (3) tebuconazolo(3) trifloxystrobin (4) azoxystrobin (4) cyflufenamid (5) quinoxifen (6)	(1)Al massimo 2 trattamenti l'anno. (2)Al massimo 2 trattamenti l'anno. (3) I prodotti IBE sono ammessi per massimo 2 trattamenti all'anno. Non ammesse formulazioni Xn. (4) Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. Tra Azoxistrobin, Trifloxistrobin e Famoxadone, al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi l'anno. (6) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Muffa grigia</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - limitare le irrigazioni; - eliminare le piante infette; - evitare lesioni alle piante. <b>Interventi chimici:</b> alla comparsa dei sintomi.	ciprodinil + fludioxonil fenexamid	

<b>Sclerotinia</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - limitare le irrigazioni; - eliminare le piante infette; - evitare lesioni alle piante.	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i>	
<b>Cladosporiosi</b> ( <i>Cladosporium cucumerinum</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - eliminare le piante infette; - limitare le irrigazioni.	prodotti rameici	
<b>BATTERIOSI</b> ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>lachrymans</i> , <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni colturali; - concimazioni azotate e potassiche equilibrate; - eliminazione della vegetazione infetta che non va interrata, - evitare di irrigare con acque provenienti da canali o bacini di raccolta i cui fondali non vengano periodicamente ripuliti.	prodotti rameici	
<b>VIROSI</b> CMV (virus del mosaico del cetriolo) ZXMV (virus del mosaico giallo dello zucchini) WMV-2 (virus del nanismo giallo del melone)	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare materiale di propagazione sano e certificato; - distruggere le piante infette; - eliminare le infestanti dai bordi degli appezzamenti; - controllare gli insetti vettori (afidi, tripidi).		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> ( <i>Aphis gossypii</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> si consiglia di pacciamare il terreno con film di tessuto -non tessuto o di plastica bianca riflettente al fine di allontanare gli afidi dalla coltura. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza di colonie in accrescimento effettuando il trattamento in modo localizzato o a pieno campo in funzione della distribuzione dell'attacco afidico.	<i>Chrysoperla carnea</i> <i>Beauveria bassiana</i> Azadiractina Lambda-cialotrina (1) Deltametrina (1) Thiamethoxam (2) Imidacloprid (2) Acetamiprid (2) Flonicamid (3) Spirotetramat (4)	(1) Piretroidi: al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 2 interventi l'anno. (4) Al massimo 2 interventi all'anno.

<b>Tripidi</b> <i>(Frankliniella occidentalis)</i>	<b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione.	Azadiractina Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</b>
<b>Ragnetto rosso</b> <i>(Tetranychus urticae)</i>	<b>Interventi chimici:</b> in presenza di focolai di infestazione e di foglie decolorate.	Fenazaquin (1) Exitiazox Bifenazate	<b>Ammessi 2 interventi l'anno nei confronti dell'avversità.</b> <b>(1) Impiegabile fino al 30/11/2012.</b>

## ZUCCHINO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi(l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Preparazione del letto d'impianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4	1,5 - 3	<b>Applicare le dosi maggiori con malerbe molto sviluppate.</b>
<b>Pre-emergenza Pre-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Clomazone 30,74	0,3 – 0,5	
<b>Post-emergenza</b>	Graminacee	Quizalofop-etile-isomero D 4,93 Quizalofop-p-etile 5	1 – 1,5 1-1,5	
<b>Post-trapianto</b>	Dicotiledoni e graminacee	Clomazone 30,74	0,4	<b>Impiego localizzato sulla fila; infestanti in pre-emergenza e fino a due foglie vere; la dose più alta in presenza di dicotiledoni.</b>

## INSALATE: Lattuga, Scarola, Cicoria, Indivia, Radicchio

### LATTUGA

#### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi e ausiliari	Limitazioni d'uso e note ☐
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di andamento climatico umido o all'osservazione dei primi sintomi.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Prodotti rameici Propamocarb Cimoxanil (1) Fosetil – Al Benalaxil (2) Metalaxil (2) Metalaxil-M (2) (Propamocarb+Fosetil)(5) Iprovalicarb (3) Mandipropamide (3) Fenamidone (4) Azoxystrobin (4) (Piraclostrobin+Dimetomorf )(3)(4) (Fenamidone+Fosetil Al)(4) (Ametoctradina + Dimetomorf) (6)(3)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 1 intervento l'anno. (3) Con CAA (Dimetomorf, Iprovalicarb, Mandipropamide) al massimo 1 intervento l'anno. (4) Con QoI (Azoxystrobin, Fenamidone e Piraclostrobin) al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (5) Al massimo 2 interventi all'anno. (6) Al massimo 1 intervento l'anno.
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - asportare e distruggere i cespi ammalati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	<i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> (1) Ciprodinil+Fludioxonil Pirimetanil (2) Tolclofos-metile(1)(3) Boscalid+Piraclostrobin(4) Fenexamid	Al massimo 3 interventi contro l'avversità. (1) Autorizzato solo contro <i>Sclerotinia</i> . (2) Autorizzato solo contro <i>Botrytis</i> . (3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Con QoI (Azoxystrobin, Fenamidone e Piraclostrobin) al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Marciume del colletto</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire alla semina o al trapianto.	Tolclofos metile (1)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin(1)	(1) Con QoI (Azoxystrobin, Fenamidone e Piraclostrobin) al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.

<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Fitofagi</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon spp.</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> , ecc.	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus. <b>Interventi agronomici:</b> eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale per impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	Alfacipermetrina * Deltametrina * Ciflutrin * Fluvalinate * Zeta-cipermetrina* Lambda-cialotrina* Thiamethoxam (1) Acetamiprid (1) Imidacloprid (1)	<b>Ammessi al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b>  <b>* Piretroidi ammessi per non più di 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità combattuta.</b>  <b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b>
<b>Nottue fogliari</b> <i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , ecc.	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.  I piretroidi possono essere impiegati nella preparazione di esche allo 0,5%, con crusca inumidita e melasso, da localizzare lungo le file nelle ore serali.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Ciflutrin * Deltametrina * Zeta-cipermetrina* Alfacipermetrina* Lambda-cialotrina* Indoxacarb Spinosad (1) Metaflumizone (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	<b>Ammessi al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> <b>* Piretroidi ammessi per non più di 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità combattuta.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Spodoptera</i> spp.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi all'anno.</b>
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	Alfacipermetrina(1) Ciflutrin(1) Deltametrina (1) Zeta-cipermetrina(1)	<b>(1)Piretroidi ammessi per non più di 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità combattuta.</b>
<b>Elateridi</b> <i>Agriotes spp.</i>	Effettuare la geodisinfestazione localizzata al superamento della <b>soglia di 3 larve/m<sup>2</sup></b> , accertato con specifici monitoraggi.	Teflutrin* Zeta-cipermetrina*	<b>Al massimo 1 intervento nei confronti dell'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b> <b>*Intervento localizzato.</b>
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i> , ecc.	Interventi alle prime osservazioni, eventualmente sui bordi degli appezzamenti o solo nelle zone interessate dall'infestazione.	Metaldeide esca Ortofossato di ferro esca	

<b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.	Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3) Lambda-cialotrina (1)	<b>(1) Piretroidi ammessi per non più di 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 1 intervento.</b>
<b>Afidi</b> <b>Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	<b>(1) Da effettuarsi prima del trapianto.</b>
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni, impiegare varietà resistenti, ricorrere alla solarizzazione.	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	

**SCAROLA**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Peronospora</b> ( <i>Bremia lactucae</i> )	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di andamento climatico umido o all'osservazione dei primi sintomi.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Prodotti rameici Metalaxil-M (1) Iprovalicarb (2)(5) Azoxystrobin (3) Mandipropamide (4)(5) (Propamocarb+Fosetil)(6)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 1 intervento l'anno. (3) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi l'anno. (5) Tra Iprovalicarb, Mandipropamide e Dimetomorf al massimo 2 interventi l'anno. (6) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Marciume basale</b> ( <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - asportare e distruggere i cespi ammalati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> (1) Boscalid+Piraclostrobin (2) Ciprodinil + Fludioxonil Fenexamid	Al massimo 3 interventi contro l'avversità. (1) Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> . (2) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	Intervenire all'osservazione dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin (1)	(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme sano o conciato - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare varietà poco suscettibili <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Batteriosi</b> ( <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	

Fitofagi ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note ☐
<b>Afidi</b> <i>(Myzus persicae, Uroleucon sonchi, Acyrthosiphon lactucae, ecc.)</i>	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus. <b>Interventi agronomici:</b> eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale per impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	Azadiractina Deltametrina * Lambda-cialotrina* Zeta-cipermetrina* Imidacloprid (1) Thiametoxam (1) Acetamiprid (1) (Imidacloprid+Ciflutrin)*(1)	<b>Al massimo 3 interventi con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> <b>* Piretroidi: al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b>
<b>Nottue fogliari</b> <i>(Heliothis armigera, Autographa gamma, Spodoptera spp., ecc.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Deltametrina * Lambda-cialotrina* Spinosad (1) Indoxacarb(2) Etofenprox^ Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	<b>Al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> <b>* Piretroidi: al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità.</b> <b>^Ammesso al massimo un trattamento all'anno.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro Spodoptera spp.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Nottue terricole</b> <i>(Agrotis spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>soglia:</b> presenza.	Deltametrina (1)	<b>(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afidi Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	<b>(1) Da effettuarsi prima del trapianto.</b>
<b>Lumache e limacce</b> <i>(Helix spp., Limax spp., ecc.)</i>	Interventi alle prime osservazioni, eventualmente sui bordi degli appezzamenti o solo nelle zone interessate dall'infestazione.	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro esca	
<b>Nematodi</b> <i>(Meloidogyne spp.)</i>	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni impiegare varietà resistenti ricorrere alla solarizzazione		

<p><b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i></p>	<p><b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.</p>	<p>Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3) Lambda-cialotrina (4)</p>	<p><b>(1) Al massimo 1 intervento nel numero complessivo di 2 interventi l'anno con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(4) Piretroidi: al massimo 2 interventi indipendentemente dall'avversità.</b></p>
--	--	--	--

**CICORIA**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di andamento climatico umido o all'osservazione dei primi sintomi.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Prodotti rameici (Propamocarb+Fosetil) (1) Iprovalicarb (2) Metalaxil-M (3) Azoxystrobin(4)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Al massimo 2 interventi l'anno. (4) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - asportare e distruggere i cespi ammalati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> (1) Boscalid+Piraclostrobin (2) Ciprodinil + Fludioxonil Fenexamid	Al massimo 3 interventi contro questa avversità. (1) Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> . (2) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin (1)	(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme sano o conciato - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare varietà poco suscettibili <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Septoriosi</b> <i>Septoria petroselini</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme sano - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare varietà tolleranti - allontanare residui colturali infetti <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	

<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
---	---	------------------	--

<b>Fitofagi</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> , ecc.	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus. <b>Interventi agronomici:</b> eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale per impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	Piretrine naturali Azadiractina Deltametrina * Lambda-cialotrina * Zeta-cipermetrina* Imidacloprid (1) Thiametoxam (1) Acetamiprid (1) (Imidacloprid+Ciflutrin)*(1)	<b>Ammessi al massimo 3 interventi con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> * Piretroidi e Etofenprox : al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.
<b>Nottue fogliari</b> <i>(Heliothis armigera, Autographa gamma, Spodoptera spp., ecc.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Deltametrina * Lambda-cialotrina * Indoxacarb Etofenprox* Spinosad (1) Metaflumizone (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	<b>Ammessi al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> * Piretroidi e Etofenprox: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. (3) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Spodoptera</i> spp. (4) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Nottue terricole</b> <i>(Agrotis spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> soglia: presenza.	Deltametrina (1)	(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Afidi Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	(1) Da effettuarsi prima del trapianto.
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp., Limax spp., ecc.</i>	Interventi alle prime osservazioni, eventualmente sui bordi degli appezzamenti o solo nelle zone interessate dall'infestazione.	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro esca	

<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare varietà resistenti - ricorrere alla solarizzazione		
<b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.	Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3) Lambda-cialotrina (4)	<b>(1) Al massimo 1 intervento nel numero complessivo di 2 interventi l'anno con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(4) Piretroidi e Etofenprox: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

**INDIVIA**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b> □
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di andamento climatico umido o all'osservazione dei primi sintomi.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Prodotti rameici (Propamocarb+Fosetil)(1) Iprovalicarb (2) Metalaxil-M (3) Azoxystrobin (4)	(1) Al massimo 2 nterventi l'anno. (2) Al masimo 1 intervento l'anno. (3) Al masimo 1 intervento l'anno. (4) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - asportare e distruggere i cespi ammalati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> (1) Boscalid+Piraclostrobin (2) Ciprodinil + Fludioxonil Fenexamid	Al massimo 3 interventi contro l'avversità. (1) Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> . (2) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin (1)	(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme sano o conciato - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare varietà poco suscettibili <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	

Fitofagi ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note ☐
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> , ecc.	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.  Eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale onde impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus.	Azadiractina Deltametrina * Zeta-cipermetrina* Lambda-cialotrina* Imidacloprid (1) Thiametoxam (1) Acetamiprid (1) (Imidacloprid+Ciflutrin)*(1)	<b>Ammessi al massimo 3 interventi l'anno con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b>  <b>* Piretroidi e Etofenprox: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b>
<b>Nottue fogliari</b> <i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , ecc.	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Deltametrina * Zeta-cipermetrina* Lambda-cialotrina* Etofenprox* Indoxacarb (1) Spinosad (2) Metaflumizone (3) Emamectina (4) Clorantraniliprole (5)	<b>Ammessi al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> <b>* Piretroidi e Etofenprox: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Spodoptera</i> spp.</b> <b>(5) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>soglia:</b> presenza.	Deltametrina (1)	<b>(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afidi</b> <b>Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	<b>(1) Da effettuarsi prima del trapianto.</b>
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i> , ecc.	Interventi alle prime osservazioni, eventualmente sui bordi degli appezzamenti o solo nelle zone interessate dall'infestazione.	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro esca	
<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare varietà resistenti - ricorrere alla solarizzazione		

<b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.	Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3) Lambda-cialotrina (4)	<b>(1) Al massimo 1 intervento nel numero complessivo di 2 interventi l'anno con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(4) Piretroidi e Etofenprox: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
--	--	--	---

## RADICCHIO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note ☐
<b>Peronospora</b> <i>Bremia lactucae</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in caso di andamento climatico umido o all'osservazione dei primi sintomi.	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> Prodotti rameici Iprovalicarb (1) Metalaxil-M (2) Azoxystrobin (3) Propamocarb+ Fosetil (4)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 1 intervento l'anno. (3) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Marciume basale</b> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - asportare e distruggere i cespi ammalati  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	<i>Trichoderma</i> spp. <i>Coniothyrium minitans</i> (1) <i>Bacillus subtilis</i> (1) <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sbs. <i>plantarum</i> (4) Tolclofos-metile (1)(2) Boscalid+Piraclostrobin (3) Ciprodinil + Fludioxonil Fenexamid	Al massimo 3 interventi contro l'avversità. (1) Ammesso solo contro <i>Sclerotinia</i> . (2) Al massimo 1 intervento l'anno. (3) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Non autorizzato su <i>Botrytis cinerea</i> .
<b>Marciume del colletto</b> <i>Rhizoctonia solani</i>	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei primi sintomi.	Tolclofos metile (1)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe cichoracearum</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Zolfo Azoxystrobin (1)	(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotrichum dematium</i> f.sp. <i>spinaciae</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - impiegare seme sano o conciato - adottare ampi avvicendamenti colturali - impiegare varietà poco suscettibili <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Batteriosi</b> <i>Pseudomonas cichorii</i> , <i>Erwinia carotovora</i>	<b>Interventi agronomici:</b> adottare ampie rotazioni  <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei sintomi.	Prodotti rameici	

Fitofagi ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note ☐
<b>Afidi</b> <i>Myzus persicae</i> , <i>Uroleucon sonchi</i> , <i>Acyrtosiphon lactucae</i> , ecc.	Gli afidi sono pericolosi vettori di virus. <b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.  Eliminare le piante residue alla fine del ciclo colturale onde impedire lo svernamento di individui potenziali vettori di virus.	Deltametrina * Lambda-cialotrina* Zeta-cipermetrina* Imidacloprid (1) Thiametoxam (1) Acetamiprid (1) (Imidacloprid+Ciflutrin)*(1)	<b>Ammessi al massimo 3 interventi l'anno con prodotti di sintesi contro questa avversità.</b> <b>*Piretroidi ammessi per massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità combattuta.</b> <b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.</b>
<b>Nottue fogliari</b> <i>Heliothis armigera</i> , <i>Autographa gamma</i> , <i>Spodoptera spp.</i> , ecc.	<b>Interventi chimici:</b> intervenire in presenza dei parassiti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Deltametrina * Zeta-cipermetrina* Indoxacarb Etofenprox^ Spinosad (1) Metaflumizone (2) Emamectina (3) Clorantraniliprole (4)	<b>Ammessi al massimo 3 trattamenti con prodotti di sintesi.</b> <b>* Piretroidi ammessi per massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</b> <b>^ Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi l'anno.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno; impiegabile solo contro <i>Spodoptera</i> spp.</b> <b>(4) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Nottue terricole</b> <i>Agrotis spp.</i>	<b>Interventi chimici:</b> <b>soglia:</b> presenza.	Deltametrina (1) Etofenprox (2)	<b>(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Afidi Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	<b>(1) Da effettuarsi prima del trapianto.</b>
<b>Lumache e limacce</b> <i>Helix spp.</i> , <i>Limax spp.</i> , ecc.	Interventi alle prime osservazioni, eventualmente sui bordi degli appezzamenti o solo nelle zone interessate dall'infestazione.	Metaldeide esca Ortofosfato di ferro	

<b>Nematodi</b> <i>Meloidogyne spp.</i>	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare varietà resistenti - ricorrere alla solarizzazione		
<b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.	Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3) Lambda-cialotrina (4)	<b>(1) Al massimo 1 intervento nel numero complessivo di 2 interventi l'anno con Piretroidi, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi.</b> <b>(4) Piretroidi ammessi per massimo 2 trattamenti indipendentemente dall'avversità.</b>

## LATTUGA, SCAROLA, CICORIA, INDIVIA, RADICCHIO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Preparazione del terreno.</b>	Specie annuali e perenni	Glifosate 30,4	1,5 - 3	
<b>Pre-trapianto</b>	Monocotiledoni e dicotiledoni	Oxadiazon 34,86 * Benfluralin 19,2 Pendimetalin 38,72	1-1,5 6,5 1,5-3	<b>Prodotti in alternativa tra loro.</b>  *Ammesso solo su lattuga, indivia e cicoria; su lattuga al massimo 1 l/ha.
<b>Pre e post-trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide 36	3-4	
<b>Post-trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni  Graminacee	Clorprofam 40,8  Propaquizafop 9,7 Ciclossidim 10,9 Quizalofop-p-etile 5	4-6  1 1,5-2,5 1 - 1,5	

## BASILICO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b> □	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Peronospora</b> ( <i>Peronospora</i> sp.)	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni impiegare piantine sane <b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici Metalaxil-M (1) Azoxystrobin (2) Mandipropamide (3)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno. (2) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Oidio</b> ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in funzione dell'andamento climatico o alla comparsa dei primi sintomi.	Zolfo	
<b>Rizoctonia</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare piantine sane	Tolclofos-metile	Ammessi al massimo 1 intervento l'anno nei confronti dell'avversità.
<b>Alternaria</b>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Prodotti rameici	
<b>Marciumi molli</b> ( <i>Sclerotinia</i> spp., <i>Botrytis squamosa</i> )	<b>Interventi chimici:</b> intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	<i>Trichoderma</i> spp. Piraclostrobin+Boscalid (1)	(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Nasonovia ribis-nigri</i> )	Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni.	Piretro naturale Azadiractina Imidacloprid (1) Deltametrina (2)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità
<b>Tripidi</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	Intervenire alla comparsa delle prime forme mobili	Piretro naturale Spinosad*	*Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Mosca</b> ( <i>Liriomyza</i> spp.)	Intervenire alla comparsa delle prime mine o dei primi punti di suzione.	Spinosad (1)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.

<p><b>Nottue fogliari</b>  <i>(Spodoptera littoralis,</i>  <i>Autographa gamma)</i></p>	<p>Il trattamento va posizionato nei confronti delle larve nei primi stadi di sviluppo.</p>	<p><i>Bacillus thuringiensis</i>  Etofenprox (1)  Spinosad (2)  Deltametrina (3)  Clorantraniliprole+Lambda-cialotrina (4)</p>	<p><b>(1) Al massimo un trattamento all'anno.</b>  <b>(2) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>  <b>(3) Al massimo 1 intervento all'anno, indipendentemente dall'avversità, e solo nei confronti della <i>Spodoptera</i>.</b>  <b>(4) Al massimo 1 intervento all'anno e solo nei confronti della <i>Spodoptera</i>.</b></p>
---	---	--	--

## BASILICO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha - anno)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b> <b>Pre-trapianto</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4	1,5-3	

**PREZZEMOLO**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b> □	<b>Criteria d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Septoriosi</b> ( <i>Septoria petroselini</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare piantine sane  <b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici  Azoxystrobin (1)	<b>(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Oidio</b> ( <i>Oidium spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo	
<b>Alternariosi</b> ( <i>Alternaria radicina</i> var. <i>petroselini</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Metalaxil-M (1)	<b>(1) Al massimo 1 intervento all'anno.</b>
<b>Botrite e Sclerotinia</b> ( <i>Botrytis spp.</i> <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>Sclerotinia minor</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Piraclostrobin+Boscalid (1) Fenexamid (2)	<b>(1) Tra Azoxystrobin e Piraclostrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 2 interventi all'anno.</b>
<b>Ruggine</b> ( <i>Puccinia petroselini</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici	
<b>Rizoctonia</b> ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare i residui delle piante infette - adottare ampie rotazioni	<i>Trichoderma asperellum</i>	

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteria d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> ( <i>Dysaphis apiifolia</i> , <i>Hyadaphis foeniculi</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni.	Piretro naturale Azadiractina Acetamiprid (1) Imidacloprid (1)	<b>(1) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento all'anno.</b>
<b>Mosca</b> ( <i>Liriomyza spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa delle prime mine o dei primi punti di suzione.	Azadiractina Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>

<b>Lepidotteri</b> ( <i>Udea ferrugalis</i> )	<b>Interventi chimici:</b> in presenza del parassita.	Azadiractina Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Tripidi</b> ( <i>Thrips spp.</i> , <i>Frankliniella occidentalis</i> )	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei parassiti.	Spinosad (1) Lambda-cialotrina (2)(3)	<b>(1) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 1 intervento all'anno. (3) Piretroidi al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Nottue fogliari</b> ( <i>Mamestra spp.</i> , <i>Spodoptera littoralis</i> , <i>Helicoverpa armigera</i> )	<b>Interventi chimici:</b> in presenza dei parassiti.	<i>Bacillus thuringiensis</i> Azadiractina Etofenprox (1) Spinosad (2) Deltametrina (3)(4) Clorantraniliprole+Lambda-cialotrina (4)(5)	<b>(1) Al massimo 1 intervento all'anno. (2) Al massimo 3 interventi all'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 1 intervento all'anno. (4) Piretroidi al massimo 2 interventi l'anno. (5) ) Al massimo 1 intervento all'anno.</b>

## PREZZEMOLO

### Controllo delle infestanti

Integrare le tecniche di diserbo chimico con quelle di carattere agronomico (sarchiature, avvicendamento)

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate 30,4	1,5 – 3	
<b>Pre-emergenza</b> <b>Post-emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni			

## RUCOLA

### Difesa fitosanitaria

Crittogame ☐	Criteri d'intervento ☐	Principi attivi e ausiliari ☐	Limitazioni d'uso e note
<b>Peronospora</b> ( <i>Phytophthora brassicae</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - adottare ampie rotazioni - impiegare piantine sane  <b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Prodotti rameici Metalaxil-M*(1) Iprovalicarb (2) Mandipropamide(2) Azoxystrobin (3) (Propamocarb+Fosetil Al)(4)	(1) Al massimo 2 interventi l'anno. (2) Con CAA (Iprovalicarb, Mandipropamide) al massimo 2 interventi l'anno. (3) Con QoI (Azoxystrobin, Piraclostrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (4) Al massimo 2 interventi l'anno.
<b>Oidio</b> ( <i>Oidium spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Zolfo Azoxystrobin (1)	(1) Con QoI (Azoxystrobin, Piraclostrobin) al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Ruggine bianca</b> ( <i>Albugo candida</i> )	Intervenire alla comparsa delle prime pustole.	Prodotti rameici	
<b>Alternaria</b> ( <i>Alternaria brassicicola</i> )	<b>Interventi agronomici:</b> - eliminare i residui delle piante infette - adottare ampie rotazioni	Prodotti rameici	
<b>Marciumi basali</b> ( <i>Pythium spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	<i>Trichoderma</i> spp. Propamocarb+Fosetil-Al(1)	(1) Impiegabile solo nei semenzai per massimo 2 interventi.
<b>Botrite e Sclerotinia</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> , <i>Sclerotinia spp.</i> )	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa dei primi sintomi	Fenexamid (1) Piraclostrobin+Boscalid (2) Ciprodinil+Fludioxonil (3) Iprodione (4)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno. (2) Al massimo 2 interventi l'anno. Tra Piraclostrobin e Azoxystrobin al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 3 interventi l'anno. (4) Al massimo 2 interventi l'anno.

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteria d'intervento</b> □	<b>Principi attivi e ausiliari</b> □	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>(Myzus persicae, Brevicoryne brassicae)</i>	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa delle prime infestazioni.	Azadiractina Deltametrina (1) Fluvalinate (1) Imidacloprid* Thiametoxam* Acetamiprid* (Imidacloprid+Ciflutrin)*(1)	* Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto. (1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Altica</b> <i>(Phyllotreta spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire nei primi stadi della coltura	Deltametrina (1) Acetamiprid (2)	(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Neonicotinoidi: al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità, con esclusione dell'eventuale intervento in pre-trapianto.
<b>Mosca minatrice</b> <i>(Liriomyza spp.)</i>	<b>Interventi chimici:</b> Intervenire alla comparsa delle prime mine o dei primi punti di suzione.	Piretrine naturali Azadiractina Abamectina (1) Spinosad (2)	Al massimo 2 interventi contro l'avversità. (1) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Afidi Elateridi</b>	<b>Interventi chimici:</b> immersione delle piantine prima del trapianto.	Thiamethoxam (1)	(1) Da effettuarsi prima del trapianto.
<b>Tripidi</b> <i>F. occidentalis</i>	<b>Interventi chimici:</b> intervenire tempestivamente in presenza del parassita.	Acrinatrina (1) Spinosad (2) Abamectina (3)	(1) Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità. (2) Al massimo 3 interventi, indipendentemente dall'avversità. (3) Al massimo 1 intervento l'anno, indipendentemente dall'avversità.

## RUCOLA

### Controllo delle infestanti

Integrare le tecniche di diserbo chimico con quelle di carattere agronomico (sarchiature, avvicendamento)

<b>Epoca d'intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dosi (l-kg/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate 30,4 Benfluralin 19,2	1,5 – 3 5 - 6	
<b>Post-emergenza</b>	Graminacee	Ciclossidim 10,9 Propaquizafop 9,7 Quizalofop-p-etile 5	2-3 1 1-1,5	

## CECE

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Antracnosi</b> <i>Ascochyta rabiei</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di seme conciato - ampie rotazioni <b>Interventi chimici</b> -interventi all'inizio della formazione dei baccelli	ossicloruro di rame idrossido di rame solfato di rame	<b>Ammissa la concia del seme.</b> <b>-Formulati rameici ammessi per non più di un trattamento indipendentemente dall'avversità da combattere.</b>
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe polygoni</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di cultivar resistenti. <b>Interventi chimici</b> - intervenire alla comparsa di sintomi diffusi.	zolfo	
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>	<b>Interventi chimici</b> -intervenire alla comparsa dei sintomi.	ossicloruro di rame idrossido di rame solfato di rame	<b>Amnesso un solo trattamento con prodotti rameici indipendentemente dall'avversità da combattere.</b>
<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium spp.</i> <b>Rizoctoniosi</b> <i>Rhizoctonia spp.</i> <b>Verticilliosi</b> <i>Verticillium spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme conciato. - ampie rotazioni.		<b>Amnessa solo la concia del seme.</b>
<b>Fitofagi</b> <b>Tonchio</b> <i>Callosobruchus chinensis</i>	<b>Criteri d'intervento</b> -impiegare seme non infestato		<b>Non ammessi trattamenti di pieno campo.</b>

## CECE

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	dicotiledoni graminacee	Glifosate 30,4	1,5-3	
<b>Pre-emergenza</b>	dicotiledoni annuali	Pendimetalin 38,72	1,75	

## CICERCHIA

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Oidio</b>	-preferire gli ecotipi locali più resistenti alla malattia;		
<b>Altre crittogame</b>	<b>Interventi agronomici :</b> -impiego di ecotipi locali più resistenti; -evitare terreni asfittici o pesanti; -impiego di seme conciato.		<b>Non ammessi trattamenti di pieno campo.</b>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Tonchi</b>	<b>-impiego di seme non infestato.</b>		

## **CICERCHIA**

### **Controllo delle infestanti**

**Non è ammesso il diserbo chimico.**

**FAVINO da granella**  
**Difesa fitosanitaria**

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Antracnosi</b> <i>Ascochyta fabae</i>			Non ammessi interventi chimici
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>			Non ammessi interventi chimici
<b>Botrite</b> <i>Botryotinia fuckeliana,</i> <i>Botrytis fabae</i>	Evitare semine fitte		Non sono ammessi trattamenti.

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i>	Generalmente non dannosi		Non sono ammessi trattamenti.
<b>Tonchio</b> <i>Bruchus rufimanus</i>	Impiegare seme non infestato.		Non sono ammessi trattamenti.

**FAVINO da granella**  
**Controllo delle infestanti**

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Pre-semina</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4	1,5-3	
<b>Pre-emergenza</b>	Graminacee e dicotiledoni	Pendimetalin 38,72 Imazamox 3,7* Clomazone 30,74	2 0,75 0,2-0,3	<b>*Ammesso un solo trattamento l'anno, indipendentemente dall'epoca di intervento.</b>
<b>Post-emergenza</b>	Graminacee  Graminacee e dicotiledoni  Dicotiledoni	Propaquizafop 9,7  Imazamox 3,7*  Bentazone 87	1  0,75  0,75	<b>*Ammesso un solo trattamento l'anno, indipendentemente dall'epoca di intervento.</b>

## FAVA

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Antracnosi</b> <i>Ascochyta fabae</i>			<b>Non ammessi trattamenti</b>
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>	Intervenire alla comparsa dei sintomi	ossicloruro di rame idrossido di rame solfato di rame	<b>Rameici ammessi per un solo trattamento indipendentemente dall'avversità da combattere.</b>
<b>Botrite</b> <i>Botryotinia fuckeliana,</i> <i>Botrytis fabae</i>	Evitare le semine fitte.		<b>Non ammessi trattamenti.</b>

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i>	<b>Intervenire solo in presenza di infestazioni diffuse e consistenti.</b>	Piretrine Pirimicarb* Etofenprox* Acetamiprid*	<b>*Amnesso un solo trattamento all'anno, in assenza di antagonisti naturali.</b>  <b>Non sono ammessi interventi durante le fioritura.</b>
<b>Tonchio</b> <i>Bruchus rufimanus</i>	-impiegare seme non infestato -intervenire a fine fioritura basandosi sulla dannosità del fitofago nella zona e in anni precedenti	Deltametrina* Piretrine	<b>* Amnesso 1 trattamento a fine fioritura.</b>

## FAVA

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>preparazione del letto di semina</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1-2 + 3-5	
<b>pre-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee	Pendimetalin 38,72 Imazamox 3,7*	2 0,75	<b>*Ammesso un solo trattamento l'anno, indipendentemente dall'epoca di intervento.</b>
<b>post-emergenza</b>	Dicotiledoni e graminacee  Dicotiledoni  Graminacee	Imazamox 3,7*  Bentazone 87  Fluazifop-p-butile 13,4	0,75  0,75  1	<b>*Ammesso un solo trattamento l'anno, indipendentemente dall'epoca di intervento.</b>

## FAGIOLO - FAGIOLINO

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Antracnosi</b> <i>Ascochyta pisi,</i> <i>Ascochyta pinodes,</i> <i>Ascochyta pinodella</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme conciato; - ampie rotazioni; - impiego di varietà resistenti; <b>Interventi chimici</b> - interventi all'osservazione dei sintomi o condizioni favorevoli alla malattia..	Prodotti rameici	<b>Rameici: ammessi per non più di tre trattamenti indipendentemente dall'avversità da combattere.</b>
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>	Intervenire <b>alla comparsa dei sintomi</b>	Prodotti rameici Zolfo Azoxystrobin*	<b>Rameici: ammessi per non più di tre trattamenti indipendentemente dall'avversità da combattere.</b>  <b>*Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Botrite</b> <i>Botryotinia fuckeliana,</i> <i>Botrytis fabae</i>	-intervenire in presenza dei sintomi e andamento climatico umido.	Prodotti rameici	
<b>Fusariosi-Rizoctoniosi</b> <i>Fusarium spp.</i> <i>Rhizoctonia spp.</i>	- impiego di seme conciato; - ampie rotazioni.		
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme sano; -ampie rotazioni; -trinciare senza interrare la vegetazione infetta; <b>Interventi chimici</b> intervenire all'osservazione dei sintomi.	Prodotti rameici	
<b>VIROSI</b>	- lotta ai vettori (afidi) - impiego di seme sano.		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae,</i> <i>Acyrtosiphon pisum</i>	intervenire <b>in presenza delle prime colonie.</b>	Alfacipermetrina (1)(2) Ciflutrina (1)(2) Cipermetrina (1)(3) Deltametrina (1) Fluvalinate (1) Lambda-cialotrina(1) Zeta-cipermetrina (1)(3) Etofenprox (1)(3) Imidacloprid (4) Acetamiprid (4)	<b>Non sono ammessi interventi durante le fioritura.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Ammesso solo su fagiolo.</b> <b>(3) Ammesso solo su fagiolino.</b> <b>*Impiegabile una sola volta e solo su fagiolino.</b> <b>(4) Neonicotinoidi: al massimo un intervento all'anno.</b>
<b>Piralide</b> <i>Ostrinia nubilalis</i>	-intervenire in funzione della dannosità del fitofago in anni precedenti e alle prime <b>catture nelle trappole a feromoni.</b>	<i>Bacillus thuringiensis</i> Cipermetrina (1) Deltametrina (1) Lambda-cialotrina(1) Zeta-cipermetrina (1) Etofenprox (1) Spinosad (2) Emamectina (3)	<b>Il controllo dell'avversità è ammesso solo su fagiolino.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(3) Al massimo 2 interventi l'anno.</b>
<b>Mosca</b> <i>Delia platura</i>	adottare tutte le misure atte ad ottenere una pronta e rapida emergenza della coltura: seme con buona energia germinativa, terreno ben preparato, ecc. <b>Interventi chimici:</b> Nelle aziende in cui le infestazioni sono ricorrenti.	Teflutrin	
<b>Tripide</b> <i>Frankliniella intonsa</i>	l'intervento chimico è giustificato solo in caso di <b>infestazione intensa e su coltura autunnale.</b>	Deltametrina(1) Lambda-cialotrina(1) Fluvalinate(1) Cipermetrina*(1) Acrinatrina(1) Ciflutrin (1) (2)	<b>Ammesso un solo intervento contro l'avversità.</b> <b>*Ammesso solo su fagiolino.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b> <b>(2) Ammesso solo su fagiolo.</b>
<b>Nottua fogliare</b> <i>Mamestra oleracea</i>	<b>Interventi chimici:</b> inizio infestazione	Spinosad (1)	<b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.</b>
<b>Ragnetto rosso</b> <i>Tetranychus urticae</i>	<b>Interventi chimici:</b> effettuare trattamenti alla comparsa delle prime infestazioni, bagnando bene la pagina inferiore delle foglie.	Acrinatrina (1) Exitiazox* Fenpiroximate*	<b>Ammesso un solo trattamento contro l'avversità.</b> <b>*Non ammesso su fagiolo.</b> <b>(1) Al massimo 2 interventi l'anno con Piretroidi e Etofenprox, indipendentemente dall'avversità.</b>

## FAGIOLO E FAGIOLINO

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>preparazione del letto di semina</b>	Graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-3 + 3-5	
<b>pre-emergenza</b>	Dicotiledoni - graminacee	Pendimetalin 38,72 S-Metolacloclor 86,5* Clomazone 30,74 (1) Linuron 37,6	1,75 1 0,2-0,3 0,5-1	<b>*Ammesso solo su fagiolo.</b> <b>(1) Impiegare la dose minima su fagiolino; su questa coltura effettuare prove di fitotossicità su piccole parcelle prima dell'impiego su larga scala.</b>
<b>post-emergenza</b>	Dicotiledoni-graminacee  Graminacee  Dicotiledoni	Imazamox 3,7  Propaquizafop 9,7* Ciclossidim 10,9 Quizalofop-etile isomero D 4,93 (1) Quizalofop-p-etile 5 (1)  Bentazone 87	0,75-1  1 1,5-2,5 1-1,5 1-1,5  0,75	<b>*Non ammesso su fagiolino.</b> <b>(1) Non ammesso su fagiolo.</b>

## LENTICCHIA

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe polygoni</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di cultivar resistenti.		<b>Non ammessi interventi chimici.</b>
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>			<b>Non ammessi interventi chimici.</b>
<b>Marciumi radicali</b> <i>Fusarium spp.</i> <i>Sclerotinia spp.</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme conciato. - ampie rotazioni.		

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Ricamatrice dei legumi</b> <i>Etiella zinckenella</i>			
<b>Tonchio</b> <i>Bruchus ervi,</i> <i>Callosobruchus chinensis</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiegare seme non infestato.		

## **LENTICCHIA**

### **Controllo delle infestanti**

**Non sono ammessi interventi chimici**

## PISELLO

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Peronospora</b> <i>Peronospora pisi</i>	<b>Interventi agronomici</b> - scelta di varietà resistenti. - ampie rotazioni. - impiego di seme conciato. <b>Interventi chimici</b> -interventi di difesa in presenza dei sintomi o andamento climatico umido e piovoso. -con infezioni precoci interventi ripetuti a distanza di 6 - 7 giorni.	Prodotti rameici Cimoxanil (1)	(1) Al massimo 1 intervento l'anno.
<b>Antracnosi</b> <i>Ascochyta pisi</i> <i>Ascochyta pinodes</i> <i>Ascochyta pinodella</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di seme conciato - ampie rotazioni <b>Interventi chimici</b> -interventi all'osservazione dei primi sintomi.	Prodotti rameici Ditianon Azoxystrobin*	*Al massimo 2 interventi, indipendentemente dall'avversità.
<b>Oidio</b> <i>Erysiphe polygoni</i>	<b>Interventi agronomici</b> impiego di cultivar resistenti. <b>Interventi chimici</b> - intervenire alla comparsa di sintomi diffusi.	Zolfo Penconazolo(1) Ciproconazolo(1) Azoxystrobin**	Non ammessi trattamenti su coltura da granella secca. (1)Ammessi al massimo due trattamenti complessivi all'anno. Non ammesse formulazioni Xn. **Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces fabae</i>	intervenire alla comparsa dei sintomi	Sali rameici Zolfo Zzoxytrobin*	*Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.
<b>Botrite</b> <i>Botryotinia fuckeliana</i> <i>Botrytis fabae</i>	<b>Interventi agronomici</b> -evitare le semine fitte. <b>Interventi chimici</b> -interventi all'osservazione dei primi sintomi.	Azoxystrobin*	*Al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità.

<b>Fusariosi</b> <i>Fusarium</i> spp. <b>Rizoctoniosi</b> <i>Rhizoctonia</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme conciato. - ampie rotazioni.		<b>Amnessa solo la concia del seme.</b>
<b>BATTERIOSI</b> <i>Pseudomonas syringae</i>	<b>Interventi agronomici</b> - impiego di seme sano. - ampie rotazioni - trinciare senza interrare la vegetazione infetta. <b>Interventi chimici</b> Intervenire solo alla comparsa dei primi sintomi.	Ossicloruro di rame Idrossido di rame Solfato di rame	

<b>Fitofagi</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Aphis fabae</i> <i>Acythosiphon pisum</i>	<b>Interventi chimici</b> -intervenire in presenza di infestazioni diffuse e consistenti.	Ciflutrin* Deltametrina* Lambda-cialotrina* Fluvalinate* Cipermetrina*	* <b>Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità e in assenza di antagonisti naturali.</b>  <b>Non sono ammessi interventi durante le fioritura.</b>  <b>Non sono ammessi trattamenti su coltura da granella secca.</b>
<b>Tonchio</b> <i>Bruchus rufimanus</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiegare seme non infestato. <b>Interventi chimici</b> -intervenire a fine fioritura basandosi sulla dannosità del fitofago nella zona e in anni precedenti.	Deltametrina*	* <b>Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità e in assenza di antagonisti naturali.</b> <b>Non sono ammessi interventi durante le fioritura.</b>
<b>Mamestra</b> <i>Mamestra brassicae</i>	<b>Interventi chimici</b> intervenire in presenza di larve.	Ciflutrin* Deltametrina* Lambda-cialotrina* Cipermetrina* Spinosad (1)	* <b>Piretroidi: al massimo 2 interventi l'anno, indipendentemente dall'avversità e in assenza di antagonisti naturali.</b> <b>(1) Al massimo 3 interventi l'anno.</b> <b>Non sono ammessi interventi durante le fioritura.</b>

## PISELLO

### Controllo infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>preparazione del letto di semina</b>	graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5 - 3 + 3-5	
<b>pre-emergenza</b>	dicotiledoni annuali	Pendimetalin 38,72 Pendimetalin 31,7 + Aclonifen 49,6	2-2,5 1,5-2 + 1,5-2	
	dicotiledoni-graminacee	Clomazone 30,74	0,2-0,3	
<b>post-emergenza</b>	dicotiledoni dicotiledoni-graminacee	Bentazone 87 Imazamox 3,7	0,75 0,5-0,75	
	graminacee	Propaquizafop 9,7 Ciclossidim 10,9 Fenoxaprop-p-etile 6,77 Quizalofop-p-etile 5 Quizalofop-etile isomero D 4,93	1 1-2 1-1,5 1-1,5 1-1,5	

## ERBA MEDICA

### Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mal bianco - Oidio</b> <i>Erysiphe pisi</i>	<b>Interventi agronomici</b> -scelta di varietà resistenti; -sfalci tempestivi;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Marciumi radicali</b> <i>Fusarium</i> <i>Verticillium</i> <i>Pythium</i> <i>Phytophthora</i>	<b>Interventi agronomici</b> -non effettuare la coltura in terreni soggetti a ristagni; -ampie rotazioni; -cultivar resistenti; -impiego di seme conciato;		<b>Ammessi solo la concia del seme.</b>
<b>Maculatura fogliare</b> <i>Pseudopeziza medicaginis</i>	<b>Interventi agronomici</b> -sfalcio tempestivo del prato; -impiego di cultivar resistenti;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Antracnosi</b> <i>Colletotricum trifolii</i>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di cultivar resistenti;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Ascochitosi</b> <i>Ascochita trifolii</i>	<b>Interventi agronomici</b> -concia del seme; -cultivar resistenti;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Ruggine</b> <i>Uromyces striatus</i>	<b>Interventi agronomici</b> -sfalcio anticipato del prato; -cultivar resistenti;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>BATTERIOSI</b> <i>Clavibacter michiganensis</i> , ecc.	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di seme certificato e risanato; -ampie rotazioni; -evitare gli sfalci con elevata umidità; -preferire le semine primaverili;		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Afidi</b> <i>Aphis</i> spp.	Fitofagi generalmente non dannosi		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Cecidomia dei fiori</b> <i>Cantarinia medicaginis</i>	Fitofago dannoso su coltura da seme ma non a livelli tali da richiedere interventi di difesa.		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Larve di lepidotteri</b> <i>Hypera variabilis,</i> <i>Nyssia florentina,</i> <i>Chloridaea viriplaca</i>			<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Altri fitofagi</b> <i>Sitona lineatus,</i> <i>Apion pisi</i>			<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Nematodi</b> <i>Ditylenchus</i> spp.	<b>Interventi agronomici</b> -ampie rotazioni -impiego di seme sano		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>

## ERBA MEDICA

### Controllo delle infestanti

<b>Epoca di intervento</b>	<b>Infestanti</b>	<b>Principi attivi (%)</b>	<b>Dose (kg-l/ha)</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>preparazione del letto di semina</b>	graminacee e dicotiledoni	Glifosate 30,4 + solfato ammonico	1,5-3 + 3-5	
<b>post-emergenza</b>	Cuscuta	Propizamide 36	4	<b>Impiegabile solo per il contenimento della Cuscuta con interventi localizzati che, annualmente e complessivamente, non potranno superare il 15% dell'intera superficie.</b>
<b>post-emergenza</b>	Dicotiledoni-Graminacee  Graminacee	Imazamox 3,7 (Bentazone 3,1+ Imazamox 2)  Quizalofop-p-etile 5 Quizalofop-etile isomero D 4,93	0,75-1 1,25  1-1,5 1,5-2,5	

## ERBAI (graminacee + leguminose)

### Difesa fitosanitaria

Avversità	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Fitofagi e Crittogame</b>	<b>Interventi agronomici</b> -preferire gli ecotipi locali più resistenti; -impiegare seme conciato; -eliminare le zone di ristagno con adeguati drenaggi;		<b>Non sono ammessi trattamenti di pieno campo.</b>

**ERBAI (graminacee + leguminose)**

**Controllo infestanti**

**Non è ammesso alcun diserbo chimico.**

## LUPINELLA

### Difesa fitosanitaria

Crittogame	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Sclerotinia</b> <i>Sclerotinia trifoliorum</i>	<b>Interventi agronomici</b> -evitare i terreni argillosi o umidi; -è opportuno che la coltura non torni sullo stesso terreno prima di due anni.		Non sono ammessi trattamenti di pieno campo.
<b>Mal bianco</b>	<b>Interventi agronomici</b> -preferire gli ecotipi locali più resistenti alla malattia; -sfalcio non tardivo.		Non sono ammessi trattamenti di pieno campo.
<b>Altre crittogame</b>	<b>Interventi agronomici</b> -impiego di seme conciato.		Non sono ammessi trattamenti di pieno campo.

Fitofagi principali	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
<b>Tonchi</b> <i>Bruchus spp.</i> <i>Acanthoscelides spp.</i>	Dannosi solo sulla coltura da seme. <b>Interventi agronomici</b> -evitare di ritardare in modo eccessivo la trebbiatura onde impedire lo sfarfallamento in campo; -impiego di seme non infestato per la semina. <b>Interventi chimici</b> -disinfestazione del seme in magazzino dopo la raccolta.		Non sono ammessi trattamenti di pieno campo.

## LUPINELLA

### Controllo infestanti

Non è ammesso alcun diserbo chimico.

## PRATI POLIFITI

### Difesa fitosanitaria

Avversità	Criteri d'intervento	Principi attivi	Limitazioni d'uso e note
Fitofagi e Crittogame	<b>Interventi agronomici</b> -preferire gli ecotipi locali più resistenti; -impiegare seme conciato; -adeguata regimazione delle acque con drenaggi e sistemazioni.		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>

## **PRATI POLIFITI**

### **Controllo infestanti**

**Non è ammesso alcun diserbo chimico.**

## SULLA Difesa fitosanitaria

<b>Crittogame</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Mal bianco</b>	<b>Interventi agronomici:</b> -preferire gli ecotipi locali più resistenti alla malattia; -pascolamento durante l'inverno per contenere lo sviluppo vegetativo; -sfalcio non tardivo.		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>
<b>Altre crittogame</b>	Metodi di difesa agronomici e impiego di seme conciato		<b>Non sono ammessi trattamenti.</b>  <b>E' ammessa solo la concia del seme</b>

<b>Fitofagi principali</b>	<b>Criteri d'intervento</b>	<b>Principi attivi</b>	<b>Limitazioni d'uso e note</b>
<b>Tonchi</b> <i>Bruchus</i> spp. <i>Acanthoscelides</i> spp.	Dannosi solo sulla coltura da seme. <b>Interventi agronomici</b> -evitare di ritardare in modo eccessivo la trebbiatura onde impedire lo sfarfallamento in campo; -impiego di seme non infestato per la semina. <b>Interventi chimici</b> -disinfestazione del seme in magazzino dopo la raccolta.		<b>Non sono ammessi trattamenti insetticidi in campo.</b>  <b>E' ammessa solo la disinfestazione del seme.</b>

**SULLA**  
**Controllo infestanti**

**Non è ammesso il diserbo chimico.**