

**SECONDO AGGIORNAMENTO NORME TECNICHE DIFESA E DISERBO**  
**AZIONE 214.1 DEL PSR 2007-2013 E REG. CE N. 1234/07**  
**APRILE 2010**

<b>Coltura</b>	<b>Avversità</b>	<b>Prodotto da inserire o modificare</b>	<b>Limitazioni e Note</b>
Melo	Carpocapsa	Emamectina benzoato	Al massimo 2 interventi all'anno.
Pero	Carpocapsa	Emamectina benzoato	Al massimo 2 interventi all'anno. Si consiglia di iniziare l'utilizzo a partire dalla seconda generazione
Vite, nocciolo, melo	Spollonante	Carfentrazone	(% s.a. 6,45) dose 1 l./ha all'anno. Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 litro/ha all'anno.
Vite, nocciolo, melo, pero, pesco, susino, kiwi	Diserbante	Carfentrazone	(% s.a. 6,45). Al massimo 1 litro ha all'anno (impiego 0,3 l./ha per ciascun intervento). Indipendentemente dall'utilizzo al massimo 1 litro/ha all'anno.

<b>Coltura</b>	<b>Avversità</b>	<b>Prodotto da inserire o modificare</b>	<b>Limitazioni e Note</b>
Anguria	Afidi-Aleurodidi	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Basilico	Sclerotinia	Fenexamid	Pieno campo e serra
Cavoli A Inf. - Testa	Afidi-Altica	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Cavoli Bruxelles	Afidi-Altica	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Fagiolino	Botrite	Fenexamid	Solo in serra
Fagiolo, Fagiolino	Afidi	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Lattuga, Indivia riccia, Indivia scarola, Cicoria, Radicchio	Afidi	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Patata	Dorifora	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Patata	Disseccante pre-raccolta	Carfentrazone	(% s.a. 6,45) dose 1 l./ha all'anno. Al massimo 1 litro ha (nei 5 - 7 gg che precedono la raccolta)
Prezzemolo	Sclerotinia	Fenexamid	Pieno campo e serra
Prezzemolo	Afidi	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi
Zucca	Afidi	Acetamiprid	Al massimo 1 intervento all'anno
Zucchini	Afidi-Aleurodidi	Acetamiprid	In alternativa e nei limiti previsti per gli altri neonicotinodi

<b>Coltura</b>	<b>Avversità</b>	<b>Prodotto da inserire o modificare</b>	<b>Limitazioni e Note</b>
<b>Erba Medica</b>	<b>Apion pisi</b>	<b>Acetamiprid</b>	<b>Indipendentemente dal prodotto utilizzato al massimo 1 intervento insetticida all'anno sulla coltura</b>
<b>Colza</b>	<b>Meligete Altica</b>	<b>Acetamiprid</b>	<b>Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Sorgo</b>	<b>Diserbo post emergenza</b>	<b>Dicamba + Prosulfuron</b>	<b>(% s.a. 50 + 5) dose 300 - 400 gr/ha</b>