

DISERBO CIPOLLA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di colture Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre-emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin (1) Cloridazon (2) (3)	38,72 65	2 1	(1) Utilizzare con attenzione nei terreni sabbiosi (2) Non impiegabile su terreni limosi (3) Al massimo 2,6 kg di sostanza attiva ogni tre anni sullo stesso campo
Pre - trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	2	
Post emergenza e Post trapianto	Dicotiledoni annuali	Ioxinil	23	0,15 - 0,85	Utilizzabile anche in epoca precocissima, utilizzando le dosi più basse Indicato per cipolle autunnali
	Graminacee e Dicotiledoni	Oxifluorfen (1) Pendimetalin (1) Pyridate (2)	22 38,72 45,0	0,05 - 0,5 1 - 1,5 1,3 - 2	(1) Intervenire su colture dopo le 2 foglie vere Da preferirsi dosaggi ridotti eventualmente ripetuti (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
	Dicotiledoni perennanti	Clopiralid	75	0,15	Da utilizzare solo dopo la seconda foglia vera, utilizzando dosi frazionate in proporzione allo sviluppo delle infestanti
	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop-p-etile Quizalofop-etile Isomero D Diclofop-metile (1) (2)	10,9 9,7 5 4,93 26	0,75 - 1,25 1 - 1,2 1 - 1,5 1 - 1,5 2,5 - 3	(1) Non utilizzare formulati classificati Xn (2) Solo formulati al 26%