

**DISERBO SEDANO**

| <i>Epoca d'impiego</i>              | <i>Infestanti controllate</i>   | <i>Sostanza attiva</i> | <i>% di S.a.</i> | <i>l o kg /ha</i> | <i>Limitazioni d'uso e note</i>   |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---|
| <b>Pre semina<br/>Pre trapianto</b> | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Glifosate              | 30,4             | 1,5 – 3           | <b>Trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto</b><br>Utilizzare in presenza di infestanti emerse  |
| <b>Pre semina<br/>Pre trapianto</b> | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Pendimetalin           | 31,7             | 2,5 - 3           |   |
| <b>Post trapianto</b>               | Graminacee<br>e<br>Dicotiledoni | Linuron                | 37,6             | 0,5 - 1           | <b>Usare la dose inferiore nei terreni sciolti</b><br><b>Intervenire almeno 10 giorni dopo il trapianto e in ogni caso con la coltura allo stadio di 4 foglie vere</b><br>Preferire le dosi più basse e frazionare gli interventi |
|                                     | Graminacee                      | Fluazifop-p-butile     | 13,4             | 1 - 1,25          | <b>30 giorni di carenza</b>   |

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***