

DIFESA CAROTA

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
CRITTOGAME			
Marciumi basali (<i>Sclerotinia minor</i>) (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	AGRONOMICO: -Evitare eccessi di azoto; -Avvicendamenti colturali; -Favorire il drenaggio del suolo. CHIMICO: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	<i>Coniothyrium minitans</i> Tolclofos -metile (1)	(1) 1 intervento per tale avversità, al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
Cavity spot (<i>Pythium violae</i> , <i>Pythium sulcatum</i>)	AGRONOMICO -Utilizzo di varietà resistenti o tolleranti; -Avvicendamenti colturali; -Favorire il drenaggio del suolo; -Effettuare calcitazioni nei suoli acidi. CHIMICO: -in caso di situazioni fortemente predisponenti all'attacco o alla prima comparsa dei sintomi.	<i>Trichoderma asperellum</i> Propamocarb (1)	Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati (1) Al massimo 1 intervento per ciclo colturale; al terreno in presemina o sulla coltura in caso di evidenziarsi dei sintomi
Mal vinato (<i>Rhizoctonia solani</i>)	AGRONOMICO: -Interramento profondo dei residui colturali; -Avvicendamenti colturali; -Favorire il drenaggio del suolo. CHIMICO: - Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	<i>Trichoderma asperellum</i> Tolclofos -metile (1)	Utilizzare solo ceppi di Trichoderma registrati (1) 1 intervento per tale avversità, al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
Alternariosi (<i>Alternaria dauci</i>)	AGRONOMICO: -Interramento profondo dei residui colturali; -Avvicendamenti colturali ampi; -Favorire il drenaggio del suolo; -Uso oculato delle irrigazioni; -Utilizzare seme sano e conciato. CHIMICO: -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi, alternando i principi attivi fra di loro.	Prodotti rameici Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2) Pyrimetanil (3) Tolclofos - metile (4)	Utilizzare il rame nelle prime fasi della coltura per contenere la vegetazione (1) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale (4) 1 intervento per tale avversità, al massimo 2 interventi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
Peronospora (<i>Plasmopara nivea</i>)	AGRONOMICO: -Favorire il drenaggio del suolo; -Uso oculato delle irrigazioni; CHIMICO: -in caso di situazioni fortemente predisponenti all'attacco o alla prima comparsa dei sintomi.	Dodina	
Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	CHIMICO: -Intervenire alla comparsa dei primi sintomi.	Zolfo Azoxystrobin (1) Difenoconazolo (2)	(1) Al massimo 3 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi per ciclo colturale indipendentemente dall'avversità

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Patogeni tellurici (<i>Sclerotinia spp.</i>) (<i>Rhizoctonia solani</i>) (<i>Pythium spp.</i>)	AGRONOMICO: - Avvicendamenti colturali, - Solarizzazione; - Uso di varietà resistenti; - Utilizzo in avvicendamento di specie da sovescio con attività bio-fumiganti. CHIMICO: - Solo in caso di terreni in cui si sia riscontrata una infestazione sulla coltura o sul ciclo precedente	Metam Na (1) (2) (3) (4) (5) Metam K (1) (2) (3) (4) (5) Dazomet (1) (2) (3) (4) (6)	(1) Applicazione in pre-semina (2) Gli interventi chimici nei singoli appezzamenti sono ammessi solo ad anni alterni (3) Da effettuarsi previa autorizzazione dell'organo tecnico competente per territorio (4) massimo 1 intervento all'anno con questi prodotti, in alternativa tra di loro (5) Utilizzare una dose massima di 1.000 litri anno (6) Con Dazomet max 1 trattamento anno a 40-50 gr/mq.
Batteriosi (<i>Xanthomonas campestris</i> <i>pv. carotovora</i> , <i>Erwinia</i> <i>carotovora subsp. Carotovora</i>)	AGRONOMICO: - Avvicendamenti colturali; - Concimazioni azotate e potassiche equilibrate; - Curare l'irrigazione e il drenaggio del terreno; - Utilizzare fertilizzanti in grado di stimolare i meccanismi di resistenza naturale delle piante.	Prodotti rameici	
FITOFAGI			
Afidi (<i>Semiaphis dauci</i>) (<i>Dysaphys foeniculus</i>) (<i>Cavariella aegopodii</i>)	CHIMICO: - Presenza accertata sulle piante in fase di accrescimento.	Piretro naturale Azadiractina Pirimicarb Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1)	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
Mosca (<i>Psila rosae</i>)	CAMPIONAMENTO: - Possibile utilizzare trappole cromoattrattive di colore giallo per accertare la presenza del dittero. CHIMICO: - Solo nelle zone dove sono ricorrenti attacchi del dittero; - in caso di presenza accertata del dittero.	Deltametrina (1) Teflutrino (2) Azadiractina	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento localizzato alla semina
Nottue (<i>Heliothis armigera</i>) (<i>Spodoptera spp.</i>) (<i>Autographa gamma</i>)	CHIMICO: - in caso di infestazione generalizzata.	Azadiractina Deltametrina (1) Lambda-cialotrina (1) Cipermetrina (1)	(1) Al massimo 2 interventi con piretroidi per ciclo colturale, indipendentemente dall'avversità
Minatrice (<i>Liriomyza spp.</i>)	CAMPIONAMENTO: - Possibile monitorare la presenza del fitofago mediante trappole cromotropiche di colore giallo.		Non sono ammessi interventi chimici
Insetti terricoli Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	CHIMICO: - Intervenire prima della semina in caso di infestazione generalizzata riscontrata sul ciclo precedente.	<i>Beauveria bassiana</i> Teflutrino (1) Clorpirifos (2)	(1) Al massimo 1 intervento intervento localizzato alla semina (2) Intervento localizzato al terreno
Chioccioline e limacee (<i>Helix spp.</i>) (<i>Cantareus aperta</i>) (<i>Helicella variabilis</i>) (<i>Limax spp.</i>) (<i>Agriolimax spp.</i>) (<i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Arion spp.</i>)	CHIMICO: - Solo in caso d'infestazione generalizzata; - Distribuire preferibilmente il prodotto sulle fasce perimetrali o nelle zone interessate.	Metaldeide-esca Fosfato ferrico	Distribuire il prodotto in formulazione granulare sulle fasce perimetrali o solo nelle zone interessate

Avversità	Criteri di intervento	S.a. e Ausiliari	Limitazioni d'uso e note
Nematodi <i>(Heterodera schachtii)</i> <i>(Meloidogyne spp.)</i> <i>(Ditylenchus dipsaci)</i>	AGRONOMICO: - Avvicendamenti colturali, - Solarizzazione; - Uso di varietà resistenti; - Utilizzo in avvicendamento di specie da sovescio con attività bio-nematocide. CHIMICO: -Solo in caso di terreni con accertata presenza del nematode.	Oxamil (1)	I nematodi galligeni sono presenti nei terreni prevalentemente sabbiosi. I nematodi fogliari prevalentemente nei terreni compatti. (1) Solo su nematodi cisticoli e galligeni