

DISERBO PATATA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Napropamide	30,4 41,85	1,5 – 3 2 - 3	(1) Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin Pendimetalin Metazaclo Aclonifen Clomazone (1) Flufenacet Metribuzin + Clomazone	35 38,72 43,1 49,6 30,74 60 19,3 + 4,97	0,4 - 0,6 2,5 1 - 1,5 1,5 - 2 0,3 0,6 - 0,85 1,5	(1) Intervenire dopo la rincalzatura
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron Metribuzin	25 35	0,04 0,2 - 0,4	Intervenire precocemente alla prima emergenza delle infestanti, anche a basse dosi e con eventuali applicazioni ripetute
	Graminacee	Propaquizafop Ciclossidim Diclofop - metile (1)	9,7 10,9 27	1 1,5 – 2,5 2,5 - 3,5	(1) Non utilizzare formulati classificati Xn
Pre raccolta	Disseccamento coltura	Carfentrazone (1)	6,45	1	Si consiglia di effettuare il disseccamento a non meno di 10 giorni dalla raccolta (1) Al massimo 1 litro/ha all'anno