



DISERBO CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO CAPPuccio
(Cavolo cappuccio appuntito, Cavoli rossi, Cavoli verza, Cavoli bianchi)

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina e Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Trattamenti al terreno in assenza di colture Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre trapianto	Dicotiledoni e Graminacee	Napropamide (1) Pendimetalin (2) (3)	41,85 38,72	2,2 - 3 2,50	(1) Ammesso solo su cavolo cappuccio (2) 100 giorni di carenza (3) Non ammesso in coltura protetta
Post - trapianto	Dicotiledoni annuali	Clopivalid	9,5	1,2 - 1,5	
	Dicotiledoni e Graminacee	Metazachlor (1) Pyridate (2)	43,1 45,0	1,5 1,3 - 2	(1) Trattare su infestanti che non abbiano superato la fase di plantula (2) Massimo 2 Kg di prodotto all'anno
	Graminacee	Ciclossidim (1) Propaquizafop (2)	10,9 9,7	1,5 - 2,5 1,2	(1) Non ammesso su cavolo di Bruxelles (2) Ammesso solo su cavolo cappuccio
		Quizalofop-p-etile (2) Quizalofop-etile Isomero D (2)	5 4,93	1 - 1,5 1 - 1,5	