



# DISERBO MAIS

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre semina</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30, 7	1,5 - 3	
<b>Pre emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	(Terbutilazina + Dimetenamide)-P (1) (5) Pendimetalin (Isoxaflutole + Aclonifen) (2) Flufenacet S-Metolaclor (Mesotrione + Terbutilazina + S-metolaclor) (1) (5) (S-metolaclor + Terbutilazina) (1) (5) (Mesotrione + S-metolaclor) Petroxamide Clomazone (3) (Isoxaflutole+Thienicarbazone +Cyprosulfamide) (4) (Isoxaflutole + Cyprosulfamide) (Flufenacet + Terbutilazina) (1) (5) Mesotrione	22,5 – 25,2 31,70 6,2 – 41,3 60 86,49 (3,39+16,94+28,23) (28,9 + 17,4) (5,58 + 46,5) 55,6 30,74 (3,97 + 1,59 + 2,62) (4,23 + 4,23) (17,4 + 29) 9,1	2,0 1.5 - 3 0,7 - 1,0 0,80 1,5 4,5 4 - 4,5 2 2 0,25 2 1,7 – 2 2,25 – 2,5 0,5 - 1	(1) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (2) Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon (3) Non utilizzare su terreni sabbiosi e ciottolosi (4) Al massimo 1 intervento all'anno (5) Terbutilazina impiegabile solo con formulati nei quali è inserita con altre s.a
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	(Nicosulfuron + Rimsulfuron)	(30 + 15)	Un trattamento: 0,70 - 0,85 Due trattamenti: 0,50 + 0,50	
		(Rimsulfuron + Tifensulfuron – metile)	(50 + 25)	Un trattamento: 0,20 - 0,25 Due trattamenti: 0,15 + 0,10	
		Nicosulfuron	4,2	Un trattamento: 1,0 Due trattamenti: 1 + 0,5	
		Tifensulfuron - metile (Florasulam + Fluroxipir) Prosulfuron Sulcotrione Mesotrione Clopiralid (Foramsulfuron + Isoxadifen ethil) Dicamba Fluroxipir (Mesotrione + Terbutilazina) (1) (Isoxaflutole+Thienicarbazone+Cyprosulfamide) (2) (Petroxamide + Terbutilazina) (1) (Dicamba + Nicosulfuron + Rimsulfuron) (Sulcotrione + Terbutilazina) (1)	50 (0,10 + 14,57) 75 26 9,1 75 (2,33 + 2,33) 21,2 20,6 (6,2 + 29,4) (3,97 + 1,59 + 2,62) (27,8 + 2 3,2) (55 + 9,2 + 2,3) (15 + 28,4)	0,015 1,00 0,025 1,00 0,5 - 1 0,15 2 - 2,7 0,75 - 1 0,5 - 0,7 1 - 1,5 2 3 0,35 – 0,44 2 – 2,6	(1) In un anno al massimo 750 gr di S.a. di Terbutilazina (2) Al massimo 1 intervento all'anno



## DISERBO MAIS

<i><b>Epoca d'impiego</b></i>	<i><b>Infestanti controllate</b></i>	<i><b>Sostanza attiva</b></i>	<i><b>% di S.a.</b></i>	<i><b>l o kg /ha</b></i>	<i><b>Limitazioni d'uso e note</b></i>
<b>Post emergenza</b>	Graminacee e Dicotiledoni	(Isoxaflutole + Cyprosulfamide) (Tembotrione + Isoxadifen – ethyl)	(4,23 + 4,23) (4,31+ 2,15)	1,7 - 2 2	
	Dicotiledoni	(Tritosulfuron + Dicamba) (1) (Metil oleato + Metil palmitato) (2) Bentazone	(25 + 50) 37,5 87	1 1 1,1 - 1,5	<b>(1) Da utilizzare con il coadiuvante specifico</b> (2) Coadiuvante per i prodotti a base di Tritosulfuron
	Equiseto	MCPA	22,2	0,5	Al massimo sul 10% della superficie aziendale investita a mais