



DISERBO BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIA

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1) Metamitron	30,4 50,0	1,5 - 3 2 - 3	(1) Trattamenti al terreno in assenza di coltura per preparazione di letti di semina o di trapianto Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) S-Metolaclo (2) Metamitron	35,0 86,5 50,0	4,5 – 6 0,50 2 - 3	20 giorni di carenza (1) Non ammesso su bietola da foglia (2) Utilizzabile nel periodo compreso tra febbraio ad Agosto
Post emergenza	Dicotiledoni	Fenmedifan (1)	15,84	1,25 – 2,5	(1) Le dosi più basse possono essere utilizzate per interventi ripetuti con la coltura allo stadio di 2 – 3 foglie
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Cloridazon (1) (2) (3)	35,0	4,5 – 5	20 giorni di carenza (1) Non ammesso su bietola da foglia (2) Intervenire con la coltura a 2 foglie vere (3) Le dosi più basse possono essere utilizzate in post emergenza precoce con interventi ripetuti

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta