



## DISERBO ASPARAGO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
<b>Pre-Trapianto Pre Ricaccio e/o Post Raccolta</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate	30,4	1,5 - 3	Preparare definitivamente il terreno circa un mese prima dell'impianto (falsa semina) ed intervenire a pochi giorni dalla stessa Utilizzare in presenza di infestanti emerse
<b>Post trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Pyridate	45,0	1,3 - 2	<b>Massimo 2 Kg di prodotto all'anno</b>
<b>Pre Trapianto</b>	Graminacee e Dicotiledoni				
<b>Pre ricaccio e Post raccolta</b>	Graminacee e Dicotiledoni	Metribuzin (1) Pendimetanil (1) Dicamba (2) Oxadiazon (3)	35 38,72 21,2 34,1	0,4 - 0,7 2,50 0,2 - 0,5 1,5	E' opportuno alternare i prodotti nella fase di pre ricaccio per evitare che si selezionino specifiche malerbe <b>(1) Rispettare 60 gg di carenza</b> <b>(2) Interventi ammessi solo dopo l'emergenza dei turioni</b> <b>(3) Interventi effettuabili dopo la rincalzatura o prima dell'emergenza dei turioni</b>
<b>Post raccolta</b>	Graminacee	Propaquizafop	9,7	1	

***E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta***