



DISERBO RADICCHIO

<i>Epoca d'impiego</i>	<i>Infestanti controllate</i>	<i>Sostanza attiva</i>	<i>% di S.a.</i>	<i>l o kg /ha</i>	<i>Limitazioni d'uso e note</i>
Pre-semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate (1)	30,4	1,5 - 3	(1) Solo trattamenti al terreno in assenza di coltura, per preparazione di letti di semina o di trapianto. Utilizzare in presenza di infestanti emerse
Pre semina e Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Propizamide (1) Clorprofam Benfluralin	36 40,8 19,20	3 - 4 2 6,50	(1) Per interventi in post-emergenza delle infestanti, utilizzare solo in autunno inverno con terreno umido. Interrare i prodotti dopo la distribuzione
Pre trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Pendimetalin	38,72	1 - 1,5	Non utilizzare in terreni sciolti
Pre emergenza e Post trapianto	Graminacee e Dicotiledoni	Clorprofam	40,8	2	Intervenire dopo che le piantine hanno superato la crisi di trapianto Il terreno al momento dell'applicazione deve essere umido oppure è indispensabile praticare un'abbondante irrigazione entro 2-3 giorni
Post emergenza e Post trapianto	Graminacee	Ciclossidim Propaquizafop Quizalofop - p - etile Quizalofop - etile Isomero D	10,9 9,7 5 4,93	2 - 3 1 1 - 1,5 1 - 1,5	Le dosi variano in funzione delle infestanti da controllare

E' vietato il diserbo chimico in coltura protetta