

## **GRUPPO DIFESA INTEGRATA**

**” Integrazioni LGN difesa 2012 - GDI 16 novembre e 12 dicembre 2011”,**  
(estratto dei verbali del GDI relativi alle riunioni del 16 novembre e 12 dicembre 2011)

Sulla base delle recenti registrazioni viene data la facoltà alle Regioni di inserire nelle loro norme tecniche le decisioni di seguito riportate:

- Inserimento della s.a. amisulbron per la difesa dalla peronospora della vite con la limitazione di tre interventi all'anno in alternativa alla cyazofamide;
- viene autorizzato il mantenimento nelle linee guida della s.a. attiva Fenazaquin riportando nelle norme tecniche i limiti di impiego riportati nel recente decreto di recepimento:
  - 30 luglio 2012 limite oltre il quale non potrà più essere commercializzato;
  - 30 novembre 2012 limite oltre il quale il prodotto non potrà più essere impiegato;
  - Tali limitazioni riguardano tutte le colture per le quali il fenazaquin è al momento autorizzato, tranne che per le colture orticole e floricole per le quali l'impiego di tale sostanza viene confermato senza nessuna limitazione.
- Inserimento della s.a. pyraclostrobin per la difesa del frumento da septoria, oidio, fusarium e ruggine;
- inserimento delle s.a. pyraclostrobin e fludioxonil come s.a. singole, non coformulate con altre sostanze, per la difesa di melo e pero;
- inserimento della s.a. fludioxonil per la difesa del melo dal gloesporium nella fase di pre-raccolta;
- inserimento del diflubenzuron nella difesa dalla piralide del mais e del mais dolce;
- diserbo del frumento: inserimento della miscela Clodinafop (2,5%) + Pinoxaden (2,5%) + Florasulam 0,63%) + alla dose di 1 – 1,2 l/ha;
- mantenimento su tutte le colture sulle quali ne era previsto l'impiego della s.a. tetraconazolo, a condizione che vengano autorizzate sostanze attive non classificate come Xn;
- nella difesa del basilico da afidi, tripidi e nottue inserimento della deltametrina, con il limite di 2 interventi all'anno nell'ambito delle limitazioni già previste per i piretroidi;
- mantenimento su tutte le colture sulle quali ne era previsto l'impiego della s.a. acrinatrina in considerazione del recente inserimento in allegato I;
- inserimento della miscela clorantraniliprole + lambdacialotrina sulle colture, solo in pieno campo, di cavolfiore, mais dolce, erbe fresche e lattughe e brassicacee;
- inserimento della lambdacialotrina con le limitazioni, gli impieghi e le colture di seguito riportate:

<b>Coltura</b>	<b>Avversità</b>	<b>Limitazioni e Note</b>
<b>Cicoria pc e cp</b>	<b>Tripidi</b>	<b>Nei limiti previsti per i Piretroidi</b>
Cicorino cp	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Dolcetta cp	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
<b>Dolcetta Pc</b>	<b>Tripidi</b>	<b>Nei limiti previsti per i Piretroidi</b>
<b>Indivia riccia pc e cp</b>	<b>Tripidi</b>	<b>Nei limiti previsti per i Piretroidi</b>
<b>Indivia scarola pc e cp</b>	<b>Tripidi</b>	<b>Nei limiti previsti per i Piretroidi</b>
Lattuga cp e pc	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
<b>Lattuga Pc</b>	<b>Tripidi</b>	<b>Nei limiti previsti per i Piretroidi</b>

Lattughino cp	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Lattughino Pc	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Prezzemolo cp	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Prezzemolo Pc	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi
Radicchio pc e cp	Tripidi	Nei limiti previsti per i Piretroidi

➤ Inserimento dello spirotetramat, con le colture, le avversità ed i limiti di seguito riportate:

Coltura	Avversità	Limitazioni e Note
Agrumi	Afidi, Cotonello, Cocciniglia rossa forte, coccidi, Aleirode fioccoso	Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Albicocco	Afide verde e Cocciniglie	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Cliegio	Cocciniglie	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Melo	Afide grigio, Afide lanigero, afide verde, Cocciniglie	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Pero	Afide grigio, Afide lanigero, afide verde, Cocciniglie, Psilla	Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità. Al massimo 1 intervento all'anno contro gli afidi, 1 contro la psilla e 1 contro le cocciniglie. Per la difesa dalla psilla il prodotto va posizionato sulle uova.
Pesco	Afide verde e Cocciniglie	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Susino	Afide verde e Cocciniglie	Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Vite da tavola e da vino	Cocciniglie	Al massimo due interventi all'anno
Cavoli a testa	Myzus persicae e Brevycorine brassicae	Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo cp	Myzus persicae e Aphis gossypii	Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cetriolo pc	Myzus persicae e Aphis gossypii	Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Cicoria cp	Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri	Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

<b>Cocomero pc</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Endivia riccia cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Endivia scarola cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Fagiolino cp</b>	<b>Aphis fabae</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Fagiolo cp</b>	<b>Aphis fabae</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Melanzana cp</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Melone cp</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Melone pc</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Peperone cp</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Peperone in pieno campo</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Pisello cp</b>	<b>Aphis fabae</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Pomodoro cp</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Radicchio cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Zucchini cp</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Zucchini pc</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Cicorino cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Cocomero pc</b>	<b>Myzus persicae e Aphis gossypii</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Dolcetta cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Foglie e germogli di brassica cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>

<b>Lattuga cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Lattughino cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>
<b>Rucola cp</b>	<b>Myzus persicae e Nasonovia ribisnigri</b>	<b>Al massimo due interventi all'anno indipendentemente dall'avversità</b>

- Inserimento della s.a. lufenuron esca, per la difesa dalla mosca della frutta di: melo, pero, pesco, susino e albicocco;
- inserimento della sostanza attiva cyflufenamid, in peno campo e coltura protetta, al massimo due interventi dall'anno, per la difesa dall'oidio di: pomodoro, melanzana, peperone, zucca, zucchino, cetriolo, melone e cocomero;
- inserimento della s.a. clopirifos metyle per ravanella a pieno campo;
- inserimento della s.a. clorantraniliprole per la difesa del fagiolino pieno campo e in coltura protetta e del cavolfiore solo pieno campo.

**IL PRESIDENTE**  
(Giuseppe Blasi)

